

**中華民國人壽保險管理學會**  
**102 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、每次測驗時間為 100 分鐘。
- 二、參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，無身分證件者以缺考計。
- 三、測驗開始後未滿 30 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 四、參加測驗人員應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以缺考計。
- 五、禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 六、測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、答案紙上不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。
- 八、繳卷時，請繳回答案紙，並請監考人員於該參加測驗人員之入場通知上簽章。
- 九、參加測驗人員如有疑問（如准考證號碼與答案紙號碼不同、試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)**

1. 下列針對「肺炎」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 病原體侵入呼吸系統而引起肺部感染發炎稱為肺炎
  - (B) 以病原菌分類可分為病毒性肺炎、細菌性肺炎、黴漿菌性肺炎、吸入性肺炎
  - (C) 一般而言，有全身性疾病、慢性肺病、昏迷、氣管內管者，其肺炎的發生率極低
  - (D) 檢查可用胸部 X 光、電腦斷層攝影發現肺炎發生部位與範圍
  
2. 下列針對「心絞痛」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 不屬於冠狀動脈性心臟病的一種
  - (B) 高膽固醇血症，尤其以總膽固醇量及低密度脂蛋白過高，而高密度脂蛋白過低時，較易得到
  - (C) 類型有穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛、變異型心絞痛
  - (D) 心電圖檢查為檢查方式之一
  
3. 下列針對「胃潰瘍、十二指腸潰瘍」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 指上消化道的黏膜層、肌肉層因缺損而發生潰瘍
  - (B) 不可能併發消化道出血、穿孔
  - (C) 有些病人在胃黏膜可發現幽門桿菌
  - (D) 內視鏡如胃鏡及十二指腸鏡，為檢查方式之一
  
4. 下列針對「尿石症(urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 在泌尿系統中有結晶物質沈積而發生結石，當結石過大無法隨著尿液排出體外時，即稱之為尿石症
  - (B) 依發生部位可分為腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石
  - (C) 可能出現的症狀不包括血尿
  - (D) 體外震波碎石術是一種非侵入性的治療

5. 下列針對「退化性骨質疏鬆症」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 與年齡有關
  - (B) 正常人的骨質量約在 20-35 歲可達最高峰，之後將緩慢的速度逐漸減少
  - (C) 可見於切除卵巢的婦女
  - (D) 女性在停經期，不會因雌性素分泌停止，而易造成骨質的耗損
6. 下列骨折何者為「會順著副鼻竇破裂，所以有時耳鼻會流出腦脊髓液，內頸動脈有時也因此而破裂、出血，或是造成第一、二、七、八對腦神經損傷與感染」？
- (A) 線性骨折
  - (B) 凹陷骨折
  - (C) 顱底骨折
  - (D) (A)、(B)、(C) 皆不正確
7. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 屬於免疫系統的疾病
  - (B) 可能會造成關節功能喪失
  - (C) 不是一種慢性全身性發炎性的結締組織疾病
  - (D) 可利用的治療方式包括關節成形術、滑膜截除術
8. 下列眼部疾病，何者為「眼瞼受到葡萄球菌感染引起皮脂腺急性化膿症，或是脂漏性皮膚炎所造成」？
- (A) 角膜炎
  - (B) 白內障
  - (C) 青光眼
  - (D) 麥粒腫

9. 下列針對「惡性淋巴瘤」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是淋巴結分化成熟的淋巴細胞發生癌化所致
  - (B) 可分為何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin' s lymphoma)和非何杰金氏淋巴瘤(non-Hodgkin' s lymphoma)
  - (C) 非何杰金氏淋巴瘤的淋巴球耗盡型(lymphocyte depletion)的組織切片會出現許多黎特史登堡氏細胞(Reed Sternberg cell)
  - (D) 人體的任何器官均可能發生
10. 乳癌 TNM 分期法，T、N、M 三字母何者代表乳癌是否影響牽連到局部淋巴結？
- (A) T
  - (B) N
  - (C) M
  - (D) (A)、(B)、(C)皆錯誤
11. 下列針對「懷孕中的疾病」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 流產(abortion)是指懷孕在 24-37 週之內結束者，或體重介於 500-1000 公克胎兒的娩出
  - (B) 生殖器的異常如雙子宮可能是流產的病因之一
  - (C) 子宮外孕(ectopic gestation)是指受精卵在子宮腔以外著床發育
  - (D) 子宮外孕依據著床的部位最常見的為輸卵管懷孕
12. 下列何者不是目前台灣「新生兒先天性代謝異常疾病」篩檢項目？
- (A) 先天性甲狀腺亢進症
  - (B) 苯酮尿症
  - (C) 高胱胺酸尿症
  - (D) 半乳糖血症

13. 下列針對「熱痙攣( fever convulsion)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指孩童因發燒所引起暫時性、全身抽搐與痙攣的症狀
  - (B) 好發於大於 7 歲的孩童
  - (C) 通常有家族史
  - (D) 可能與腦組織發育的成熟度有關
14. 下列針對「氣喘」的敘述，何者是正確的？
- (A) 當咽喉受到阻塞而呼吸困難，出現喘息聲的情況即稱之
  - (B) 一種間歇式且可逆的呼吸道疾病
  - (C) 只有幼兒才可能發生
  - (D) 無法以肺功能檢查判斷氣喘的嚴重度
15. 正常心臟的搏動具有規律性與自主性，下列何者為心臟的正常「傳導系統(conductive system)」的傳遞順序？
- (A) 普金吉氏纖維(Purkinje' s fiber)→竇房結(sinoatrial node)→希氏束(His bundle)→房室結(atrioventricular node)
  - (B) 竇房結(sinoatrial node)→房室結(atrioventricular node)→普金吉氏纖維(Purkinje' s fiber)→希氏束(His bundle)
  - (C) 房室結(atrioventricular node)→竇房結(sinoatrial node)→希氏束(His bundle)→普金吉氏纖維(Purkinje' s fiber)
  - (D) 竇房結(sinoatrial node)→房室結(atrioventricular node)→希氏束(His bundle)→普金吉氏纖維(Purkinje' s fiber)
16. 下列針對「心衰竭(heart failure)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指心臟瓣膜因功能性疾病的因素，使得心臟腔室內血液的流動受到阻礙，而出現異常的流向或流量
  - (B) 心肺症為右心衰竭的原因之一
  - (C) 高血壓為左心衰竭的原因之一
  - (D) 心臟超音波為心衰竭檢查方式之一

17. 下列針對「B 型肝炎血清標記」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) HBcAg 陽性：病毒持續複製且具傳染力
  - (B) HBeAg 陽性：病人為低傳染力的慢性 B 型肝炎帶原者，通常表示病毒沒有持續複製
  - (C) HBsAg 陽性：在急性 B 型肝炎、慢性 B 型肝炎會出現
  - (D) HBV DNA 陽性：代表病毒持續複製且具傳染力
18. 下列針對「腎衰竭」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腎臟組織遭破壞，使其功能減低至 5-10%，造成尿酸、肌酸酐等代謝產物無法排泄，在體內累積，引起全身性症狀時，即稱之
  - (B) 可分為急性腎衰竭和慢性腎衰竭
  - (C) 急性腎衰竭發生快速但可逆
  - (D) 腹膜透析或血液透析不是急性腎衰竭的治療方式之一
19. 下列針對「腦血管意外(cerebrovascular accident；CVA)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 俗稱「中風(stroke)」
  - (B) 會使腦組織缺血、缺氧而發生突發性神經障礙
  - (C) 不會造成不可逆的腦功能障礙
  - (D) 糖尿病為危險因子之一
20. 下列針對「阿茲海默氏病(Alzheimer' s disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是一種小腦退化性疾病
  - (B) 會造成記憶力與認知功能缺損，但不會出現精神症狀如憂鬱症
  - (C) 家族史為確定性危險因子之一
  - (D) 電腦斷層攝影不會發現海馬迴部位有萎縮的情形

21. 下列針對「背痛」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 背痛的部位包括後頸、背部、腰以下之部位
  - (B) 因附著在脊椎的韌帶、肌腱及肌肉病變而有疼痛
  - (C) 精神神經疾病的心理因素，病人也會有背痛的主述
  - (D) 內臟病變不會引發背痛
22. 下列針對「血壓」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 血液在血管中流動時，對血管壁所造成的壓力
  - (B) 大腦是人體的血壓控制中樞
  - (C) 可分為本態性高血壓和繼發性高血壓
  - (D) 會影響血壓之因素中有年齡、性別
23. 下列針對「便血(melena)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指血液或含有血液的糞便經由肛門排出
  - (B) 只有在下消化道病變可見
  - (C) 血液在消化道受到消化液作用，所以糞便會呈現瀝青狀的顏色，也稱黑便(tarry stool)
  - (D) 可藉由觀察糞便型態，可知腸道病灶位置
24. 下列針對「黃疸(jaundice)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 膽紅素是白血球被破壞後的產物
  - (B) 溶血性黃疸會造成直接膽紅素增加
  - (C) 阻塞性黃疸會造成間接膽紅素增加
  - (D) 肝細胞性黃疸可造成間接膽紅素或直接膽紅素增加
25. 下列何者不是因血管異常而造成的紫斑病？
- (A) 壞血病
  - (B) 過敏性紫斑病
  - (C) 隱性遺傳性的血友病
  - (D) 老年性紫斑病

26. 下列針對「貧血」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是指體內紅血球與血紅素數量明顯不足
  - (B) 會造成攜氧能力出現障礙
  - (C) 在紅血球數量不足或體內呈低氧量時，肝臟會分泌紅血球生成素
  - (D) 症狀有出現臉色或手腳蒼白、運動耐受度減低
27. 因嚴重的精神打擊，而引起血管突然嚴重的擴張，導致組織的血液灌流量不足，而造成的「休克」，為下列何者？
- (A) 心因性休克(cardiogenic shock)
  - (B) 神經性休克
  - (C) 藥物性休克
  - (D) 低血量性休克
28. 下列針對「運動麻痺」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 依運動神經系統發生障礙部位的不同，可分中樞性和末梢性麻痺
  - (B) 當內囊產生病灶時，會引起病側顏面肌麻痺，或導致痙攣性半側麻痺的步行姿態，屬中樞性麻痺
  - (C) 因外傷、椎間盤突出，脊髓腫瘤等，造成兩側錐體路徑或頸椎損傷時，會引發四肢麻痺的脊髓障礙，屬末梢性麻痺
  - (D) 當罹患重症肌無力症時，因乙醯膽鹼的受容性減少，會造成神經與肌肉接合處的傳導受阻，易引發疲勞性的肌肉運動無力
29. 下列單一神經麻痺，何者會出現「猿手(ape hand)」的姿態？
- (A) 尺骨神經麻痺
  - (B) 正中神經麻痺
  - (C) 總腓骨神經麻痺
  - (D) 橈骨神經麻痺



30. 下列針對「意識障礙」的敘述，何者是正確的？
- (A) 意識障礙是病人警覺性與意識呈現興奮情形，可辨認外在環境，但對於刺激有不當的反應
  - (B) 意識混亂臨床上可用格拉斯哥氏昏迷量表(Glasgow coma scale)，此量表由睜眼及運動二項反應之得分作判定
  - (C) 當格拉斯哥氏昏迷量表總分為 9 分時，屬輕度昏迷
  - (D) 木僵(stupor) 指對言語刺激無反應，給予痛覺刺激表現出逃避的反應
31. 下列何者不屬於「病理性蛋白尿」？
- (A) 腎病症候群
  - (B) 妊娠毒血症
  - (C) 肌肉過度運動
  - (D) 腎臟發炎
32. 下列針對「白蛋白」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是用來維持血漿的滲透壓
  - (B) 在腎臟製造
  - (C) 下痢時可能會使白蛋白減少
  - (D) 可做為檢查營養狀態之用
33. 下列針對「C 型肝炎抗體(anti-HCV)檢查」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 陽性可表示體內有 C 型肝炎抗體產生
  - (B) 陽性可表示已感染過 C 型肝炎
  - (C) 陽性可表示不需要定期追蹤肝功能
  - (D) 陰性可表示未曾感染 C 型肝炎或目前正感染 C 型肝炎，但在空窗期，抗體尚未產生
34. 下列何者不屬於腎功能檢查？
- (A) 尿素氮
  - (B) 肌酸酐
  - (C) 尿酸
  - (D) 尿糖

35. 下列針對「阿爾法胎兒蛋白( $\alpha$ -FP)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為癌症篩選項目之一
  - (B) 該值偏高可能有肝癌發生
  - (C) 該值偏高不用考慮畸胎瘤或睪丸癌的發生
  - (D) 懷孕時該值會偏高
36. 對於正常刺激的感受變得很敏銳，有輕微的刺激就能感覺到，為下列何類型的感覺障礙？
- (A) 感覺鈍麻
  - (B) 異常感覺
  - (C) 感覺過敏
  - (D) (A)、(B)、(C)皆錯誤
37. 病變位於第2-4腰髓的神經根及馬尾部，其支配區域的肛門、會陰發生全感覺障礙，而出現排便失禁、陽萎等，為下列何類型的感覺障礙？
- (A) 脊髓完全橫斷型
  - (B) 薦髓侵犯型
  - (C) 脊髓半截障礙型
  - (D) 懸垂型
38. 外在景物隨光線進入眼球，下列何者為正確的「視覺傳導過程」？
- (A) 玻璃體→角膜→水晶體→視網膜→視覺皮質→視神經交叉
  - (B) 角膜→玻璃體→水晶體→視網膜→視神經交叉→視覺皮質
  - (C) 視網膜→水晶體→玻璃體→角膜→視覺皮質→視神經交叉
  - (D) 角膜→水晶體→玻璃體→視網膜→視神經交叉→視覺皮質
39. 下列針對「聽力障礙」的敘述，何者是正確的？
- (A) 三聽小骨鏈斷裂屬感音性聽力障礙
  - (B) 柯蒂氏器損傷屬傳導性聽力障礙
  - (C) 聽神經傳導障礙屬感音性聽力障礙
  - (D) (A)、(B)、(C)皆正確

40. 下列針對「呼吸系統」的敘述，何者是正確的？

- (A) 可分為上呼吸道與下呼吸道
- (B) 上呼吸道包括鼻腔、咽、喉、氣管
- (C) 下呼吸道則只包括支氣管、肺臟
- (D) (A)、(B)、(C)皆正確

**貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 下列哪些是「非發紺型先天性心臟病」？

- (A) 心室中隔缺損
- (B) 開放性動脈導管
- (C) 法洛氏四重畸型
- (D) 輕度肺動脈瓣狹窄

42. 下列哪些系統，可以保持人體平衡，維持在空間中的方向感及對運動作出反應？

- (A) 前庭系統
- (B) 淋巴系統
- (C) 頸部的本體感受器
- (D) 視覺系統

43. 下列針對「眩暈」的敘述，哪些是正確的？

- (A) 不會有旋轉或運動的感覺
- (B) 前庭機能檢查、眼振檢查可區分中樞性或末梢性眩暈
- (C) 良性陣發性頭位眩暈症屬中樞性眩暈
- (D) 梅尼爾氏症(Meniere' s disease)屬內耳性眩暈

44. 下列針對「愛滋病」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 又稱為「先天免疫缺乏症候群」
  - (B) 由人類免疫缺乏病毒(human immunodeficiency virus ; HIV) 感染所引起
  - (C) 因免疫功能遭受破壞，因此常出現伺機性的感染，但不會引起續發性癌症
  - (D) 人類免疫不全病毒(HIV)抗體檢查、免疫酵素分析法檢查、西方墨點法檢查為可利用的檢查方法
45. 下列針對「巴金森氏病(Parkinson' s disease)」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 當乙醯膽鹼激素活性減少或多巴胺活性增加，即會發生具有巴金森氏病的臨床特徵
  - (B) 腦部病毒感染、腫瘤或血管病變不會是導致巴金森氏病的可能原因
  - (C) 典型症狀有靜止性震顫、僵直、運動不能
  - (D) 有可能出現失智症
46. 下列針對「糖尿病」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 是一種慢性葡萄糖代謝異常疾病
  - (B) 空腹血糖值 $\geq 110\text{mg/dl}$  是診斷糖尿病標準之一
  - (C) 嚴重糖尿病會引起併發症，如視網膜病變、神經病變
  - (D) 口服降血糖劑、胰島素為可利用的藥物治療方式
47. 下列針對「風濕性心臟病(rheumatic heart disease)」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 由風溼熱(rheumatic fever)所引起
  - (B) 是一種暫時性、可逆的心臟疾病
  - (C) 與上呼吸道感染到A群 $\beta$ 型溶血性鏈球菌有關
  - (D) 當侵犯到心臟瓣膜時，會造成瓣膜的狹窄或逆流

48. 下列針對「排尿過程」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 當膀胱尿量達 300-400ml 時，膀胱壁上的感受器即將刺激傳送至脊髓與大腦皮質，而有排尿的慾望
  - (B) 排尿中樞是第二~四對薦椎神經(S2~S4)
  - (C) 當有排尿慾望時，排尿中樞將排尿反射經過交感神經，有意識的反射性引起膀胱逼尿肌收縮、尿道內括約肌鬆弛
  - (D) 大腦皮質則可無意識性的控制尿道外括約肌鬆弛將尿液排出，或控制尿道外括約肌收縮而憋尿
49. 下列針對正常「心臟瓣膜」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 右心房與右心室間的心臟瓣膜稱二尖瓣
  - (B) 左心房與左心室間的心臟瓣膜稱僧帽瓣
  - (C) 左心室與主動脈間的心臟瓣膜稱三尖瓣
  - (D) 右心室與肺動脈間的心臟瓣膜稱肺動脈瓣
50. 高血壓或動脈硬化的病人，其血管穩定度不夠，容易出現自發性腦內出血，好發於下列何處？
- (A) 基底核
  - (B) 丘腦
  - (C) 小腦半球
  - (D) 橋腦