

中華民國人壽保險管理學會
103 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、每次測驗時間為 100 分鐘。
- 二、參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、測驗開始後未滿 30 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 四、參加測驗人員應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以缺考計。
- 五、禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 六、測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。
- 八、只繳回答案卡，若該堂考科需考試證明之考生，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、參加測驗人員如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 「輕微運動就會喘(例如在室內走動就會喘)」屬「美國紐約心臟協會心臟功能分級(NYHA Functional class)」的第幾級(Class)?
 - (A) Class 1
 - (B) Class 2
 - (C) Class 3
 - (D) Class 4

2. 下列選項，何者可用於「肺結核(Pulmonary tuberculosis)」的診斷?
 - (A) 痰液耐鹼染色鏡檢
 - (B) 痰液病毒學培養
 - (C) 皮膚金黃色葡萄球菌素試驗
 - (D) 血液丙型干擾素(Interferon-gamma)檢驗

3. 下列針對「潰瘍性大腸炎(Ulcerative colitis)」的敘述，何者是正確的?
 - (A) 成因至今非常清楚
 - (B) 主要侵犯大腸黏膜層
 - (C) 嚴重程度與大腸受影響範圍無關
 - (D) 如果出現嚴重併發症(如毒性巨腸症)，則考慮藥物治療即可

4. 痛風(Gout)是下列何者在血中濃度過高，於是在關節腔中形成沉積，引發急性關節發炎?
 - (A) 肌酸酐
 - (B) 尿素
 - (C) 酮體
 - (D) 尿酸

5. 下列針對「巴金森氏症(Parkinsonism)」的敘述，何者是正確的?
 - (A) 是年輕人常見的腦神經退化疾病
 - (B) 此症為慢性進行性的疾病
 - (C) 肢體運動的協調不會受影響，故患者不易發生摔倒
 - (D) 功能性影像檢查對於診斷沒有幫助

6. 「子宮肌腺症(Adenomyosis)」是指何種的組織結構侵入子宮肌層中？
- (A) 子宮外膜(Perimetrium)
 - (B) 子宮肌層(Myometrium)
 - (C) 子宮內膜(Endometrium)
 - (D) 卵巢(Ovary)
7. 下列針對「何杰金氏症 (Hodgkin's disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不歸於淋巴瘤的一種
 - (B) 實際上與「非何杰金氏症 (Non-Hodgkin's disease)」是相同的疾病
 - (C) 病理組織型態分為低惡性及侵襲性兩大類型，其中不包括結節硬化型
 - (D) 第 I 或 II 期病患，可使用放射線治療
8. 下列有關「糖尿病(Diabetes mellitus)」的「併發症」敘述，何者是正確的？
- (A) 與末梢血管栓塞無關
 - (B) 眼睛病變包括白內障、青光眼
 - (C) 手腳麻木及刺痛為中樞神經損害的神經病變
 - (D) 不至於引起尿毒症而需要洗腎
9. 下列有關「白內障(Cataract)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是因玻璃體混濁
 - (B) 會導致視力障礙
 - (C) 青光眼是造成白內障的原因
 - (D) 手術是有效的治療方法
10. 下列針對「精神官能症(Neurosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是一群較嚴重的精神疾病
 - (B) 是一種單一的疾病
 - (C) 有時會將其視為神經衰弱
 - (D) 病徵只表現於單一的生理系統

11. 下列針對「狹心症的胸痛」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 常放射至左手臂內側
 - (B) 不可能放射至上腹部
 - (C) 可能同時合併冒冷汗
 - (D) 休息可能對胸痛緩解沒有幫助
12. 下列針對「肺膿瘍(Lung abscess)」的「病因或危險因子」的敘述，何者不屬於「正常的咳嗽反射受損或被抑制者」？
- (A) 酒精中毒
 - (B) 癲癇
 - (C) 口咽手術
 - (D) 糖尿病
13. 下列針對「B型肝炎」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是由被排泄物污染的食物或飲水經口食入傳染
 - (B) 血清標記B型肝炎表面抗原(HBsAg)陽性代表B型肝炎帶原
 - (C) B型肝炎病毒型態為RNA
 - (D) 不會發展為肝硬化或肝癌
14. 下列針對「愛滋病」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是先天免疫缺乏症候群的俗稱
 - (B) 是感染人類乳突病毒的末期表現
 - (C) 「愛滋病帶原者」指已經有愛滋病症狀者
 - (D) 感染途徑包括血液傳染
15. 下列針對「腦出血(Cerebral hemorrhage)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 急性腦部血管栓塞
 - (B) 非腦中風疾病的一種
 - (C) 急性死亡率高
 - (D) 日後不易造成殘障

16. 下列針對「腎絲球腎炎(Glomerulonephritis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指腎臟的腎絲球發生損傷和發炎
 - (B) 會影響腎臟的過濾功能
 - (C) 不會發生末期腎臟衰竭
 - (D) 原發性腎絲球病變可能與免疫機制有關
17. 下列針對「貧血(Anemia)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是指血液中的紅血球細胞數目減少
 - (B) 是指血液中的血色素降低的狀態
 - (C) 台灣以缺鐵性貧血和海洋性貧血(Thalassemia)最常見
 - (D) 貧血的原因依據紅血球的大小可分為急性貧血、慢性貧血
18. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議：飯前血糖超過多少即符合糖尿病診斷？
- (A) 126 mg/dl
 - (B) 100 mg/dl
 - (C) 110 mg/dl
 - (D) 200 mg/dl
19. 「視盤至視交叉以前的視神經段的疾病」統稱為？
- (A) 視網膜剝離
 - (B) 青光眼
 - (C) 白內障
 - (D) 視神經病變
20. 下列針對「器質性精神病」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 酒精性精神病不屬於器質性精神病
 - (B) 腦組織創傷可為其原因
 - (C) 譫妄為常見的症狀
 - (D) 會出現妄想、幻聽的狀況

21. 下列醫學術語(Medical disciplines)，何者是指「描述身體內巨觀結構(所謂巨觀是指可以用肉眼看得到的)的研究」？
- (A) 組織學(Histology)
 - (B) 解剖學(Anatomy)
 - (C) 微生物學(Microbiology)
 - (D) 生物化學(Biochemistry)
22. 下列瓣膜何者位於「左心房與左心室之間」？
- (A) 三尖瓣(Tricuspid valve)
 - (B) 肺動脈瓣(Pulmonary valve)
 - (C) 二尖瓣(Bicuspid valve)
 - (D) 主動脈瓣(Aortic valve)
23. 「對缺氧最敏感的細胞」是下列何者？
- (A) 肌肉細胞
 - (B) 胃腸細胞
 - (C) 腎臟細胞
 - (D) 腦細胞
24. 食物經由下列何者離開胃部進入小腸？
- (A) 賁門
 - (B) 幽門
 - (C) 迴盲瓣
 - (D) 肛門
25. 大腿的骨頭稱為？
- (A) 髌骨
 - (B) 脛骨
 - (C) 肱骨
 - (D) 股骨

26. 中樞神經系統(Central Nervous System)為存在於下列何項的神經組織？
- (A) 腦部
 - (B) 脊髓外
 - (C) 神經節
 - (D) (A)、(B)、(C) 皆正確
27. 「紅血球生成素」是下列何臟器所分泌的荷爾蒙？
- (A) 肺臟
 - (B) 心臟
 - (C) 肝臟
 - (D) 腎臟
28. 下列針對「荷爾蒙(Hormone)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 分泌荷爾蒙的體內腺體所形成的系統稱為免疫系統
 - (B) 荷爾蒙運作的重要原則是回饋機制(Feedback)
 - (C) 副甲狀腺素會調節血液中鈣離子濃度
 - (D) 甲狀腺刺激素(Thyroid Stimulating Hormone)由腦下腺前葉所製造
29. 下列子宮壁的結構，何者會隨著荷爾蒙進行明顯的週期性變化？
- (A) 腹膜(Peritoneum)
 - (B) 肌肉組織
 - (C) 子宮的黏膜內層
 - (D) 漿膜
30. 下列針對「睪丸」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可分泌睪固酮(Testosterone)
 - (B) 可以產生精子
 - (C) 胎兒時期的睪丸先位於腹腔內，但之後會往下移動
 - (D) 正常出生時會有一顆睪丸仍停留在腹腔

31. 下列何者為「免疫系統細胞」？
- (A) 紅血球
 - (B) 白血球
 - (C) 血小板
 - (D) 黃血球
32. 下列何者為「眼球的最內層」？
- (A) 鞏膜
 - (B) 角膜
 - (C) 視網膜
 - (D) 脈絡膜
33. 下列皮膚構造何者「含有纖維母細胞，以及含有膠原纖維的細胞間質」？
- (A) 表皮層
 - (B) 真皮層
 - (C) 皮下組織
 - (D) 筋膜層
34. 下列針對「良性腫瘤」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 會侵襲周邊正常組織
 - (B) 不會產生轉移
 - (C) 細胞通常是分化良好的(Well differentiated)
 - (D) 子宮平滑肌瘤(Leiomyoma)為良性腫瘤
35. 下列何者不屬於「結締組織(Connective tissue)」？
- (A) 軟骨
 - (B) 肌腱
 - (C) 韌帶
 - (D) 腺體表皮(Glandular epithelium)

36. 感覺障礙依發生部位來區分，下列何者不屬於「周邊神經障礙」？
- (A) 脊髓完全橫斷型
 - (B) 神經叢型
 - (C) 神經根型
 - (D) 多發性神經病變型
37. 「格拉斯哥氏昏迷量表(Glasgow coma scale)」總分為幾分時，為意識狀態正常？
- (A) 18
 - (B) 15
 - (C) 7
 - (D) 3
38. 下列末梢性運動麻痺，何者會出現「垂腕(Wrist drop)」的姿態？
- (A) 橈骨神經麻痺
 - (B) 尺骨神經麻痺
 - (C) 正中骨神經麻痺
 - (D) 總腓骨神經麻痺
39. 下列何者為「骨質疏鬆症」最常見的症狀？
- (A) 腎結石
 - (B) 腸胃不適
 - (C) 異常血壓
 - (D) 骨折
40. 下列針對「子癇前症」(Pre-eclampsia)的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 目前原因不明
 - (B) 可危急母體及胎兒性命
 - (C) 低血壓是主要三大症狀之一
 - (D) 嚴重時會引發子癇

貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 下列針對「心電圖」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 狹心症發作時可看到病理性 Q 波(Pathological Q Wave)
 - (B) 慢性心肌缺血(缺氧)可看到 ST 節段下降(ST Depression)
 - (C) 平常時狹心症沒有發作時心電圖可能正常
 - (D) 運動心電圖可偵測是否有潛在的心肌缺血
42. 「慢性支氣管炎的咳嗽」須符合下列哪些條件？
- (A) 至少連續二年
 - (B) 每年至少有三個月
 - (C) 幾乎每天持續性地有痰和黏液的咳
 - (D) 且需先排除其他明確原因(如肺部惡性腫瘤)引起的咳嗽
43. 導致「肝炎(Hepatitis)」的原因包括？
- (A) 酒精
 - (B) 脂肪肝
 - (C) 藥物
 - (D) 自體免疫疾病
44. 下列針對「椎間盤突出(Herniation of intervertebral disc)」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 頸椎以 C5 - C6 發生率最多
 - (B) 腰椎以 L1 - L2 發生率最多
 - (C) 年齡是影響頸椎退化的因素
 - (D) 腰椎椎間盤突出和肥胖無關
45. 下列針對「阿爾茲海默氏症(Alzheimer's disease)」的診斷敘述，哪些是正確的？
- (A) 診斷須符合「精神疾病診斷與統計手冊 DSM」失智症診斷標準
 - (B) 診斷過程中不需要排除精神疾病、藥物及酒或毒物造成的因素
 - (C) 經臨床失智量表(Clinical dementia rating scale; CDR)評估達 0 分以上者
 - (D) 過程中常藉由血液檢查或影像檢查作為輔助，以排除如感染、腦腫瘤等，可以積極治癒的疾病

46. 下列「以解剖姿勢來描述身體各個部位的方向與相對位置」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 胸部相對頸部位於上部(Superior)
 - (B) 頸子相對於肩膀位於中間(Medial)的位置
 - (C) 上臂相對於手掌位於身體的近端(Proximal)
 - (D) 皮膚相對於肌肉位於深層(Deep)
47. 下列哪些「骨」形成「踝關節」？
- (A) 脛骨
 - (B) 腓骨
 - (C) 距骨
 - (D) 趾骨
48. 下列哪些為「惡性腫瘤」？
- (A) 癌瘤(Carcinoma)
 - (B) 肉瘤(Sarcoma)
 - (C) 白血病(Leukemia)
 - (D) 非何杰金氏病(Non-Hodgkin' s lymphoma)
49. 下列針對「乳癌 TNM 分期」的敘述，哪些是正確的？
- (A) TIS 為原位癌屬乳癌第 1 期
 - (B) N 代表是否影響牽連到局部淋巴結
 - (C) M 代表是否有遠處轉移
 - (D) T₀ 代表有原發腫瘤
50. 下列針對「腕隧道(Carpal tunnel)或腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome)」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 腕隧道位於手腕的前面
 - (B) 屈肌支持帶(Flexor retinaculum)(又稱掌腕韌帶)形成腕隧道的底部
 - (C) 腕隧道內含有手指屈肌的長條肌腱與正中神經
 - (D) 腕隧道症候群症狀包括手指的刺痛(Paraesthesia)