

**中華民國人壽保險管理學會**  
**107 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 下列有關於腦炎 (Encephalitis)的敘述，何者錯誤？
  - (A) 感染病因以病毒造成較多
  - (B) 因腦壓增高及腦實質受損，急性期通常會出現頭痛、發燒、行為異常、昏睡、痙攣、昏迷等神經症狀
  - (C) 大部分患者會造成後遺症，如癲癇、智能或行為等身心障礙
  - (D) 需藉由血液、脊髓液的免疫生化及細菌學檢查，以及影像檢查如 CT、MRI 及腦電圖等作為確定診斷的工具
  
2. 下列有關於腦膿瘍 ( Brain Abscess )的敘述，何者錯誤？
  - (A) 腦膿瘍是嚴重的腦部化膿性感染症
  - (B) 此症以往較為少見，但近年來或許因免疫系統疾病增加的關係，而有逐漸上升的趨勢
  - (C) 症狀依腦膿瘍的大小、位置、病原菌的種類、顱內壓的增高程度等，有一些不同
  - (D) 以外科手術治療為主，抗生素治療為輔
  
3. 精神官能症( Neurosis , Psychosomatic disorders)包含了下列何者病症？
  - (A) 強迫症，身心症
  - (B) 焦慮症，恐慌症
  - (C) 躁鬱症
  - (D) 以上(A)及(B)
  
4. 下列有關於「眩暈」(Vertigo) 的敘述，何者錯誤？
  - (A) 身體的平衡維持主要由前庭系統，小腦，視覺，及本體感受神經一起管理，只要任何一處有了狀況，就會發生眩暈或失去平衡的現象
  - (B) 眩暈是由許多不同原因造成的相似症狀，但大多數潛在病因不易被發現，因而統稱之為眩暈症
  - (C) 周邊前庭系統開始於內耳之中，所以一些慢性或嚴重的耳科疾病也可能會併發此問題
  - (D) 經過了一系列的詳細檢查，眩暈的病因皆可被確定診斷出來

5. 關於腦栓塞(Cerebral embolism)的栓子最多的是來自何處的敘述，下列何者是正確的？
- (A) 週邊血管硬化的斑塊剝落
  - (B) 心臟的血栓
  - (C) 腫瘤的栓子
  - (D) 骨頭斷裂釋出的脂肪栓子
6. 導致頭痛的原因，包括了下列何者？
- (A) 偏頭痛，精神壓力、精神疾病
  - (B) 器質性腦病
  - (C) 肌腱肌膜炎、頸椎問題
  - (D) 以上皆是
7. 下列哪些是屬於「癲癇 (Epilepsy)」的可能病因？
- (A) 腦血管疾病、腦外傷
  - (B) 腦瘤、腦部感染
  - (C) 腦發育異常、遺傳因素
  - (D) 以上皆是可能的病因
8. 下列針對腦梗塞 (Cerebral infarction)的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦動脈血管硬化狹窄是造成腦梗塞的主要原因
  - (B) 高風險病史因素包括心血管疾病、糖尿病、高血壓
  - (C) 暫時性腦缺血(T. I. A.)常是腦梗塞的前兆，一般會出現一些症狀輕微、短暫、可恢復性的神經障礙
  - (D) 以上皆為正確
9. 以下何者為典型急性心肌梗塞心電圖變化？
- (A) ST 間段下降
  - (B) 立即出現異常 Q 波
  - (C) ST 間段上升
  - (D) P 波延長

10. 以下有關心臟跳動，何者是錯的？
- (A) 心房纖維性顫動(Atrial Fibrillation)在健康人身上偶而會出現
  - (B) 心肌炎可以造成心房撲動
  - (C) 陣發性心房搏動過速是一種心律不整
  - (D) 心跳 130-140/分鐘，一定是異常的，須立刻治療
11. 以下有關低血壓的原因，何者是錯的？
- (A) 甲狀腺亢進
  - (B) 體質
  - (C) 愛迪生氏病(Addison's disease)
  - (D) 服用降血壓藥過量
12. 下列有關高血壓，何者敘述有誤？
- (A) 定義是收縮壓 140mmHg 以上，舒張壓 90mmHg 以上
  - (B) 可分為原發性與繼發性兩種，以繼發性高血壓所占比例較大
  - (C) 併發症有腦中風、心衰竭與腎衰竭
  - (D) 腎功能異常的慢性腎臟病，可以引發繼發性高血壓
13. 下列哪種分類的先天性心臟病預後較好？
- (A) 複雜型
  - (B) 發紺型
  - (C) 右至左分流的分型
  - (D) 單純型
14. 下列關於主動脈瘤，哪個敘述為非？
- (A) 最常發生在腹主動脈
  - (B) 平常無症狀，但是若剝離時會出現劇烈疼痛
  - (C) 外傷為形成主動脈瘤的病因之一
  - (D) 沒有危險性
15. 關於心房纖維顫動的併發症，下列何者為非？
- (A) 腦栓塞
  - (B) 缺血性腸壞死
  - (C) 心臟衰竭
  - (D) 肝腦病變

16. 以下為容易感染心內膜炎的族群，哪一個是錯誤的？
- (A) 毒品注射者
  - (B) 風濕性心臟病
  - (C) 心臟瓣膜疾病
  - (D) 缺血性心臟病
17. 痛風是因身體代謝異常，導致以下何種物質沉積在關節所造成的疾病？
- (A) Hb
  - (B) Creatinine
  - (C) Uric Acid
  - (D) GPT
18. 以下有關人類免疫缺乏病毒(HIV)的敘述何者是最合理的？
- (A) HIV 抗體檢查若是陽性，代表已經發病，患者已經有症狀出現
  - (B) HIV 從感染到發病最多 2 年
  - (C) 血友病與 B 肝帶原患者，感染 HIV 的機會較一般人高
  - (D) 輸血的血液都經過嚴格檢查，所以不會有感染 HIV 的機會
19. 以下有關類風溼性因子(Rheumatoid Factor--RF) 敘述何者是對的？
- (A) RF 是一種抗原，會造成疾病產生
  - (B) RF 只存在類風溼性關節炎的患者
  - (C) RF 檢查陽性者，就表示罹患類風溼性關節炎
  - (D) RF 是用來診斷是否罹患類風溼性關節炎檢驗之一
20. 以下何者疾病在血液常規的檢查中，一般不會出現小球性的紅血球？
- (A) 急性出血性貧血
  - (B) 地中海型貧血
  - (C) 缺鐵性貧血
  - (D) 慢性出血性貧血
21. 以下有關白血球敘述，何者是錯的？
- (A) 白血球主要是在骨髓中製造產生
  - (B) 白血球是人體對抗感染性微生物的物質之一
  - (C) 嗜中性球(Neutrophils)主要功能是吞噬外來病原的作用
  - (D) 在感染性疾病的急性期，白血球主要表現是嗜鹼性球(Basophils) 會大量增加，吞噬病原

22. 以下有關血小板敘述，何者是錯的？
- (A) 血小板是在血管中生成的
  - (B) 血小板最重要的功能是凝血作用
  - (C) 脾切除時，血液中常會有血小板增多現象
  - (D) 自體免疫性疾病時，血小板常會有減少現象
23. 以下有關骨髓炎的敘述，何者是錯的？
- (A) 是骨骼及骨髓腔的感染發炎性疾病
  - (B) 兒童急性骨髓炎常常是由血行性感染所致的
  - (C) 成人的骨髓炎一定是骨折所致
  - (D) 免疫力低下者，是骨髓炎常見的原因之一
24. 坐骨神經痛最常見原因，是因以下何部位有病變而發生？
- (A) 頸椎
  - (B) 胸椎
  - (C) 腰椎
  - (D) 股骨
25. 下列有關於「肺氣腫 (Pulmonary Emphysema)」的敘述，何者最正確？
- (A) 氣管支氣管樹 (Tracheobronchial tree) 對多樣性的刺激產生異常過度反應
  - (B) 至少連續二年，每年至少有三個月，幾乎每天持續性地有痰和黏液的咳
  - (C) 指肺腺泡 (Pulmonary acinus) 呈現永久破壞性的擴張
  - (D) 長期吸入有機或無機粉塵 (Organic or inorganic dust) 導致肺部發炎纖維化
26. 下列針對「鹿角結石 (Staghorn calculi)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 即指膀胱結石
  - (B) 成因與尿道重覆感染無關
  - (C) 有引發敗血症的風險
  - (D) 治療較為簡單

27. 下列針對「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 潛隱性結核病 (Latent tuberculosis) 指有症狀、有感染性的結核病
  - (B) 核保評估時無需考量是否併存其他疾病
  - (C) 「粟粒型結核」與「血行播散型結核」是無關的
  - (D) 胸部 X 光攝影檢查報告為「小的鈣化結節 (Ghon lesion)」屬輕度異常
28. 下列不同型態的腎絲球腎炎，何者預後相對於其他腎絲球腎炎來的佳？
- (A) 局部節段性腎絲球硬化症 (Focal segmental Glomerulosclerosis)
  - (B) 急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎 (Acute poststreptococcal Glomerulonephritis)
  - (C) 狼瘡腎炎 (Lupus nephritis)
  - (D) 膜狀增生性腎絲球腎炎 (Membranoproliferative Glomerulonephritis)
29. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是正確的？
- (A) 無法獲得「肺流量」數據
  - (B) 「肺總量 (Total lung capacity; TLC)」相等於「用力性肺活量 (Forced vital capacity; FVC)」
  - (C) 通氣障礙只有一種型態
  - (D) 「阻塞型通氣障礙」可用「一秒鐘用力吐氣量與用力性肺活量比值 (FEV1/FVC)」評估其嚴重程度
30. 下列針對「糖尿」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 「妊娠性糖尿」主要出現於妊娠前三個月
  - (B) 哺乳期婦女會因乳腺產生過多乳糖而形成糖尿
  - (C) 在檢查前短時間內大量攝食糖質食物為原因之一
  - (D) 「妊娠性糖尿」在分娩後仍有可能消失
31. 下列針對「肺膿瘍 (Lung Abscess)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為肺實質組織炎症性反應
  - (B) 有效抗生素的適時介入使肺膿瘍的發生減少
  - (C) 危險族群不包括正常的咳嗽反射受損或被抑制者
  - (D) 可使用支氣管鏡協助排膿或引流

32. 下列何者為血液「腎功能檢查」之一？
- (A) 血清膽紅素
  - (B) 血清蛋白質
  - (C) 肌酸磷激酵素
  - (D) 肌酸酐廓清率
33. 下列何種肝炎，主要經由污染食物或飲水經口傳染？
- (A) A 型肝炎
  - (B) B 型肝炎
  - (C) C 型肝炎
  - (D) D 型肝炎
34. 下列何者不是  $\alpha$ -胎兒蛋白( $\alpha$ -Fetoprotein;AFP)上升的可能原因？
- (A) 懷孕
  - (B) 急性肝炎發作
  - (C) 惡性畸胎瘤
  - (D) 以上皆可能造成  $\alpha$ -胎兒蛋白上升
35. 下列何者不是嚴重肝硬化的常見表現？
- (A) 腹水
  - (B) 食道靜脈曲張
  - (C) 肝性腦病變
  - (D) 白蛋白升高
36. 下列何者不是造成慢性肝炎的常見原因？
- (A) E 型肝炎
  - (B) C 型肝炎
  - (C) 酗酒
  - (D) B 型肝炎
37. 糖化血色素(HbA1c)係反應最近大約多長時間的血糖平均控制狀況？
- (A) 3 天
  - (B) 2 週
  - (C) 3 個月
  - (D) 1 年



38. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
  - (B) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
  - (C) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 200mg/dl
  - (D) 糖化血色素(HbA1c)超過 6.5%
39. 下列何者不是急性胰臟炎的常見原因？
- (A) 酒精
  - (B) 膽石症
  - (C) 高尿酸血症
  - (D) 高三酸甘油酯症
40. 下列何項檢驗於正常發育中的兒童或青少年，數值會較成年人上升？
- (A) r-GT(Gamma glutamyl transferase 麩胺醯轉移酶)
  - (B) ALK-P(Alkaline phosphatase 鹼性磷酸酶)
  - (C) AFP( $\alpha$ -Fetoprotein 胎兒蛋白)
  - (D) Bilirubin 膽紅素

**貳、複選題 (共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 下列針對「腦性麻痺(Cerebral palsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指腦部神經系統在出生前後受到損傷或病變，使得尚未發育成熟的腦部神經系統受到傷害
  - (B) 會出現不同程度的運動障礙
  - (C) 症狀或徵候甚至會包含視力、聽力、智力、語言等功能出現的問題
  - (D) 因造成腦性麻痺的原因，是一過性或暫時性，而非進行性的，所以通常造成的腦神經傷害程度，也不會持續進行下去
42. 關於腦瘤 (Brain tumor) 核保考量中的有利因素敘述，包括下列何者？
- (A) 良性
  - (B) 手術徹底切除
  - (C) 有遺存神經障礙
  - (D) 無復發

43. 下列哪些疾病可以引發胸痛的症狀？
- (A) 主動脈剝離
  - (B) 胃食道逆流
  - (C) 氣胸
  - (D) 肋間神經痛與帶狀皰疹
44. 以下何者疾病經常與毒品注射相關？
- (A) 心內膜炎
  - (B) 愛滋病
  - (C) 風濕性心臟病
  - (D) 梅毒
45. 以下何狀況可能會造成紫斑症(Purpura)？
- (A) 病毒感染
  - (B) 藥物
  - (C) 抗磷脂症後群
  - (D) 後天免疫不全症候群
46. 以下有關青光眼的敘述何者有誤？
- (A) 青光眼是因為視網膜病變所導致眼壓升高的疾病
  - (B) 造成青光眼失明的原因，主要是因為水晶體混濁
  - (C) 青光眼會導致視神經萎縮，而造成視野缺損
  - (D) 眼球房水製造過多或排出受阻都可能造成青光眼
47. 下列哪些可能是「長期口服類固醇之影響」？
- (A) 免疫力上升
  - (B) 骨質疏鬆
  - (C) 青光眼
  - (D) 兒童生長受抑制
48. 下列哪些是被「腸病毒 71 型」感染後可能造成的併發症？
- (A) 腦神經麻痺
  - (B) GBS 症候群 (Guillain Barre' syndrome)
  - (C) 心肌炎
  - (D) 肺水腫

49. 下列關於高血脂症的描述，何者為非？

- (A) 過度飲酒可能導致三酸甘油酯(TG)上升
- (B) 腎病症候群易導致高密度脂蛋白(HDL)上升
- (C) 吸菸可能導致高密度脂蛋白(HDL)下降
- (D) 糖尿病易致三酸甘油酯(TG)下降

50. 下列關於 B 型肝炎的敘述，何者錯誤？

- (A) B 型肝炎主要經由血液或體液傳染
- (B) AntiHBs 陽性，代表體內 B 型肝炎病毒仍在複製
- (C) HBsAg 陽性，代表對 B 型肝炎已有免疫力
- (D) 無 B 型肝炎抗體之嬰幼兒若遭 B 型肝炎病毒感染，多會變成慢性帶原者