

中華民國人壽保險管理學會
107 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 下列哪些是腦膜炎 (Meningitis)可能的致病因？
 - (A) 病毒，細菌
 - (B) 結核菌
 - (C) 黴菌，寄生蟲
 - (D) 以上皆是

2. 一種根源於免疫系統的問題，它的病因主要是「發生在神經與肌肉的交接處，使得神經無法正常的控制肌肉，影響肌肉的正常功能」，這是描述下列何種疾病？
 - (A) 腎臟類風濕性關節炎(Rheumatic Arthritis)
 - (B) 重症肌無力(Myasthenia Gravis)
 - (C) 阿爾茲海默氏症(Alzheimer' s disease)
 - (D) 腦性麻痺 (Cerebral Palsy)

3. 下列針對「癲癇 (Epilepsy)」的敘述，何者是最正確的？
 - (A) 最嚴重的發作稱為癲癇重積狀態
 - (B) 大約有三分之一到半數以上的患者，無法找到導致癲癇發作確定的原因
 - (C) 癲癇的正確診斷最重要的就是依靠詳細病史
 - (D) 以上皆是

4. 下列何者不是「巴金森氏症(Parkinsonism)」的治療方式？
 - (A) 藥物治療
 - (B) 放射線治療
 - (C) 物理治療
 - (D) 外科手術治療

5. 下列針對「阿爾茲海默氏症(Alzheimer' s disease)」的敘述，何者是正確的？
 - (A) 診斷依據一般以臨床症狀判斷為主，須符合『精神疾病診斷與統計手冊 DSM』失智症診斷標準
 - (B) 藉由臨床失智量表 (Clinical Dementia Rating Scale CDR) 評估
 - (C) 藉由 MMSE (Mini-Mental State Examination 簡易心智量表) 評估，以量化其徵候的嚴重度，作為治療評估、病情追蹤的參考依據
 - (D) 以上皆是

6. 下列針對「神經系統」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 中樞神經系統定義為存在於腦部與脊髓內的神經組織
 - (B) 周邊神經系統定義為存在於腦部與脊髓以外的神經組織
 - (C) 腦神經有 12 對，脊神經有 31 對
 - (D) 脊髓終止於腰椎第五節的高度
7. 下列哪些是坐骨神經痛 (Sciatica) 可能的致病因？
- (A) 外傷、腫瘤壓迫
 - (B) 脊椎椎孔狹窄、脊椎病變
 - (C) 梨狀肌炎
 - (D) A+B
8. 下列針對「水腦症(Hydrocephalus)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦脊髓液源自腦室壁脈絡叢的分泌，當腦脊髓液整個流通過程中有任何不暢通，或是異常分泌過多時，就會造成腦脊髓液的不正常滯留、積聚，久而久之便會使得腦壓增高，腦室擴大，進而會造成神經功能異常的狀態，這就是水腦症
 - (B) 水腦症是可以治療的，一般以外科手術治療為主。手術後腦脊髓液引流管發生阻塞時有所見，因此定期醫療回診追蹤是必須的
 - (C) 先天因素是造成水腦症的唯一原因
 - (D) 以上(A)和(B)均正確
9. 位於左心室與左心房之間的瓣膜叫做？
- (A) 三尖瓣
 - (B) 主動脈瓣
 - (C) 二尖瓣
 - (D) 肺動脈瓣
10. 心臟電傳導的起始點，下列何者為是？
- (A) 竇房結
 - (B) 房室結
 - (C) His 神經束
 - (D) 左右神經束分支

11. 下列有關高血壓，何者敘述有誤？
- (A) 定義是收縮壓 140mmHg 以上，舒張壓 90mmHg 以上
 - (B) 可分為原發性與繼發性兩種，以繼發性高血壓所占比例較大
 - (C) 併發症有腦中風、心衰竭與腎衰竭
 - (D) 腎功能異常的慢性腎臟病，可以引發繼發性高血壓
12. 下列關於主動脈瘤，哪個敘述為非？
- (A) 最常發生在腹主動脈
 - (B) 平常無症狀，但是若剝離時會出現劇烈疼痛
 - (C) 外傷為形成主動脈瘤的病因之一
 - (D) 沒有危險性
13. 有關心臟 X 症候群的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 冠狀動脈攝影顯示有冠狀動脈斑塊阻塞
 - (B) 運動心電圖陽性
 - (C) 有心絞痛症狀
 - (D) 與冠狀動脈痙攣有關
14. 關於血液的組成，下列敘述何者為非？
- (A) 血液由血球與血漿組成
 - (B) 血球中分為紅血球、白血球和血小板
 - (C) 血漿中含量最高的是水
 - (D) 血球中功能為攜帶氧氣者為白血球
15. 關於心房纖維顫動的併發症，下列何者為非？
- (A) 腦栓塞
 - (B) 缺血性腸壞死
 - (C) 心臟衰竭
 - (D) 肝腦病變
16. 以下何者為典型急性心肌梗塞心電圖變化？
- (A) ST 間段下降
 - (B) 立即出現異常 Q 波
 - (C) ST 間段上升
 - (D) P 波延長

17. 頭蓋骨(Cranial bone)不包含以下哪一種骨頭？
- (A) 額骨
 - (B) 顳骨
 - (C) 枕骨
 - (D) 篩骨
18. 以下何者不是脊椎骨的結構名稱？
- (A) 椎體
 - (B) 橫突
 - (C) 棘突
 - (D) 內上髁(Medial epicondyle)
19. 以下何者主要是用來治療視網膜剝離方法？
- (A) 鞏膜扣押植入術
 - (B) 水晶體切除
 - (C) 小樑成型術
 - (D) 隅角切開術
20. 以下有關皮膚疾病的敘述，何者不正確？
- (A) 蜂窩性組織炎(cellulitis)是細菌侵入皮膚所引起之感染性疾病之一
 - (B) 若感染了單純性皰疹病毒，發病時可能引起口角炎
 - (C) 水痘好發於成人，帶狀泡疹好發於小孩
 - (D) 癬病(Tinea)是因黴菌感染所造成的皮膚病
21. 有關人體止血(凝血)機轉，以下何者有誤？
- (A) 受傷時，血管收縮可幫助止血
 - (B) 出血時，血小板可釋放血纖維蛋白原(Fibrinogen)，幫助血液凝固
 - (C) 血友病是先天性凝血因子缺損而導致血液凝固障礙的疾病
 - (D) 溫韋伯氏症(Von Wilbrand Syndrome)是最常見的遺傳性血液凝固異常疾病
22. 以下有關白血病的敘述何者是錯的？
- (A) 白血病俗稱血癌，是因脾臟癌化所引起的疾病
 - (B) 有急慢性之分，若由慢性轉成急性，預後則不佳
 - (C) 骨髓發育不良症候群患者，可能轉變成為白血病的患者
 - (D) 自體免疫疾病患者，比較容易罹患白血病

23. 以下有關淋巴瘤的敘述，何者是對的？
- (A) 是骨髓內淋巴細胞產生癌化的疾病
 - (B) 淋巴瘤是良性疾病，惡性淋巴瘤才是惡性疾病
 - (C) 淋巴瘤大體上可區分何為何杰金氏症與非何杰金氏症，一般非何杰金氏症的預後較差
 - (D) 在何杰金氏症與非何杰金氏症的區分中，台灣淋巴瘤的罹患者以何杰金氏症居多
24. 以下何者不屬於足部骨頭的名稱？
- (A) 距骨
 - (B) 蹠骨
 - (C) 舟狀骨
 - (D) 豌豆骨
25. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可回復性
 - (B) 阻塞性呼吸道疾病
 - (C) 為上呼吸道對多樣性的刺激產生異常過度反應
 - (D) 只出現於兒童和青少年
26. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腎臟衰竭早期的臨床表現
 - (B) 體內血液中的代謝廢物及水份等能有效移除
 - (C) 與急性腎臟衰竭無關
 - (D) 臨床上可視為一種症候群 (Uremic syndrome)
27. 置入「下腔靜脈濾器 (Inferior vena cava filter)」為下列何者疾病的治療方式之一？
- (A) 肺膿瘍 (Lung abscess)
 - (B) 支氣管擴張症 (Bronchiectasis)
 - (C) 肺栓塞 (Pulmonary embolism)
 - (D) 塵肺症 (Pneumoconiosis)

28. 「在腹部造口，利用內視鏡取出在腎盂的結石」為下列「尿石症」手術方式何者之敘述？
- (A) 經皮腎造口術
 - (B) 體外震波碎石術
 - (C) 經皮超音波碎石取出術
 - (D) 傳統腎盂截石術
29. 下列針對「咽與喉 (Pharynx and Larynx)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 鼻咽部 (Nasopharynx) 在鼻腔的正前方
 - (B) 口咽部 (Oropharynx) 在口腔之後的空腔
 - (C) 喉咽部 (Laryngopharynx) 在鼻咽部之上的空腔
 - (D) 喉部不含有聲帶 (Vocal cord)
30. 下列針對「前列腺癌 (Prostatic cancer)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為前列腺的惡性腫瘤
 - (B) A期：癌症無法由觸摸 (直腸指診) 得知
 - (C) 「經尿道前列腺切除術」為手術治療方式之一
 - (D) 血中癌症標記為「CA 15-3 (Cancer antigen 15-3) 癌抗原15-3」
31. 下列針對「鼻咽癌 TNM 分期」的敘述，何者是正確的？
- (A) T₁: 腫瘤侵犯到顱內
 - (B) N₁: 鎖骨上窩有淋巴結轉移
 - (C) M₁: 有遠端轉移
 - (D) 以上選項皆正確
32. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因輸尿管過濾機制受損
 - (B) 蛋白質異常地大量排泄於尿中
 - (C) 血中蛋白質會增加而形成全身性水腫
 - (D) 血中脂肪會減少即低脂血症
33. 幼年期甲狀腺功能低下易導致下列何種疾病？
- (A) 呆小症 (Cretinism)
 - (B) 葛瑞夫氏病 (Graves' disease)
 - (C) 甲狀腺風暴
 - (D) 庫欣氏症候群 (Cushing syndrome)

34. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗(口服75公克葡萄糖)兩小時之血糖超過200mg/dl
 - (C) 驗尿出現尿糖現象
 - (D) 糖化血色素(HbA1c)超過6.5%
35. 下列有關糖尿病的描述，何者為非？
- (A) 口服降血糖藥不適用在第一型糖尿病病人
 - (B) 第一型糖尿病主要發病於中老年人
 - (C) 嚴重的第二型糖尿病病人，亦可能須使用胰島素注射治療
 - (D) 九成以上的糖尿病病人屬於第二型糖尿病
36. 甲狀腺刺激素(TSH)是由下列何腺體分泌？
- (A) 甲狀腺
 - (B) 腎上腺
 - (C) 腦下垂體
 - (D) 副甲狀腺
37. 下列關於肝內結石的描述，何者為非？
- (A) 臺灣的肝內結石約佔所有膽道結石症的 10%
 - (B) 與膽道的細菌、寄生蟲感染以及膽汁滯留有關
 - (C) 肝內結石不一定會產生症狀
 - (D) 肝內結石較膽囊結石容易治療
38. 下列何者是造成慢性胰臟炎的最常見原因？
- (A) 腹部外傷
 - (B) 酗酒
 - (C) 高血壓
 - (D) 高尿酸血症
39. B 肝帶原且體內病毒正在複製的病人，不會出現下列何種血清標記？
- (A) AntiHBs
 - (B) HBV DNA
 - (C) HbeAg
 - (D) HBsAg

40. 下列何者不屬於肝硬化嚴重程度(Child-pugh score)的評估因子？

- (A) 腹水
- (B) 肝性腦病變
- (C) 白蛋白
- (D) 血壓

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 下列針對「精神病 (Psychosis)」的敘述，何者是正確的？

- (A) 精神病是一群精神異常病症的總稱，包括思覺失調症(舊名:精神分裂病)、妄想症、情感性精神病(憂鬱症、躁鬱症)、器質性精神疾病等
- (B) 精神病病人對於自己的異常狀態常缺乏病識感，導致患者往往覺得自己並沒有病，拒絕主動尋求醫療，甚至他人的幫助
- (C) 自殺是憂鬱症、躁鬱症的最大問題
- (D) 「器質性精神病」是腦部因疾病、藥物、酒精、創傷、代謝異常等，造成腦組織病變，所引起的腦部功能障礙

42. 下列針對酒精或藥物濫用成癮(Alcoholism, Drug abuse)的敘述，何者是正確的？

- (A) 需由精神科醫師作專業診療及鑑別診斷
- (B) 此症不易戒斷，易復發
- (C) 此症易造成失能及意外事故
- (D) 易造成次發性精神疾病及身體多器官的病變

43. 貧血的病因，下列何者是正確的？

- (A) 造血原料缺乏，如缺鐵
- (B) 缺乏維他命 B12 或葉酸
- (C) 腎臟疾病
- (D) 消化道出血

44. 水腫的病因，下列何者是正確的？

- (A) 心臟衰竭
- (B) 腎臟病
- (C) 肝臟病
- (D) 淋巴阻塞

45. 以下有關膽脂瘤(Cholesteatoma)的敘述何者是對的？
- (A) 膽脂瘤可造成內耳炎發生
 - (B) 膽脂瘤會造成嚴重黃疸
 - (C) 慢性乳突炎可合併膽脂瘤形成
 - (D) 膽脂瘤是肝硬化常見的併發症
46. 有關視神經病變的敘述，以下何者是對的？
- (A) 酒精中毒，甲醇均可能造成視神經病變
 - (B) 視神經炎常與多發性硬化症相關
 - (C) 白內障是導致視神經病變而造成失明最常見的原因之一
 - (D) 視神經病變可導致視野缺損而造成視障
47. 下列針對「肺臟」的敘述，何者是正確的？
- (A) 位於胸腔中
 - (B) 可分成很多的肺葉 (lobe) (右邊肺臟有三個肺葉，左邊肺臟有兩個肺葉)
 - (C) 每一個肺葉可再分成更小的單位，稱為區段 (segment)
 - (D) 肺泡為肺臟組織之一
48. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 功能變化不受荷爾蒙影響
 - (B) 巧克力囊腫為子宮內膜組織侵入子宮肌層中
 - (C) 為慢性骨盆腔疼痛的原因之一
 - (D) 可以腹腔鏡或剖腹式手術移除
49. 下列關於副甲狀腺的描述，何者為非？
- (A) 人體的副甲狀腺，分為左右兩葉，互相連接
 - (B) 副甲狀腺激素的主要功能是調節鈉與鉀的平衡
 - (C) 抽筋為副甲狀腺功能低下常見的症狀
 - (D) 尿毒症可能引起副甲狀腺功能亢進
50. 下列關於肝炎的敘述，何者正確？
- (A) D型肝炎病毒是一種缺陷性RNA病毒，只能在已患有C型肝炎者間造成感染
 - (B) 得過A型肝炎的患者，多會產生終身免疫
 - (C) A型肝炎是台灣導致肝癌的主要病因之一
 - (D) E型肝炎主要係經口傳染