

**中華民國人壽保險管理學會**  
**104 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、 單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)**

1. 85%的高血壓原因不明，稱為原發性高血壓。15%的高血壓是有可能找到原因的，稱為續發性高血壓。下列何者不是常見的原因？
  - (A) 腎臟病
  - (B) 心臟疾病
  - (C) 肺臟疾病
  - (D) 內分泌疾病
  
2. 在休息時或半夜發作，與冠狀動脈痙攣有關，冠狀動脈攝影檢查通常無血管狹窄，發作時心電圖呈現 ST 節段上升。請問此是何類型的缺血性心臟病？
  - (A) 穩定型心絞痛
  - (B) 不穩定型心絞痛
  - (C) 變異型心絞痛
  - (D) 心肌梗塞
  
3. 風濕性心臟病的好發年齡和對象為下列何者？
  - (A) 5 至 15 歲兒童
  - (B) 30 至 50 歲中年婦女
  - (C) 20 至 40 歲女性
  - (D) 20 至 40 歲男性
  
4. 下列針對「依解剖病理學角度，乃指終末細支氣管遠端的肺組織，呈現永久破壞性的擴張，併伴有肺泡壁破裂及彈性組織損傷，造成肺彈性回縮力的喪失和呼吸道的塌陷與阻塞」的敘述，何者是正確的？
  - (A) 氣喘
  - (B) 慢性支氣管炎
  - (C) 氣管擴張症
  - (D) 肺氣腫

5. 下列何者不是「肺栓塞」的危險因子？
- (A) 長期臥床者
  - (B) 酗酒者
  - (C) 肥胖者
  - (D) 吸菸者
6. 下列針對「C型肝炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 台灣的C型肝炎大多於成年期由血液或體液途徑傳染
  - (B) 感染C型肝炎後大多症狀輕微，但其中五成以上會發展成慢性肝炎
  - (C) 感染C型肝炎約20年後即有20%~30%的病人會發展成肝硬化
  - (D) 慢性C型肝炎的標準療法為注射干擾素合併口服抗病毒藥物治療
7. 下列針對「痛風」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因血中尿酸過高，於是在關節腔中形成尿酸沉積，引發急性關節炎
  - (B) 好發於中年女性
  - (C) 高尿酸血症的原因可分為尿酸的排泄減少和產量過多，大部分痛風的患者是因為腎臟尿酸排泄太少
  - (D) 痛風發作時，尿酸值亦可能正常
8. 下列針對「骨髓炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 兒童的急性骨髓炎多由於外傷性所造成
  - (B) 兒童的急性骨髓炎，長骨比較常見
  - (C) 成人的急性骨髓炎，以脊椎最常見
  - (D) 外傷性骨髓炎是目前台灣地區造成慢性骨髓炎的主要原因
9. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 中國人的盛行率約0.4%，男女比例約為1:2~3
  - (B) 以30~50歲的中年男性比較容易發病
  - (C) 主要的病理變化是所謂的「滑膜炎」
  - (D) 目前醫學仍無法根治類風濕性關節炎

10. 下列針對「全身性紅斑性狼瘡」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 通常發生於 20~40 歲女性
  - (B) 台灣的發生率約為歐美人士的兩倍
  - (C) 其中約 50%以上的人會有關節痛或關節炎
  - (D) 是一個長期慢性會反覆再發的疾病，目前並無法完全治癒
11. 「愛滋病(AIDS)」的病人經常合併特殊的腫瘤，下列何者是錯誤的？
- (A) 卡波西氏肉瘤
  - (B) 腦部淋巴瘤
  - (C) 非何杰金氏淋巴瘤
  - (D) 口腔癌
12. 下列針對「腦性麻痺」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是腦部中樞神經受到傷害所造成的綜合結果
  - (B) 因科技及環境的進步，而使發生率有所減少
  - (C) 會出現不同程度的運動障礙
  - (D) 其他如視力、聽力、智力、語言等功能，也可能出現問題
13. 腦栓塞的栓子最多的是來自下列何者？
- (A) 心臟疾病產生的血栓
  - (B) 血管硬化的斑塊剝落
  - (C) 腫瘤的栓子
  - (D) 骨頭斷裂釋出的脂肪栓子
14. 下列針對「重症肌無力」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種慢性自體免疫疾病
  - (B) 發病的年齡，若在 20~30 歲間，以女性較多
  - (C) 疾病初期僅限於上肢肌肉的無力
  - (D) 作為確定診斷的依據包括血清免疫檢查及肌電圖檢查
15. 下列針對「泌尿系統結石」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 男性發生風險大於女性
  - (B) 發病高峰介於四十至六十歲
  - (C) 有家族史者，罹患機會高
  - (D) 潮濕的氣候或高溫的環境，也增加結石形成的機會

16. 下列針對「再生不良性貧血」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 除了紅血球外，白血球及血小板都有數目不足的現象
  - (B) 亞洲發生率高於美洲及歐洲，可能是暴露於化學毒物機會較高之故
  - (C) 發生的年紀以四十到六十的中年人較多
  - (D) 容易再發，且可能轉變成白血病、淋巴瘤
17. 下列何者不是糖尿病的慢性併發症？
- (A) 血管病變
  - (B) 腎臟病變
  - (C) 肝臟病變
  - (D) 眼睛病變
18. 下列何者不是血脂異常的次發性病因？
- (A) 糖尿病
  - (B) 過度飲酒
  - (C) 甲狀腺亢進症
  - (D) 腎病症候群
19. 下列針對青光眼的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 原發性隅角開放性青光眼是最常見的青光眼型態
  - (B) 隅角開放性青光眼以常慢性型態表現
  - (C) 急性眼壓上升會導致嚴重疼痛，而慢性異常高的眼壓，則造成視神經的損傷
  - (D) 青光眼所造成的視野缺損都是開始於視野中心
20. 下列針對「精神官能症」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一群較輕型的精神疾病，但它不是一種單一的疾病
  - (B) 疾病是多元性的，發生是緩慢進行的
  - (C) 此類病患的精神狀態不會與現實脫離
  - (D) 此類患者不會有自覺病感

21. 依據衛生署公告之國人成年人肥胖度評估標準，當身體質量指數 BMI 在 27 到小於 30 之間的意義是屬於下列何者？
- (A) 體重過重
  - (B) 輕度肥胖
  - (C) 中度肥胖
  - (D) 重度肥胖
22. 關於「尿糖」的核保判讀，下列何者是錯誤的？
- (A) 一般而言，健康者一時攝取 200g 以上的葡萄糖，即可引起尿糖反應
  - (B) 妊娠性糖尿主要出現於妊娠前三個月
  - (C) 在強烈緊張狀態下會出現尿糖反應
  - (D) 使用副腎皮質素時，會因其影響而呈現尿糖反應
23. 目前醫學界利用預估腎絲球過濾率(GFR)來表示腎臟功能受損程度，並將慢性腎臟病分為五期。腎絲球過濾率的測定與下列何者有關？
- (A) 血液尿素氮
  - (B) 血清肌酸酐
  - (C) 血液尿素氮與血清肌酸酐
  - (D) 尿酸
24. 白蛋白與球蛋白的比值，可用於迅速判斷白蛋白與球蛋白的關係，了解體內蛋白代謝的狀況。下列何種疾病不會造成白蛋白與球蛋白的比值(A/G)倒置？
- (A) 肝硬化
  - (B) 慢性活動性肝炎
  - (C) 系統性紅斑性狼瘡
  - (D) 腎病症候群
25. 「能反應肝細胞病變及酒精性肝病的程度，尤其在酒精性肝障礙時，更能顯出其極特定性，故在診斷酒精性肝病變上頗具意義」是指下列何項檢查？
- (A) 天門冬氨酸轉胺酶(AST；SGOT)
  - (B) 丙氨酸轉胺酶(ALT；SGPT)
  - (C) 珈瑪-麥醯氨轉移酶(GGT)
  - (D) 乳酸脫氫酶(LDH)

26. 血清酵素的澱粉酶和脂肪酶上升到正常值的3倍以上，若再加上典型的腹痛，則可確定診斷為下列何項疾病？
- (A) 急性腹膜炎
  - (B) 急性胰臟炎
  - (C) 急性膽囊炎
  - (D) 急性肝炎
27. 下列針對「甲型胎兒球蛋白(AFP)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 嬰兒直到一歲時才跟正常人一樣維持著正常的低濃度，而不會完全消失
  - (B) 婦女於分娩後約3週即恢復正常
  - (C) 由於缺乏特定性，所以並不適合用於一般肝癌篩檢
  - (D) 在末期肝癌患者中，AFP的數值均會出現上升
28. 一般在人壽保險的危險評估上，常用的甲狀腺功能檢查項目有：三碘甲狀腺(T3)、四碘甲狀腺(T4)及甲狀腺刺激賀爾蒙(TSH)等。下列何者是「甲狀腺機能亢進的鑑定」？
- (A) T3與T4增加，TSH增加
  - (B) T3與T4增加，TSH低下
  - (C) T3與T4減少，TSH增加
  - (D) T3與T4減少，TSH低下
29. 當發生心肌梗塞時，心肌壞死的部位，會有三種主要的酵素升高：一、肌酸磷激酵素(CPK)，二、乳酸脫氫酵素(LDH)，三、天門冬氨酸轉酶(AST or SGOT)。它們出現在血液中的次序，下列何者是正確的？
- (A) CPK→LDH→AST(SGOT)
  - (B) CPK→AST(SGOT) →LDH
  - (C) AST(SGOT) →LDH→CPK
  - (D) AST(SGOT) →CPK→LDH
30. 下列何項「腫瘤標記」檢查，對卵巢癌有非常高的敏感性，故目前此檢查已成為篩選檢查或病程觀察、治療效果判定的重要指標？
- (A) 癌胚抗原(CEA)
  - (B) 甲型胎兒球蛋白(AFP)
  - (C) 癌抗原 125(CA125)
  - (D) 癌抗原 15-3(CA15-3)

31. 白血球依其形態共分為五種球，其中約佔白血球總數的 60%~70%的是下列何者？
- (A) 嗜中性球
  - (B) 嗜酸性球
  - (C) 嗜鹼性球
  - (D) 淋巴球
32. 心肌梗塞時，由心電圖的檢查，可發現病人在病程中的變化，當發展到梗塞永久形成時，可以見到下列何者異常永久存在？
- (A) P 波
  - (B) Q 波
  - (C) T 波
  - (D) ST 節段
33. 下列針對「影響體溫的因素」，何者是錯誤的？
- (A) 進食前因基礎代謝低，所以體溫低
  - (B) 人體通常在清晨起床時體溫最低，在傍晚時體溫最高
  - (C) 老人體溫通常較低，這是由於皮下組織循環不良，傳導度小的因素
  - (D) 女性在月經至排卵這段期間，體溫則較低。另外，在懷孕前 4 個月體溫也較低
34. 「大腸激躁症(irritable bowel syndrome)」會造成便秘，常與腹瀉交互發生。請問它是屬於何種便秘？
- (A) 醫源性便秘
  - (B) 直腸性便秘
  - (C) 弛緩性便秘
  - (D) 痙攣性便秘
35. 下列「細菌性食物中毒」，何者最為嚴重？
- (A) 金黃色葡萄球菌
  - (B) 大腸桿菌
  - (C) 沙門氏菌
  - (D) 腸炎弧菌



36. 惡性腫瘤中以者為最容易引起皮膚搔癢？
- (A) 肺癌
  - (B) 肝癌
  - (C) 結腸直腸癌
  - (D) 何杰金氏病
37. 「右心衰竭」會阻礙體靜脈循環，使血液鬱積。下列何者不是右心衰竭之症狀？
- (A) 周邊組織水腫
  - (B) 肝腫大
  - (C) 肺水腫
  - (D) 脾腫大
38. 「骨質疏鬆症」容易造成患者骨折，下列何者不是好發的部位？
- (A) 脊椎
  - (B) 手腕部
  - (C) 髖部
  - (D) 足踝部
39. 下列何者不是「巴金森氏病」的三大典型症狀？
- (A) 靜止性震顫
  - (B) 記憶力衰退
  - (C) 僵直
  - (D) 運動不能
40. 子宮外孕是指受精卵在子宮腔外以外著床發育。下列何者是最常著床的部位？
- (A) 輸卵管
  - (B) 卵巢
  - (C) 腹膜
  - (D) 子宮頸

**貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 下列哪些是竇性心跳過速(Sinus Tachycardia)的病因或危險因子？
- (A) 正常生理反應，例如運動和情緒變化
  - (B) 發燒
  - (C) 貧血
  - (D) 心臟衰竭
42. 下列哪些是胰臟炎的可能致病原因？
- (A) 膽石症
  - (B) 酒精
  - (C) 高三酸甘油酯血症
  - (D) 肥胖
43. 癲癇發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象。下列哪些是核保考量的有利因素？
- (A) 無癲癇重積狀態的病史
  - (B) 發作型態為小發作
  - (C) 開始發病時間在中老年期
  - (D) 突發特定因素所造成的急性症狀性發作
44. 下列哪些腦瘤，多以良性瘤居多？
- (A) 星狀細胞瘤
  - (B) 腦膜瘤
  - (C) 聽神經瘤
  - (D) 腦下垂體瘤
45. 下列哪些是「乳漏症(Galactorrhea)」的病因或危險因子？
- (A) 腦下垂體腫瘤
  - (B) 甲狀腺疾病
  - (C) 慢性腎衰竭
  - (D) 下視丘病變

46. 下列哪些情形是可能接受臨床治療後，再來體檢的情況？
- (A) 舒張壓在臨界正常值或略高，而其脈壓在 30mmHg 以下者
  - (B) 不同天的血壓值，其較低之血壓值低於較高血壓值的 85% 以下者
  - (C) 當天的脈搏數較另一天為低，且脈搏數超過正常值的 20 次/分以下者
  - (D) 血壓值在高或臨界高血壓，且脈搏數高於 60 次/分者
47. 下列針對「血清膽紅素」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 阻塞性黃疸時，僅直接膽紅素增高
  - (B) 溶血性黃疸時，直接膽紅素與間接膽紅素都增高
  - (C) 膽道發炎時，僅直接膽紅素增高
  - (D) 重度燒傷時，僅間接膽紅素增高
48. 依據「代謝症候群」的定義，下列哪些是危險因子？
- (A) 男性腰圍超過 90 公分，女性腰圍超過 80 公分
  - (B) 高密度脂蛋白膽固醇過低：男性 <40mg/dl；女性 <50mg/dl
  - (C) 總膽固醇值上升  $\geq 200$ mg/dl
  - (D) 三酸甘油脂值上升  $\geq 150$ mg/dl
49. 下列針對「肝炎」的敘述，哪些是正確的？
- (A) A 型及 E 型肝炎的傳染途徑為口糞傳染
  - (B) D 型肝炎病毒是一種有缺陷的 RNA 病毒
  - (C) A 型及 E 型肝炎不會演變為慢性肝炎
  - (D) A 型及 B 型肝炎有疫苗，C 型肝炎沒有疫苗
50. 下列針對「僵直性脊椎炎」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 好發於女性
  - (B) 好發作年齡在 40~50 歲
  - (C) 會造成葡萄膜炎及虹彩炎，可能會導致失明
  - (D) X 光檢查有薦腸關節炎(骨盆與脊椎交接處)