

中華民國人壽保險管理學會
104 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、 單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 85%的高血壓原因不明，15%的高血壓是有可能找到原因的，稱為續發性高血壓。下列何者是引起高血壓最常見的原因？
 - (A) 腎臟病
 - (B) 內分泌疾病
 - (C) 心臟疾病
 - (D) 血管硬化

2. 下列何者與「缺血性心臟病」的預後無關？
 - (A) 冠狀動脈的狹窄程度
 - (B) 右心室功能
 - (C) 左心室功能
 - (D) 血管硬化危險因子多寡

3. 下列針對「風濕性心臟病」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 好發年齡為 20 至 30 歲的成年人
 - (B) 心臟發炎的位置包括心包膜、心臟肌肉及心內膜
 - (C) 病因與特定的鏈球菌感染有關
 - (D) 會造成心臟瓣膜狹窄及/或閉鎖不全

4. 先天性心臟病可分為發紺型與非發紺型心臟病。下列何者是「發紺型心臟病」？
 - (A) 心室中膈缺損
 - (B) 心房中膈缺損
 - (C) 開放性動脈導管
 - (D) 大血管轉位

5. 下列的敘述「為一慢性炎症性、陣發性、可回復性的阻塞性呼吸道疾病，特徵為下呼吸道，即氣管支氣管樹對多樣性的刺激產生異常過度反應。」是指何者？
 - (A) 氣喘
 - (B) 慢性支氣管炎
 - (C) 支氣管擴張症
 - (D) 肺氣腫

6. 下列何者不是「肺栓塞」的危險因子？
- (A) 長期臥床者
 - (B) 肥胖者
 - (C) 吸菸者
 - (D) 酗酒者
7. 「潰瘍性大腸炎」是一種慢性炎症大腸炎，下列何者是最常被侵犯的位置？
- (A) 升結腸
 - (B) 橫結腸
 - (C) 降結腸
 - (D) 直腸
8. 「慢性胰臟炎」最常見的原因是何者？
- (A) 膽石症
 - (B) 酗酒
 - (C) 高三酸甘油酯血症
 - (D) 胰管異常或阻塞
9. 下列何型肝炎病毒是一種缺陷性 RNA 病毒？
- (A) A 型
 - (B) B 型
 - (C) C 型
 - (D) D 型
10. 下列針對「椎間盤突出」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 椎間盤是由外環的纖維環和中央的髓核所組成
 - (B) 好發於 20 歲到 50 歲的女性
 - (C) 在頸椎以 C5~C6 發生率最多
 - (D) 在腰椎則以 L4~L5 及 L5~S1 最多

11. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種慢性、進行性、發炎性的疾病
 - (B) 是一種全身性自體免疫疾病
 - (C) 最常出現的病灶部位是「對稱」性的膝關節
 - (D) 目前醫學仍無法根治類風濕性關節炎
12. 「愛滋病(AIDS)」的病人經常合併特殊的腫瘤，下列何者是錯誤的？
- (A) 卡波西氏肉瘤
 - (B) 腦部淋巴瘤
 - (C) 非何杰金氏淋巴瘤
 - (D) 白血病
13. 下列何者是「病理上顯示這類病患的中腦黑質所分泌多巴胺的細胞大量減少」？
- (A) 巴金森氏症
 - (B) 阿爾茲海默氏症
 - (C) 腦性麻痺
 - (D) 水腦症
14. 下列針對「腦膜炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腦膜炎常見於老年人
 - (B) 腦膜炎的致病因以病毒感染較為常見，其次是細菌感染
 - (C) 病毒性腦膜炎的復原較好
 - (D) 細菌性腦膜炎易造成後遺症
15. 「腎絲球過濾率預測值(eGFR)」為 $20\text{ml}/\text{min}/1.73\text{ m}^2$ ，請問是屬於慢性腎臟疾病分期的第幾期？
- (A) 第二期
 - (B) 第三期
 - (C) 第四期
 - (D) 第五期

16. 「免疫性血小板缺乏紫斑症」的病因未明，下列何者不是可能的原因？
- (A) 病毒感染
 - (B) 大量放射線照射
 - (C) 自體免疫疾病
 - (D) 後天免疫疾病
17. 下列針對「血友病」流行病學的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 血友病 A 及血友病 B 皆屬 X-染色體性聯隱性遺傳疾病，故影響以女性為主
 - (B) 血友病 C 及溫韋伯氏疾病皆為體染色體遺傳性疾病，故男女均可能受到影響
 - (C) 一般血友病 A 的盛行率高於血友病 B
 - (D) 血友病 C 的盛行率低於血友病 A 及血友病 B
18. 「淋巴瘤」即為淋巴癌，大體上可分為「何杰金氏症」和「非何杰金氏症」兩類。下列何類型的淋巴瘤預後最好？
- (A) 第一期何杰金氏淋巴瘤
 - (B) 第二期何杰金氏淋巴瘤
 - (C) 第一期非何杰金氏淋巴瘤
 - (D) 第二期非何杰金氏淋巴瘤
19. 下列何者是目前造成已開發國家最常見的視力障礙原因？
- (A) 青光眼
 - (B) 白內障
 - (C) 視網膜剝離
 - (D) 視神經病變
20. 「智能障礙」多使用智力測驗，作為臨床上智能障礙的標準檢測及區分嚴重程度的工具。智商鑑定若採用魏氏兒童或成人智力測驗時，一位保戶的智商為 50，則屬於下列何者？
- (A) 極重度智能障礙
 - (B) 重度智能障礙
 - (C) 中度智能障礙
 - (D) 輕度智能障礙

21. 任何一項醫學檢驗項目的結果都可能出現「真陽性」、「偽陽性」、「真陰性」、「偽陰性」等四種結果，其中何者將使承保決定「過重」？
- (A) 真陽性
 - (B) 偽陽性
 - (C) 真陰性
 - (D) 偽陰性
22. 依據衛生署公告之國人成年人肥胖度評估標準，男女性腰圍超過幾公分則應視為肥胖？
- (A) 男性 90 公分，女性 85 公分
 - (B) 男性 85 公分，女性 80 公分
 - (C) 男性 95 公分，女性 85 公分
 - (D) 男性 90 公分，女性 80 公分
23. 下列何者不屬於「意外或偽陽性蛋白尿」？
- (A) 腎炎
 - (B) 膀胱炎
 - (C) 前列腺炎
 - (D) 陰道的排出物
24. 白蛋白與球蛋白的比值，可用於迅速判斷白蛋白與球蛋白的關係，了解體內蛋白代謝的狀況。下列何種疾病不會造成白蛋白與球蛋白的比值(A/G)倒置？
- (A) 肝硬化
 - (B) 慢性活動性肝炎
 - (C) 系統性紅斑性狼瘡
 - (D) 腎病症候群
25. 肝臟血清酵素可分為「肝細胞壞死標記」及「膽汁阻塞標記」，下列何者不是「肝細胞壞死標記」？
- (A) 天門冬氨酸轉胺酶(AST；SGOT)
 - (B) 丙氨酸轉胺酶(ALT；SGPT)
 - (C) 珈瑪-麥醯氨轉移酶(GGT)
 - (D) 乳酸脫氫酶(LDH)

26. 下列哪一項的檢測可篩檢出潛伏性罹患糖尿病的人，更可使平日不注意飲食控制，而於體檢前嚴格控制飲食，使得血糖體檢值正常的被保險人「現形」？
- (A) 飯前血糖
 - (B) 飯後血糖
 - (C) 葡萄糖耐量試驗
 - (D) 糖化血紅素
27. 一般在人壽保險的危險評估上，常用的甲狀腺功能檢查項目有：三碘甲狀腺素(T3)，四碘甲狀腺素(T4)及甲狀腺刺激荷爾蒙(TSH)等。下列何者是「甲狀腺機能亢進的鑑定」？
- (A) T3 與 T4 增加，TSH 增加
 - (B) T3 與 T4 增加，TSH 低下
 - (C) T3 與 T4 減少，TSH 增加
 - (D) T3 與 T4 減少，TSH 低下
28. 下列何者是發生「心肌梗塞」後第一個上升的酵素？
- (A) 天門冬氨酸轉胺酶(AST；SGOT)
 - (B) 丙氨酸轉胺酶(ALT；SGPT)
 - (C) 肌酸磷酸激酶(CPK；CK)
 - (D) 乳酸脫氫酶(LDH)
29. 下列何項「腫瘤標記」檢查對乳癌的診斷，具有很高的特定性，因此廣泛地運用在乳癌的篩選檢查上？
- (A) 甲型胎兒球蛋白(AFP)
 - (B) 癌胚抗原(CEA)
 - (C) 癌抗原 125(CA125)
 - (D) 癌抗原 15-3(CA15-3)
30. 下列何者不是造成「淺色性小紅血球貧血群」的原因？
- (A) 缺鐵性貧血
 - (B) 地中海型貧血
 - (C) 再生不良性貧血
 - (D) 鉛中毒

31. 胸部 X 光片心臟方面的檢查，「心胸比例(Cardiothoracic ratio；CTR)」指下列何者？
- (A) (心臟縱徑最大長度)除以(胸廓最小內徑)
 - (B) (心臟橫徑最短長度)除以(胸廓最小內徑)
 - (C) (心臟縱徑最大長度)除以(胸廓最大內徑)
 - (D) (心臟橫徑最大長度)除以(胸廓最大內徑)
32. 「深吸氣至肺總量位後以最大用力、最快速所能呼出的全部氣量」的敘述是指下列何者？
- (A) 潮氣容積(Tidal volume)
 - (B) 用力肺活量(Forced vital capacity)
 - (C) 第一秒呼氣量(Forced expiratory volume in one second)
 - (D) 肺總量(Total lung capacity)
33. 下列何者會造成「食道靜脈瘤出血」？
- (A) 肝硬化
 - (B) 腎硬化
 - (C) 胃潰瘍
 - (D) 十二指腸潰瘍
34. 下列針對「體內參與止血的相關因素」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 血管及其鄰近的結締組織
 - (B) 血小板
 - (C) 凝血因子
 - (D) 紅血球
35. 下列何型肝炎沒有疫苗，可以使用干擾素治療？
- (A) A 型肝炎
 - (B) B 型肝炎
 - (C) C 型肝炎
 - (D) E 型肝炎

36. 下列何者不是屬於「急性腎衰竭」的腎前因素？
- (A) 輸尿管阻塞
 - (B) 腸胃道液體大量流失
 - (C) 休克
 - (D) 肝腎症候群
37. 貝爾氏麻痺是顏面神經麻痺的一種。下列針對「貝爾氏麻痺」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 貝爾氏麻痺是一種中樞性神經麻痺
 - (B) 好發於 20~40 歲的男性
 - (C) 因侵犯顏面神經單側運動枝所引起
 - (D) 可能與病毒感染引起神經發炎有關
38. 下列針對「痛風」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因尿酸結晶鹽沉積在關節與組織中，而導致急性發作
 - (B) 典型發作多由上肢遠端關節開始
 - (C) 每次發作都在晚上，並傾向多關節性
 - (D) 台灣地區以 20~40 歲的罹患人數最多
39. 下列何者不是「梅尼爾氏症」的三大典型症狀？
- (A) 耳朵腫痛
 - (B) 眩暈
 - (C) 聽力障礙
 - (D) 耳鳴
40. 下列何者是台灣「新生兒篩檢」發生率最高的疾病？
- (A) 先天性甲狀腺功能低下症
 - (B) 苯酮尿症
 - (C) 半乳糖血症
 - (D) 葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症(蠶豆症)

貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 透過肺功能檢查，可將通氣障礙的型態分為阻塞型通氣障礙、侷限性通氣障礙和混合型通氣障礙。下列哪些是屬於阻塞型通氣障礙？
- (A) 慢性支氣管炎
 - (B) 肺氣腫
 - (C) 支氣管性氣喘
 - (D) 肺纖維症
42. GOT(又稱為 AST)、GPT(又稱為 ALT)為最主要的兩項肝功能驗血檢查項目，GPT 在肝臟中含量最高；而 GOT 則廣泛存在於除了肝臟以外的哪些器官細胞中？
- (A) 心臟
 - (B) 骨骼肌肉
 - (C) 肺臟
 - (D) 腎臟
43. 根據 1997 年美國風濕醫學會制訂的診斷要件，必須同時或陸續符合 11 項診斷要件中至少四項，即可診斷為全身性紅斑性狼瘡。下列哪些包括在這 11 項診斷要件中？
- (A) 口腔潰瘍
 - (B) 肝臟病變
 - (C) 腎臟病變
 - (D) 神經精神病變
44. 下列哪些是「腎病症候群」的診斷標準？
- (A) 二十四小時蛋白尿定量大於 3~3.5 克
 - (B) 周邊水腫的臨床表徵
 - (C) 高血壓
 - (D) 高脂血症和脂質尿

45. 腦下垂體位於顱底蝶骨的蝶鞍內，大小約 1 立方公分，重量不到 1 公克，分為前後兩葉。下列哪些是前葉分泌的激素？
- (A) 生長激素
 - (B) 泌乳激素
 - (C) 抗利尿激素
 - (D) 催產素
46. 下列哪些情形是可能接受臨床治療後，再來體檢的狀況？
- (A) 舒張壓在臨界正常值或略高，而其脈壓在 30mmHg 以下者
 - (B) 不同天的血壓值，其較低之血壓值低於較高血壓值的 85%以下者
 - (C) 當天的脈搏較另一天為低，且脈搏數超過正常值值的 20 次/分以下者
 - (D) 血壓值在高或臨界高血壓，且脈搏數高於 60 次/分者
47. 下列針對「血液尿素氮(BUN; Blood Urea Nitrogen)」的敘述，哪些是正確的？
- (A) 消化道出血時，流入腸管的大量紅血球及血清蛋白被分解，而使尿素合成增加，造成血中尿素氮升高
 - (B) 必須要瞭解 BUN 的測定值會因飲食、蛋白質攝取量及年齡等的變動而產生差異
 - (C) BUN 測定能作為早期腎功能指標
 - (D) 在危險評估上，對 BUN 的值在正常上限值 2 倍以上者，則暗示此一被保險人的腎功能顯著不良，故應考慮於以婉拒
48. 黃疸的型態可分為阻塞性黃疸(肝後性黃疸)、肝細胞性黃疸和溶血性黃疸(肝前性黃疸)。下列哪些屬於溶血性黃疸？
- (A) 重度燒傷
 - (B) 地中海型貧血
 - (C) 敗血症
 - (D) 膽結石

49. 下列哪些疾病會造成「病態性肥胖」？

- (A) 褐色細胞瘤
- (B) 甲狀腺功能低下
- (C) 庫欣氏症
- (D) 胰島細胞瘤

50. 下列哪些疾病會造成「原發性骨質疏鬆症」？

- (A) 退化性骨質疏鬆
- (B) 庫欣氏症
- (C) 甲狀腺功能亢進
- (D) 副甲狀腺功能亢進