

中華民國人壽保險管理學會
106 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下何種器官異常時會導致維他命 K 不足，而有凝血功能異常現象？
 - (A) 腎臟
 - (B) 肝臟
 - (C) 心臟
 - (D) 脾臟

2. 以下何種部位衰竭，會引起再生不良性貧血(Aplastic Anemia)？
 - (A) 腎臟
 - (B) 心臟
 - (C) 肝臟
 - (D) 骨髓

3. 以下何者是體染色體隱性遺傳疾病？
 - (A) 地中海型貧血
 - (B) 先天性梅毒
 - (C) 血友病
 - (D) 何杰金氏症

4. 雷諾氏現象(Raynaud' s phenomenon)是以下何種原因造成？
 - (A) 肺部通氣量不足
 - (B) 肢體血液循環不良，造成發紺的現象
 - (C) 硫血紅素血症
 - (D) 心臟血流不足

5. 有關淋巴瘤以下何者是錯誤的？
 - (A) 是一種癌症
 - (B) 大體上可分為何杰金氏症和非何杰金氏症
 - (C) 是淋巴系統的細胞癌化
 - (D) 病變只發生在淋巴結

6. 以下何者是常見造成神經性休克的原因？
- (A) 心臟衰竭
 - (B) 脊髓損傷
 - (C) 腦膜炎
 - (D) 敗血症
7. 有關地中海型貧血以下何者是錯的？
- (A) 以甲型(α 型)居多
 - (B) 是血紅素內的血球蛋白製造不足所致
 - (C) 血紅素 H 病(HbH)會有重度的貧血，常發生胎死腹中
 - (D) 嚴重貧血者可能須輸血，打排鐵劑
8. 有關原發性血小板缺乏紫斑症(ITP)，以下何者敘述是錯的？
- (A) 是最常見發生紫斑症的原因
 - (B) 病毒、藥物都可以造成此病發生
 - (C) 單純血小板缺乏與免疫系統無關
 - (D) 輕度者不一定需要治療，可自然痊癒
9. 有關冠狀動脈敘述以下何者是錯的？
- (A) 冠狀動脈分左、右、下三條
 - (B) 當冠狀動脈完全阻塞時，會造成心肌梗塞
 - (C) 當冠狀動脈痙攣時，可造成狹心症
 - (D) 高密度脂蛋白過低時，會造成冠狀動脈硬化
10. 以下何者為典型急性心肌梗塞心電圖變化？
- (A) S-T 間段下降
 - (B) 立即出現異常 Q 波
 - (C) S-T 間段上升
 - (D) P 波延長
11. 有關心臟衰竭以下何者是錯的？
- (A) 若是左心衰竭，肺臟的血液循環會受影響
 - (B) 阻塞性肺病會導致心肺症，此時會先發生左心衰竭
 - (C) 心肌疾病，心臟瓣膜疾病都會導致心衰竭
 - (D) 甲狀腺亢進可導致心衰竭

12. 以下何者是發紺型先天性心臟病？
- (A) Ebstein 異常(Ebstein's anomaly)
 - (B) 肺動脈輕度狹窄
 - (C) 開放性動脈導管
 - (D) 主動脈狹窄
13. 有關主動脈血管瘤何者是對的？
- (A) 是為增生性腫瘤，必須迅速切除治療
 - (B) 降主動脈的血管瘤，常會造成冠狀動脈缺血
 - (C) 升主動脈血管瘤預後較降主動脈血管瘤佳
 - (D) 年紀較大的男性居多，可經導管支架治療
14. 以下何者之骨頭形狀是屬於扁平骨？
- (A) 骨盆骨
 - (B) 腓骨
 - (C) 肱骨
 - (D) 腕骨
15. 以下何者不是構成膝關節的骨頭？
- (A) 脛骨
 - (B) 髌骨
 - (C) 距骨
 - (D) 股骨
16. 有關類風溼性關節炎以下何者是對的？
- (A) 可造成風溼性心臟病
 - (B) 以年青女性最常見
 - (C) 主要是侵犯關節軟骨而造成關節變形
 - (D) 可合併血管炎而有全身症狀
17. 下列何者是造成肢端肥大症的主要原因？
- (A) 青春期前生長激素(GH)分泌過少
 - (B) 青春期前生長激素(GH)分泌過多
 - (C) 青春期後生長激素(GH)分泌過少
 - (D) 青春期後生長激素(GH)分泌過多

18. 下列關於泌乳素(Prolactin)的描述，何者為非？
- (A) 主要由腦下垂體分泌
 - (B) 泌乳激素過低易引發乳漏症
 - (C) 泌乳激素過高可能導致不孕
 - (D) 情緒壓力或運動可能導致泌乳素暫時升高
19. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者正確？
- (A) 約佔台灣糖尿病病人總數的15%
 - (B) 主要以口服降血糖藥物治療
 - (C) 大多於中年後發病
 - (D) 主因胰臟無法製造胰島素而致病
20. 下列關於胰臟炎的描述，何者為非？
- (A) 外傷是台灣造成急性胰臟炎的最主要原因
 - (B) 急性胰臟炎患者血清澱粉酶多會上升
 - (C) 腹痛是胰臟炎的常見症狀
 - (D) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
21. 下列關於C型肝炎的描述，何者正確？
- (A) 台灣的C型肝炎，大多來自母子垂直感染
 - (B) 台灣的C型肝炎，隨年齡的增加感染率逐漸降低
 - (C) 感染C型肝炎後，多數會發展成慢性肝炎
 - (D) 感染C型肝炎後，大多會引起急性猛爆性肝炎發作
22. 下列何種病毒，只能在已經患有B型肝炎患者身上造成感染？
- (A) E型肝炎病毒
 - (B) D型肝炎病毒
 - (C) 巨細胞病毒
 - (D) 柯薩奇病毒
23. 下列何者不是膽結石常見的危險因子？
- (A) 男性
 - (B) 懷孕
 - (C) 肥胖
 - (D) 糖尿病

24. 下列關於肝功能檢查的描述，何者為非？
- (A) 激烈運動後之橫紋肌溶解症，即會造成GOT上升
 - (B) 部分肝癌患者 α -胎兒蛋白(AFP)並不會上升
 - (C) 慢性腎臟病患者白蛋白(Albumin)多會上升
 - (D) 肝炎急性發作，即可能使 α -胎兒蛋白(AFP)上升
25. 下列針對「頭痛」的敘述，何者不正確？
- (A) 慢性頭痛有可能導致精神焦慮
 - (B) 肌腱肌膜炎、頸椎問題也可能是導致頭痛的原因
 - (C) 精神壓力、精神疾病不可能是導致頭痛的原因
 - (D) 絕大部分的頭痛不會影響壽命，但慢性嚴重頭痛對生活品質有大的影響
26. 關於「癲癇重積狀態(Status epilepticus)」之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 癲癇重積狀態多數無需急診或住院治療
 - (B) 這是指癲癇發作持續三十分鐘而仍然無法恢復意識
 - (C) 癲癇重積狀態是最嚴重的癲癇發作
 - (D) 其中特別嚴重的是強直合併抽搐性大發作的癲癇重積狀態
27. 下列針對「腦瘤(Brain tumor)」的症狀敘述，何者是正確的？
- (A) 頭痛、頭暈、平衡失常、記憶混亂
 - (B) 癲癇、精神錯亂、無力、視力問題、言語失調
 - (C) 不一定會造成明顯的症狀
 - (D) 以上皆是
28. 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為：
- (A) 硬腦膜→軟腦膜→蜘蛛膜
 - (B) 硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
 - (C) 蜘蛛膜→硬腦膜→軟腦膜
 - (D) 蜘蛛膜→軟腦膜→硬腦膜
29. 引發下列針對「水腦症(Hydrocephalus)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 水腦症治療一般以內科治療為主
 - (B) 阻塞性水腦症一般不會導致失能或致殘
 - (C) 腦脊髓液產生來源自蜘蛛網膜下腔
 - (D) 水腦症的症狀，有時與失智症或巴金森氏症不易區分

30. 下列針對「腦出血(Cerebral Hemorrhage)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦出血佔腦中風疾病中較大的比例
 - (B) 高血壓是腦出血最常見的既往症
 - (C) 腦出血的死亡率較腦栓塞低許多
 - (D) 高血壓性腦出血發生的位置多位在大腦額葉表層
31. 下列針對「坐骨神經痛 (Sciatica)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 一般坐骨神經痛常常持續數週甚至數月之久，此與肌肉或韌帶的炎症，短期就可恢復，有著明顯的不同
 - (B) 從疼痛症狀的本身，常常可辨別出造成坐骨神經痛的特定原因
 - (C) 背部肌肉的拉傷、扭傷、炎症，或是臀部肌肉如梨狀肌炎症，常常同樣也會造成非常類似如坐骨神經痛的狀況。
 - (D) 糖尿病、腫瘤壓迫、脊椎骨退化、脊椎椎孔狹窄、脊椎傷害或病變等，常常也是直接或間接造成坐骨神經痛的原因之一
32. 下列針對「酒精或藥物濫用成癮 (Alcoholism、Drug Abuse)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 此種成癮者，久而久之，會造成行為的異常及生理上的異常。一旦突然停用酒精或藥毒物，常會發生一些戒斷症狀，如焦慮、憂鬱、沮喪、激躁不安、睡眠障礙、抽筋、失憶、神經異常等
 - (B) 有精神障礙問題者，是此類病症的高危風險人群
 - (C) 此症易戒斷，治療容易，且不易復發，因此較不會造成失能
 - (D) 此症易造成意外事故、身體外傷及身體多器官病變，同時發生精神疾病，性傳染病的機率也較大
33. 下列針對「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因鏈球菌 (A族M型) 感染肺部而導致
 - (B) 可感染任何年齡群
 - (C) 症狀可能有發燒、體重減輕、咳嗽、胸痛
 - (D) 「痰液耐酸染色鏡檢」為診斷檢查方法之一
34. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可為腎臟衰竭晚期或最終的臨床表現
 - (B) 臨床上可視為一種症候群 (Uremic syndrome)
 - (C) 急性腎臟衰竭不會引起尿毒症
 - (D) 台灣有高的發生率及盛行率

35. 下列有關「肺癌 (Lung cancer) 的治療」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 手術切除
 - (B) 放射線治療
 - (C) 化學藥物治療
 - (D) 「合併治療」不列入考慮
36. 下列有關「腎功能不全 (Renal insufficiency)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
 - (B) 惡化後會影響含氮廢物的排除
 - (C) 惡化後會使體內電解質、酸鹼平衡、內分泌代謝的穩定產生障礙
 - (D) 腎臟可能為永久及不可逆的損害
37. 下列針對「胸膜 (Pleural membrane)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 覆蓋在肺臟的表面
 - (B) 在呼吸的機制中扮演重要的角色
 - (C) 正常情況下會存有大量空氣在兩層胸膜之間
 - (D) 正常情況下會存有少量的胸膜液 (Pleural fluid) 在兩層胸膜之間
38. 下列何者為「是一種非侵入性的治療，利用震動波能量來震碎結石」？
- (A) 腎盂截石術 (Pyelolithotomy)
 - (B) 腎截石術 (Nephrolithotomy)
 - (C) 經皮腎造口術 (Percutaneous nephrostomy)
 - (D) 體外震波碎石術 (Extracorporeal shock wave lithotripsy)
39. 下列針對「鼻咽癌 (Nasopharyngeal cancer)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可能會侵犯腦神經而引起腦神經麻痺的現象
 - (B) 致病原因可能與 EB 病毒 (Epstein Barr virus) 有關
 - (C) 病理切片檢查為診斷檢查項目之一
 - (D) 鼻咽癌 TNM 分期系統中其「N」代表有無遠處轉移
40. 下列針對「子宮內膜異位症」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 不屬慢性疾病
 - (B) 卵巢巧克力囊腫為發生於卵巢內的子宮內膜異位症
 - (C) 子宮肌腺症是子宮內膜侵入子宮肌層中
 - (D) 為骨盆腔疼痛的原因之一

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是會發生貧血情況的遺傳性疾病？
- (A) 葡萄糖-6-磷酸去氫酵素缺乏症(G-6-P-D 缺乏症)
 - (B) 鎌狀紅血球症
 - (C) 陣發性夜間血紅素尿症
 - (D) 類風溼性關節炎
42. 以下何者狀況可造成器官缺血，而導致器官病變，甚至死亡？
- (A) 血管炎
 - (B) 動脈硬化
 - (C) 高脂血症
 - (D) 心房震顫(Atrial fibrillation)
43. 以下何者疾病可造成肢體缺血而可能有間歇性跛行，發紺，水腫等症狀？
- (A) 全身性紅斑性狼瘡
 - (B) 類風溼性關節炎
 - (C) 阻塞性動脈炎
 - (D) 椎間盤突出
44. 以下何者疾病可導致續發性高血壓，治療後可改善血壓值？
- (A) 腎絲球腎炎
 - (B) 腎動脈狹窄
 - (C) 妊娠
 - (D) 長期服用類固醇
45. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，若確認符合下列何項狀況，即可診斷為糖尿病？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 200mg/dl
 - (C) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 200mg/dl
 - (D) 糖化血色素(HbA1c)超過 6.5%

46. 下列何種肝炎病毒不易導致慢性肝炎或肝硬化等慢性併發症？
- (A) A 型肝炎
 - (B) B 型肝炎
 - (C) C 型肝炎
 - (D) E 型肝炎
47. 關於「精神官能症 (Neurosis, Psychosomatic Disorders)」之敘述，下列何者正確？
- (A) 精神官能症是一種常見的精神疾病，盛行率一般可達 10% 以上，相對於嚴重精神病而言，精神官能症是一群較輕型的精神疾病，但它不是一種單一的疾病，而是包含有焦慮性精神官能症、強迫性精神官能症、畏懼性精神官能症、身心症、焦慮症、恐慌性精神官能症等
 - (B) 此類病患的精神狀態與現實嚴重脫離
 - (C) 此症與嚴重的精神病最大不同，在於此類患者有自覺病感
 - (D) 若合併酒精或藥物濫用、伴有憂鬱、或發展為慢性者，則多數預後不佳
48. 下列針對「神經系統」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦幹是神經系統內相當重要的一部份，若腦幹已經停止活動的人可判定為死亡
 - (B) 在神經系統內有多種的化學傳導物，其中最主要的是乙醯膽鹼 (Acetylcholine) 與正腎上腺素 (Noradrenaline)
 - (C) 中樞神經系統定義為存在於腦部與脊髓內的神經組織
 - (D) 自主神經系統包含交感神經徑路 (Sympathetic pathway) 與副交感神經徑路 (Parasympathetic pathway) 兩部份
49. 泌尿系統包含下列哪些構造或器官？
- (A) 胰臟
 - (B) 輸尿管
 - (C) 膀胱
 - (D) 尿道
50. 針對末期腎臟疾病階段，需考慮「腎臟替代療法」包括下列哪些？
- (A) 血液透析
 - (B) 腹膜透析
 - (C) 腎臟移植
 - (D) 口服藥物治療