

中華民國人壽保險管理學會
106 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
 - 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
 - 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
 - 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
 - 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
 - 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
 - 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
 - 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
 - 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
 - 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- ※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 以下何者與缺血性心臟病無明確關係？
 - (A) 狹心症
 - (B) 心肌梗塞
 - (C) 冠狀動脈疾病
 - (D) 風濕性心臟病

2. 心臟血液是由以下何種血管所供應？
 - (A) 腹主動脈
 - (B) 肺動脈
 - (C) 冠狀動脈
 - (D) 股動脈

3. 常與毒品靜脈注射有關的疾病？
 - (A) 心內膜炎
 - (B) 二尖瓣逆流
 - (C) 三尖瓣狹窄
 - (D) 風溼性心臟病

4. 風溼性心臟病最常侵犯以下何處？
 - (A) 冠狀動脈
 - (B) 肺動脈
 - (C) 左心室
 - (D) 二尖瓣

5. 腦中風與以下何種心臟病最常有直接關係？
 - (A) 心房纖維性顫動
 - (B) 心室中膈缺損
 - (C) 心跳過速
 - (D) 心房中膈缺損

6. 陣發性心室上心跳過速(paroxysmal supraventricular tachycardia) 病灶位於？
- (A) 心房
 - (B) 心室
 - (C) 肺動脈
 - (D) 主動脈
7. 以下何者不是常見貧血原因？
- (A) 維生素 B12 缺乏
 - (B) 葉酸缺乏
 - (C) 鐵缺乏
 - (D) 鋅缺乏
8. 有關再生不良性貧血(Aplastic Anemia)何者是錯的？
- (A) 是骨髓造血機能異常所致
 - (B) 只有紅血球會減少
 - (C) 嚴重程度依血球減少多寡而定
 - (D) 嚴重貧血會造成心臟衰竭
9. 以下何者不屬於上肢骨頭？
- (A) 橈骨
 - (B) 肱骨
 - (C) 尺骨
 - (D) 腓骨
10. 以下有關痛風何者不正確？
- (A) 高尿酸血症的人一定會產生痛風症狀
 - (B) 第一次發作最常見於下肢大拇趾
 - (C) 常合併肥胖、高血壓、腎衰竭等
 - (D) 發生機率以中年男性最多

11. 以下何者不屬於跗骨？
- (A) 蹠骨
 - (B) 跟骨
 - (C) 楔狀骨
 - (D) 距骨
12. 有關全身性紅斑性狼瘡何者不正確？
- (A) 最常發生於年輕女性
 - (B) 是一種急性發炎性的全身自體免疫疾病
 - (C) 主因是免疫複合體沉積在各個器官導致的發炎所致
 - (D) 近年治療效果很好，存活率大為升高
13. 有關愛滋病何者是對的？
- (A) 是先天免疫系統異常的疾病
 - (B) 是受到愛滋細菌感染所致
 - (C) 性行為、輸血及生產過程都是傳染的途徑
 - (D) 感染後，短時間內就會產生免疫功能破壞
14. 以下何種疾病與視神經萎縮而導致失明有直接關係？
- (A) 白內障
 - (B) 近視
 - (C) 青光眼
 - (D) 結膜炎
15. 有關白內障的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 與糖尿病有關
 - (B) 與高度近視眼有關
 - (C) 與使用類固醇有關
 - (D) 是玻璃體病變
16. 以下眼睛結構的相關位置何者是對的(由前往後透視)？
- (A) 水晶體-玻璃體-視網膜-角膜
 - (B) 角膜-水晶體-玻璃體-視網膜
 - (C) 玻璃體-角膜-水晶體-視網膜
 - (D) 視網膜-水晶體-玻璃體-角膜

17. 下列何者不是造成「肝癌」的常見病因？
- (A) A 型肝炎
 - (B) B 型肝炎
 - (C) C 型肝炎
 - (D) 酗酒
18. 下列關於甲狀腺的描述，何者為非？
- (A) 甲狀腺機能亢進，可能產生心房顫動
 - (B) 正常情況下，體內甲狀腺激素太高時，腦下垂體會減少甲狀腺刺激素(TSH)的分泌
 - (C) 兒童甲狀腺功能低下可能造成呆小症
 - (D) 嚴重甲狀腺功能低下可能引起甲狀腺風暴(Thyroid storm)
19. 下列何者不是急性胰臟炎的常見原因？
- (A) 胃食道逆流
 - (B) 膽石症
 - (C) 酒精
 - (D) 高三酸甘油脂血症
20. 下列何者不是 α -胎兒白蛋白 (α -Fetoprotein, AFP) 上升的常見原因？
- (A) 懷孕
 - (B) 肝炎發作
 - (C) 十二指腸潰瘍
 - (D) 肝癌
21. 下列關於 B 型肝炎的描述，何者為非？
- (A) 垂直感染為台灣慢性 B 型肝炎的主要感染途徑
 - (B) 台灣 30 歲以下年輕人之 B 肝帶原率約占人口中的 15~20%
 - (C) 慢性 B 型肝炎可以注射干擾素或口服抗病毒藥物治療
 - (D) 台灣的肝癌，一半以上皆由 B 型肝炎引起

22. 依美國糖尿病協會 2010 年的建議標準，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 糖化血色素(HbA1c)超過 6.5%
 - (C) 小便出現尿糖
 - (D) 葡萄糖耐力試驗兩小時之血糖超過 200m g/dl
23. 下列關於高血脂症的描述，何者為非？
- (A) 三酸甘油酯(TG)>500mg/dl 符合降血脂藥物治療條件
 - (B) 總膽固醇(TC)≥200 mg/dl 可稱為高膽固醇血症
 - (C) 體內膽固醇大部分由肝細胞合成，少部分才攝取自食物
 - (D) 糖尿病可致高密度脂蛋白膽固醇(HDL)濃度上升
24. 下列關於膽囊疾病的描述，何者為非？
- (A) 肥胖是造成膽結石的危險因子之一
 - (B) 膽囊炎易造成左上腹痛，尤其壓痛
 - (C) 大多數的膽囊炎與膽結石有相關
 - (D) 大多數的膽結石沒有症狀
25. 下列針對「神經系統」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 中樞神經系統定義為存在於腦部與脊髓內的神經組織
 - (B) 周邊神經系統定義為存在於腦部與脊髓以外的神經組織
 - (C) 腦神經有 12 對，脊神經有 31 對
 - (D) 脊髓終止於腰椎第五節的高度
26. 下列針對「阿爾茲海默氏症(Alzheimer' s disease)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 阿爾茲海默氏症是失智症的一種，也是導致失智症中最多的一群
 - (B) 阿爾茲海默氏症導因於腦神經細胞退化
 - (C) 阿爾茲海默氏症診斷一般以臨床症狀判斷為主，但必需排除如感染、腦腫瘤、內分泌異常、維生素缺乏、外傷腦病、中毒、精神障礙等，可以積極治癒的疾病
 - (D) 此症不會影響罹病率、死亡率，也不會造成失能

27. 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為：
- (A) 硬腦膜→軟腦膜→蜘蛛膜
 - (B) 硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
 - (C) 蜘蛛膜→硬腦膜→軟腦膜
 - (D) 蜘蛛膜→軟腦膜→硬腦膜
28. 引發坐骨神經痛最多的原因是腰椎椎間盤軟骨突出病變。下列何者不是造成腰椎椎間盤軟骨突出病變的原因？
- (A) 外傷
 - (B) 姿勢不良
 - (C) 憂鬱症
 - (D) 自然退化
29. 下列針對「水腦症(Hydrocephalus)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腦脊髓液來自腦室壁脈絡叢的分泌
 - (B) 當腦脊髓液整個流通過程中有任何不暢通，或是異常分泌過多時，就會造成腦脊髓液的不正常滯留、積聚，久而久之便會使得腦壓增高，腦室擴大，進而會造成神經功能異常的狀態，這就是水腦症
 - (C) 先天因素是造成水腦症的唯一原因
 - (D) 水腦症是可以治療的，一般以外科手術治療為主。手術後腦脊髓液引流管發生阻塞時有所見，因此定期醫療回診追蹤是必須的
30. 下列針對「腦瘤(Brain tumor)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 由於腦部的特殊性，任何長於腦部的腫瘤皆會對正常腦部造成壓迫，繼而形成相關之神經功能障礙
 - (B) 原發性惡性腦瘤在任何年齡皆會發生，但通常有兩個好發期，一是兒童期，一是50歲以上的成年人
 - (C) 成人原發性惡性腦瘤多好發於後顱窩，其中以惡性膠質細胞瘤為最常見
 - (D) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤佔第二位，僅次於血液癌症

31. 下列何者不是「腦出血(Cerebral Hemorrhage)」的併發症？
- (A) 癲癇
 - (B) 失語症
 - (C) 自體免疫病症
 - (D) 肺炎
32. 下列針對「酒精或藥物濫用成癮 (Alcoholism、Drug Abuse)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 此種成癮者，久而久之，會造成行為的異常及生理上的異常。一旦突然停用酒精或藥毒物，常會發生一些戒斷症狀，如焦慮、憂鬱、沮喪、激躁不安、睡眠障礙、抽筋、失憶、神經異常等
 - (B) 有精神障礙問題者，是此類病症的高危風險人群
 - (C) 此症易戒斷，治療容易，且不易復發，因此較不會造成失能
 - (D) 此症易造成意外事故、身體外傷及身體多器官病變，同時發生精神疾病，性傳染病的機率也較大
33. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可出現於任何年齡
 - (B) 為肺腺泡 (Pulmonary acinus) 對多樣性的刺激產生異常過度反應
 - (C) 氣喘發作時，呼吸可能會發出喘鳴聲 (Wheezing)
 - (D) 肺功能檢查或併支氣管激發試驗可用於診斷氣喘
34. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為慢性骨盆腔疼痛的原因之一
 - (B) 指子宮內膜的組織結構出現於子宮內膜腔外或侵入子宮肌層中
 - (C) 對於無懷孕需求的嚴重症狀者，可採取子宮併兩側卵巢、輸卵管切除
 - (D) 非導致不孕的原因

35. 下列有關「肺膿瘍 (Lung Abscess) 的治療」敘述，何者是錯誤的？
- (A) 抗生素治療為主
 - (B) 支氣管鏡可協助排膿或引流
 - (C) 需合併放射治療
 - (D) 外科手術也可列入考慮
36. 下列有關「腎功能不全 (Renal insufficiency) 的治療」敘述，何者是錯誤的？
- (A) 治療急性腎功能不全者，應儘速將致病原因矯正
 - (B) 透析治療不會使用於急性腎功能不全者
 - (C) 飲食及藥物治療可用於慢性腎功能不全者
 - (D) 末期慢性腎臟疾病階段，尚需考慮腎臟替代療法
37. 下列針對「鼻竇 (The sinus)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是顱骨內含有空氣的空腔
 - (B) 在聲音共鳴方面扮演重要的角色
 - (C) 人體有四對鼻竇
 - (D) 上頷竇 (Maxillary sinus) 是最大的鼻竇
38. 下列針對「良性攝護腺肥大 (Benign prostatic hypertrophy)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 大多數年紀較大的男性中相當常見的症狀
 - (B) 會壓迫輸尿管而導致尿流的部分阻塞
 - (C) 攝護腺癌膀胱症狀可能與良性攝護腺肥大一樣
 - (D) 治療方式包括藥物或手術治療
39. 下列針對「鼻咽癌 (Nasopharyngeal cancer)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 發生時可能會有耳、鼻及腦部症狀
 - (B) 與EB病毒 (Epstein Barr virus) 有關
 - (C) 可以鼻咽內視鏡檢查
 - (D) 不屬於放射敏感的腫瘤

40. 下列針對「單純性腎囊腫 (Simple renal cysts)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為最常見的腎臟囊腫疾病
 - (B) 屬腎臟惡性腫瘤之一
 - (C) 有症狀者可採「腹腔鏡腎囊腫去頂手術」
 - (D) 病因尚不明確

貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何種疾病發作時會造成關節炎？
- (A) 痛風
 - (B) 類風溼性關節炎
 - (C) 全身性紅斑性狼瘡
 - (D) 牛皮癬
42. 以下何者是構成關節的一部分？
- (A) 軟骨
 - (B) 關節液
 - (C) 滑膜
 - (D) 韌帶
43. 以下何種疾病造成的高血壓，以手術或藥物治療成功後，高血壓即可痊癒？
- (A) 原發性高血壓
 - (B) 甲狀腺功能亢進
 - (C) 腎上腺功能亢進
 - (D) 主動脈窄縮
44. 以下有關地中海型貧血(Thalassemia)何者正確？
- (A) 是體染色體顯性遺傳疾病
 - (B) 台灣以甲型(α 型)最多
 - (C) 是單一基因遺傳性疾病
 - (D) 嚴重者於胎兒時期即會死亡

45. 下列關於第1型和第2型糖尿病的描述，何者為非？
- (A) 第1型主要發生在小孩子及年輕人
 - (B) 第2型病人通常較肥胖
 - (C) 第1型只能用口服降血糖藥治療
 - (D) 第2型在年輕人的發生率近年逐漸減少
46. 下列哪些是「消化性潰瘍」的可能病因或危險因子？
- (A) 服用制酸劑
 - (B) 幽門螺旋桿菌感染
 - (C) 服用阿斯匹靈等非類固醇抗發炎藥物
 - (D) 飲酒過量
47. 下列針對「精神病 (Psychosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 精神病是一群精神異常病症的總稱，包括思覺失調症、妄想症、情感性精神病 (憂鬱症、躁鬱症)、器質性精神疾病等
 - (B) 精神病人對於自己的異常狀態非常瞭解，常會主動尋求醫療或他人的幫助
 - (C) 自殺是憂鬱症、躁鬱症的最大問題
 - (D) 「器質性精神病」是腦部因疾病，藥物、酒精、創傷、代謝異常等，造成腦組織病變，所引起的腦部功能障礙
48. 下列針對「癲癇(Epilepsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象
 - (B) 為精神疾病的一種
 - (C) 最嚴重的發作稱為癲癇重積狀態
 - (D) 30歲以後首次發病，應注意是否有腦瘤、腦部感染、腦中風的可能
49. 呼吸系統包含下列哪些構造或器官？
- (A) 鼻腔
 - (B) 喉部
 - (C) 支氣管
 - (D) 腎臟

50. 下列哪些屬於腎衰竭的特徵？
- (A) 血液內電解質濃度保持平衡
 - (B) 體液與電解質堆積在體內
 - (C) 血液中有毒物質的濃度升高
 - (D) 紅血球生成素的生產不受影響