

中華民國人壽保險管理學會
107 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 缺乏以下何種在肝臟合成的維生素容易導致有出血傾向？
 - (A) 維生素 A
 - (B) 維生素 B
 - (C) 維生素 C
 - (D) 維生素 K

2. 以下有關發燒的敘述，何者是錯的？
 - (A) 一般體溫調節中樞是指小腦
 - (B) 腎上腺素、甲狀腺素都可促進細胞代謝產生熱量，而造成體溫升高
 - (C) 熱中暑的病人會造成中樞神經體溫調節障礙而引起高燒
 - (D) 癌症組織壞死時，亦會引起高燒

3. 以下有關貧血敘述何者是錯的？
 - (A) 腎臟可分泌紅血球生成素(erythropoietin)刺激紅血球生成，若腎臟受損可造成貧血
 - (B) 成長中的嬰兒對鐵需求大，若不足可能造成貧血
 - (C) 懷孕中母親容易產生缺鐵性貧血
 - (D) 急性出血的患者，容易出現缺鐵性貧血

4. 有保戶體檢時，血紅素(Hb)為 10gm/dl，但 MCV(平均紅血球容積)是正常的，以下何種狀況的可能性最高？
 - (A) 地中海型貧血患者
 - (B) 缺鐵性貧血患者
 - (C) 急性出血患者
 - (D) 胃癌術後痊癒患者

5. 以下有關血友病(Hemophilia)的敘述，何者是對的？
 - (A) 是一種因血小板減少而有易出血傾向的疾病
 - (B) 血友病 typeA(Hemophilia typeA)是因為第八凝血因子缺乏所致的疾病
 - (C) 血友病是體染色體遺傳的疾病
 - (D) 溫伯氏疾病(Vonwillebranddisease)是血友病型態之一

6. 以下何者是與過敏性疾病最有相關的抗體？
- (A) IgA
 - (B) IgE
 - (C) IgM
 - (D) IgG
7. 以下有關白血球敘述何者是錯的？
- (A) 病毒感染時，白血球可能增加或減少
 - (B) 白血病患者白血球數目可能會異常大量增加，其中大部分是白血球的母細胞(blast)
 - (C) 細菌感染時，白血球大多會減少
 - (D) 再生不良性貧血常有白血球減少的狀況
8. 當保戶體檢時發現臉頰有對稱性紅斑，且有嚴重蛋白尿時，最有可能是以下何種疾病？
- (A) 再生不良性貧血
 - (B) 全身性紅斑性狼瘡
 - (C) 類風溼性關節炎
 - (D) 愛滋病
9. 下列何項檢驗結果陽性可代表 B 肝病毒正在體內複製？
- (A) HBeAg
 - (B) AntiHBe
 - (C) AntiHBs
 - (D) AntiHBc
10. 下列何者不是酗酒者的常見表現？
- (A) GOT 上升
 - (B) 紅血球變大(MCV 增加)
 - (C) 尿酸上升
 - (D) r-GT 下降

11. 嬰幼兒感染 B 型肝炎後的病程順序，何者正確？
- (A) 免疫廓清期→免疫耐受期→殘餘期
 - (B) 免疫耐受期→殘餘期→免疫廓清期
 - (C) 免疫耐受期→免疫廓清期→殘餘期
 - (D) 免疫廓清期→殘餘期→免疫耐受期
12. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，符合下列何項狀況，即可診斷糖尿病？
- (A) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
 - (B) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (C) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 126mg/dl
 - (D) 以上皆是
13. 下列何種激素，不是由腦下垂體分泌？
- (A) 生長激素(GH)
 - (B) 甲狀腺刺激素(TSH)
 - (C) 黃體生成素(LH)
 - (D) 以上激素皆由腦下垂體分泌
14. 下列何者不是甲狀腺功能亢進的常見症狀？
- (A) 心跳變慢
 - (B) 體重減輕
 - (C) 腹瀉
 - (D) 怕熱
15. 下列何者不是三酸甘油酯上升的常見原因？
- (A) 肥胖
 - (B) 糖尿病
 - (C) 腎功能異常
 - (D) 甲狀腺功能亢進
16. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 較第二型糖尿病少見
 - (B) 需使用胰島素口服治療
 - (C) 主要發生在小孩子及年輕人
 - (D) 主因胰臟無法製造胰島素而致病

17. 下列的敘述，何者錯誤？
- (A) 腦炎(Encephalitis)患者，大部分恢復良好，少數會有癲癇、智能或行為等身心障礙
 - (B) 『器質性精神病』是腦部因疾病，藥物、酒精、創傷、代謝異常等，造成腦組織病變，所引起的腦部功能障礙
 - (C) 腦性麻痺的功能障礙經過治療後，皆可得到根治
 - (D) 腦動脈血管硬化狹窄是造成腦梗塞(Cerebral infarction)的主要原因
18. 關於「腦動脈血管瘤(Cerebral aneurysm)」之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 腦動脈血管瘤是腦部的危險疾病，猶如不定時炸彈一般，但破裂後致死率不高
 - (B) 腦動脈血管瘤造成的原因包括高血壓、動脈硬化、動脈感染或炎症、遺傳、先天等因素
 - (C) 腦動脈血管瘤未破裂時，多半不會有明顯症狀
 - (D) 若腦動脈血管瘤突然破裂後，則會突發嚴重頭痛、嘔吐、頸脖僵硬、甚至影響神經意識狀態、或至昏迷
19. 下列何種疾病是失智症的一種，也是導致失智症中最多的一群？
- (A) 腦性麻痺
 - (B) 巴金森氏症
 - (C) 阿爾茲海默氏症
 - (D) 酒精或藥物濫用成癮
20. 精神官能症(Neurosis, Psychosomatic disorders)不包含下列何者病症？
- (A) 強迫症、身心症
 - (B) 器質性精神病
 - (C) 焦慮症、恐慌症
 - (D) 以上(A)及(C)
21. 下列敘述何者是正確的？
- (A) 腦出血佔腦中風疾病中較大的比例
 - (B) 吸煙是腦出血最常見的既往症
 - (C) 阿爾茲海默氏症有些同時會合併如失語症(Aphasia)，或失用症(Apraxia)，或失認症(Agnosia)
 - (D) 腦出血的急性死亡率較低，但日後易造成殘障

22. 下列的敘述，何者錯誤？
- (A) 腦動脈硬化症 (Cerebral Atherosclerosis) 這種現象，在血管分岔處特別明顯，譬如發生在供給腦部的內頸動脈或椎動脈的分岔處
 - (B) 腦膿瘍 (Brain Abscess) 患者，近年來或許因免疫系統疾病增加的關係，而有逐漸上升的趨勢
 - (C) 智能障礙的原因，經過檢查，皆可得到確定
 - (D) 精神病的診斷，因為症狀常會變化所以診斷的變異性較大
23. 下列哪個不屬於「眩暈 (Vertigo)」的可能病因？
- (A) 梅尼爾氏症
 - (B) 腦性麻痺
 - (C) 椎底動脈循環障礙
 - (D) 前庭神經炎
24. 下列敘述何者是正確的？
- (A) 從疼痛症狀本身，通常可以分辨出造成坐骨神經痛的特定原因
 - (B) 酒精或藥物濫用成癮，心理上的症狀則包括抽筋、失憶、神經異常等
 - (C) 造成坐骨神經痛最多的原因是腰椎椎間盤軟骨突出病變
 - (D) 智能障礙的成因有後天導致的因素，如染色體異常
25. 下列有關於選擇適當「氣喘 (Asthma)」承保個案時，何項敘述表示其相對上是屬較佳或較有利的狀態？
- (A) 氣喘發作的初始年齡發生在成人而非在兒童
 - (B) 近期氣喘發作在二年內而非在二年以上
 - (C) 氣喘嚴重程度分級依治療前臨床特徵屬間歇性者
 - (D) 藥物介入種類或方式採規則性使用二種或以上藥物，如低至高劑量吸入型類固醇製劑併長效支氣管擴張劑
26. 下列「腎臟囊腫疾病」，何者在預後相對上較佳？
- (A) 單純性腎囊腫
 - (B) 體染色體顯性多囊腎疾病
 - (C) 體染色體隱性多囊腎疾病
 - (D) 以上(A)(B)(C)選項皆不佳

27. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 臨床醫師確認診斷前無需先排除其他明確原因
 - (B) 型態只有一種即「慢性阻塞性支氣管炎」
 - (C) 長期吸菸者罹患此病機率比未吸菸者低
 - (D) 右心衰竭為併發症之一
28. 依 2002 年美國國家腎臟基金會 (National kidney foundation)，對慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease) 所下的定義，下列何者敘述是正確的：
- (A) 腎臟損害 (指腎臟的結構或功能異常) 需併有腎絲球過濾率 (Glomerular filtration rate) 的下降大於或等於三個月
 - (B) 腎絲球過濾率小於 $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ 大於或等於三個月，不需考慮是否併有或不併有腎臟的損害
 - (C) 尿液檢查的異常不屬於腎臟損害的標誌
 - (D) 腎臟病理切片檢查不用於腎臟損害的評估
29. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是正確的？
- (A) 無法獲得肺流量值
 - (B) 可評估通氣障礙的嚴重程度，但無法評估其可能的型態
 - (C) 塵肺症嚴重度可用肺總量做確認
 - (D) 以上(A)(B)(C)選項皆正確
30. 下列針對尿液檢查項目中「上皮細胞 (Epithelium Cells)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腎臟、輸尿管、膀胱、尿道均有上皮細胞覆蓋
 - (B) 正常尿液不會有上皮細胞出現
 - (C) 女性上皮細胞有可能會較男性為多
 - (D) 上皮細胞大數量顯著地增加可能暗示泌尿道有部份受到感染
31. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺腺泡被經由血液循環而來的栓子所堵塞
 - (B) 近端深部靜脈栓塞的住院病人的發病率較低
 - (C) 危險因子不包括患惡性腫瘤者
 - (D) 心房纖維顫動可產生血栓栓子

32. 下列針對「小兒哮喘症(Croup)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 與氣喘相同皆由過敏引起
 - (B) 與氣喘相同是一種下呼吸道的細支氣管收縮
 - (C) 病發時吸氣較呼氣困難，且會有狗吠似的咳嗽
 - (D) 以類固醇治療無效
33. 下列有關心電圖這項核保時會應用的檢查，何者錯誤？
- (A) 心律不整最有效的診斷工具就是心電圖
 - (B) 心肌缺氧與梗塞在不同階段有其不同之心電圖的變化
 - (C) 判讀一張心電圖前應先檢查是否有人為錯誤的存在，例如檢視電壓校度是否為標準一毫伏特(高度為2大格)
 - (D) 心電圖可以做為診斷心臟疾病的唯一依據
34. 關於全身性水腫有以下幾種原因，何者錯誤？
- (A) 心衰竭
 - (B) 肝衰竭
 - (C) 甲狀腺亢進
 - (D) 腎衰竭
35. 下列有關「不穩定心絞痛」敘述，何者錯誤？
- (A) 只有運動時會發作，休息時不會發作
 - (B) 發作時症狀會越來越嚴重
 - (C) 發作時間會越來越長
 - (D) 發作頻率會越來越高
36. 關於狹心症與心肌梗塞的相關敘述，何者為是？
- (A) 典型狹心症的症狀包含胸痛，常放射至左手臂內側
 - (B) 胸痛若放射至背部、頸部、下顎、牙齒及上腹部，絕對不是狹心症
 - (C) 心肌梗塞絕不會同時合併有冒冷汗及噁心嘔吐的現象
 - (D) 心肌梗塞發作的病人一定會有明顯胸痛
37. 以下關於先天性心臟病的預後敘述，何者為非？
- (A) 發紺型比非發紺型的預後好
 - (B) 術前沒有併發症的(如肺高壓)比術前有併發症的預後好
 - (C) 有出現艾森門格綜合症的預後比較差
 - (D) 合併其他基因、染色體缺陷的預後比較差

38. 下列關於心律不整疾病的敘述，何者是正確的？
- (A) 正常人因為運動或情緒可以有竇性心跳過速的反應
 - (B) 心室頻脈是種不需要治療的心律不整
 - (C) 期外收縮不可能在正常人身上出現
 - (D) 第三度房室阻斷對預後幾乎沒任何影響
39. 下列何者非續發性高血壓的原因？
- (A) 慢性腎臟病
 - (B) 肺動脈狹窄
 - (C) 甲狀腺功能亢進
 - (D) 嗜鉻細胞瘤(Pheochromocytoma)
40. 急性功能失調、循環衰竭的現象即稱為「休克」，以下何者不屬於「低血量性休克的原因」？
- (A) 大量脫水
 - (B) 嚴重腹瀉
 - (C) 燒燙傷
 - (D) 藥物過敏

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何種疾病是因血管異常，而導致容易出血傾向，所以可見到皮膚和黏膜有點狀血斑現象？
- (A) 壞血病(Scarvey)
 - (B) 老人性紫斑病
 - (C) 過敏性紫斑病
 - (D) 血管炎
42. 以下何種疾病在臨床上常會有關節炎症狀產生？
- (A) 類風溼性關節炎
 - (B) 高尿酸血症
 - (C) 全身性紅斑性狼瘡
 - (D) 坐骨神經痛

43. 下列關於胰臟炎的敘述，何者為非？
- (A) 急性胰臟炎發作時血中澱粉酶(Amylase)指數多會下降
 - (B) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
 - (C) 痛風是造成急性胰臟炎的最主要原因
 - (D) 腹痛是胰臟炎的常見症狀
44. 下列關於 B 型肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 台灣的肝癌一半以上皆由 B 型肝炎引起
 - (B) 台灣自民國 83 年起開始實施新生兒 B 型肝炎疫苗注射
 - (C) AntiHBs 陽性代表病毒仍在體內複製
 - (D) HBsAg 陽性代表 B 型肝炎帶原
45. 下列針對「腦瘤(Brain tumor)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 由於腦部的特殊性，任何長於腦部的腫瘤皆會對正常腦部造成壓迫，繼而形成相關之神經功能障礙
 - (B) 原發性惡性腦瘤在任何年齡皆會發生，但通常有兩個好發期，一是兒童期，一是 50 歲以上的成年人
 - (C) 成人原發性惡性腦瘤多好發於後顱窩，其中以惡性膠質細胞瘤為最常見
 - (D) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤佔第二位，僅次於血液癌症
46. 下列針對「阿爾茲海默氏症(Alzheimer's disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 阿爾茲海默氏症目前無法根本治癒
 - (B) 阿爾茲海默氏症導因於腦神經細胞退化
 - (C) 阿爾茲海默氏症診斷一般以臨床症狀判斷為主，但必需排除如感染、腦腫瘤、內分泌異常、維生素缺乏、外傷腦病、中毒、精神障礙等，可以積極治癒的疾病
 - (D) 阿爾茲海默氏症診斷中也經常藉由一些身心評量工具，如 MMSE (Mini-Mental State Examination 簡易心智量表)、CDR(臨床失智量表)等，以量化其徵候的嚴重度
47. 下列哪些可能是「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的病因或危險因子？
- (A) 呼吸系統感染
 - (B) 呼吸系統阻塞性傷害
 - (C) 潰瘍性結腸炎
 - (D) 肺隔離症 (Pulmonary sequestration)

48. 下列哪些可能是「腎病症候群 (Nephrotic syndrome)」的病因或危險因子？
- (A) 局部節段性腎絲球硬化症
 - (B) 類澱粉沉積症
 - (C) 非類固醇消炎藥
 - (D) B 型肝炎
49. 下列關於心肌肥厚的敘述，何者為是？
- (A) 病因有可能是心臟瓣膜疾病、心肌病變、高血壓或是甲狀腺亢進
 - (B) 定義是心臟肌肉肥大或心臟肥大
 - (C) 正常人如職業性運動員因長期有氧運動可產生生理性心肌肥厚
 - (D) 不會有症狀，但是若惡化最終會導致心臟衰竭
50. 高血壓的被保險人出現下列何者情況時，須謹慎評估或拒保？
- (A) 蛋白尿且合併舒張壓超過 100 毫米汞柱(mmHg)
 - (B) 病歷中心臟超音波確定有心臟肥大之情形
 - (C) 惡性高血壓
 - (D) 合併有腦血管疾病