

**中華民國人壽保險管理學會**  
**108 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 以下有關退化性關節炎的敘述，何者錯誤？
  - (A) 是最常見的關節炎
  - (B) 最常見於老年人
  - (C) 是因關節中滑膜受損而造成
  - (D) 最常侵犯的關節是膝關節
  
2. 以下有關骨髓炎的敘述，何者錯誤？
  - (A) 依據致病的原因有血行性骨髓炎和外傷性骨髓炎
  - (B) 兒童的急性骨髓炎大多由血行性感染所造成
  - (C) 造成慢性骨髓炎最常見的原因是外傷造成的
  - (D) 最常引起骨髓炎的致病微生物是黴菌
  
3. 有一病患的腎功能不佳，且合併肝纖維化、口腔潰瘍、關節疼痛、何杰金氏病。最可能是罹患以下何種疾病？
  - (A) 筋肌膜疼痛症候群
  - (B) 類風溼性關節炎
  - (C) 血友病
  - (D) 全身性紅斑性狼瘡
  
4. 以下有關視網膜剝離的敘述，何者錯誤？
  - (A) 常見於高度近視眼
  - (B) 眼球感染可能導致視網膜剝離
  - (C) 青光眼是造成視網膜剝離最常見的原因
  - (D) 鞏膜扣壓是治療視網膜剝離的方法之一
  
5. 以下何者不是慢性發炎性疾病？
  - (A) 類風濕性關節炎
  - (B) 全身性紅斑性狼瘡
  - (C) 椎間盤突出
  - (D) 慢性骨髓炎

6. 以下有關僵直性脊椎炎，何者錯誤？
- (A) 是一種自體免疫疾病
  - (B) 好發於男性，只會侵犯脊椎
  - (C) X光最典型的變化是薦腸骨關節出現發炎現象
  - (D) 若不治療，可能會造成結締組織鈣化而導致脊椎僵直，無法活動
7. 以下何者不是構成骨盆的骨頭？
- (A) 坐骨(ischium)
  - (B) 髖骨(hip bone)
  - (C) 薦骨(sacrum)
  - (D) 腰椎
8. 以下有關下肢骨頭的敘述，何者錯誤？
- (A) 內踝是脛骨的一部分
  - (B) 外踝是脛骨的一部分
  - (C) 距骨是跗骨(Tarsal bone)的一部分
  - (D) 在脛骨的上端有兩個凸起，分別是內髁(medial condyle)及外髁(lateral condyle)
9. 列何者是 HBeAg 陽性所代表的臨床意義？
- (A) B 型肝炎感染後已痊癒
  - (B) B 型肝炎疫苗接種後
  - (C) 體內 B 型肝炎病毒仍在複製
  - (D) 對 B 型肝炎已有免疫力
10. 下列關於肝膿瘍的描述，何者錯誤？
- (A) 發燒及右上腹痛是肝膿瘍的常見症狀
  - (B) 台灣臨床所見的肝膿瘍大多由阿米巴原蟲引起
  - (C) 肝膿瘍的病人驗血鹼性磷酸酶(ALK-P)可能升高
  - (D) 免疫力低下的人較易發生肝膿瘍
11. 下列何者是台灣肝癌的最主要病因？
- (A) 酗酒
  - (B) B 型肝炎
  - (C) 幽門螺旋桿菌
  - (D) 黃麴毒素

12. 下列何項血液檢驗結果在兒童會較成年人高？
- (A) 血糖
  - (B) 尿酸
  - (C) 三酸甘油酯
  - (D) 鹼性磷酸酶
13. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷標準？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
  - (B) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 200mg/dl
  - (C) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 200mg/dl
  - (D) 小便出現尿糖
14. 下列何種激素分泌過多，易造成月亮臉、水牛肩等症狀？
- (A) 生長激素(GH)
  - (B) 甲狀腺刺激素(TSH)
  - (C) 腎上腺刺激素(ACTH)
  - (D) 濾泡刺激素(FSH)
15. 下列何者不是甲狀腺機能亢進的常見症狀？
- (A) 心跳變慢
  - (B) 腹瀉
  - (C) 怕熱
  - (D) 體重減輕
16. 糖尿病可能導致下列何種眼睛病變？
- (A) 視網膜病變
  - (B) 白內障
  - (C) 青光眼
  - (D) 以上皆是
17. 下列針對「水腦症(Hydrocephalus)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦脊髓液來源自硬腦膜的分泌。
  - (B) 水腦症的罹患年齡僅限於兒童。
  - (C) 先天因素是造成水腦症的唯一原因。
  - (D) 水腦症是可以治療的，一般以外科手術治療為主。手術後腦脊髓液引流管發生阻塞時有所見，因此定期醫療回診追蹤是必須的。

18. 下列針對「酒精或藥物濫用成癮 (Alcoholism、Drug Abuse)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 此種成癮者，一旦突然停用酒精或藥毒物，也不會造成行為的異常及生理上的異常。
  - (B) 有精神障礙問題者，是此類病症的高危風險人群。
  - (C) 此症易戒斷，治療容易，且不易復發，因此較不會造成失能。
  - (D) 藥物濫用成癮者同時合併有酒癮的情形，所佔比例不高。
19. 下列何者不是「腦出血(Cerebral Hemorrhage)」的併發症？
- (A) 憂鬱症。
  - (B) 癲癇。
  - (C) 失語症。
  - (D) 自體免疫病症。
20. 下列的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 巴金森氏症(Parkinsonism)，可能的致病原因包括先天因素、環境因素、藥物、毒物、頭外傷、腦血管疾病、老化等。
  - (B) 外科手術多用於坐骨神經痛症狀長期無改善或持續惡化患者。
  - (C) 外科手術治療如腦深部刺激術對於輕度運動障礙的巴金森氏症(Parkinsonism)病患是治療選項之一。
  - (D) 腦栓塞患者在發作初期可以接受血栓融解治療。
21. 下列針對「神經系統」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腦幹是神經系統內相當重要的一部份，若腦幹已經停止活動的人可判定為死亡。
  - (B) 在神經系統內有多種的化學傳導物，其中最主要的是乙醯膽鹼(Acetylcholine)與正腎上腺素(Noradrenaline)。
  - (C) 中樞神經系統定義為存在於腦部與骨髓內的神經組織。
  - (D) 自主神經系統包含交感神經徑路(Sympathetic pathway)與副交感神經徑路(Parasympathetic pathway)兩部份。
22. 關於「癲癇重積狀態(Status epilepticus)」之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 癲癇重積狀態多數無需急診或住院治療。
  - (B) 癲癇重積狀態是由於腦細胞過度放電所引起。
  - (C) 癲癇重積狀態是最嚴重的癲癇發作。
  - (D) 癲癇重積狀態其中特別嚴重的是強直合併抽搐性大發作。

23. 下列針對「腦瘤(Brain tumor)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 原發性惡性腦瘤在任何年齡皆會發生。
  - (B) 部份腦瘤與一些遺傳因素有關。
  - (C) 腦瘤不一定會造成明顯的症狀。
  - (D) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤佔第一位。
24. 下列針對「精神病 (Psychosis)」的敘述，何者正確是的？
- (A) 精神病並不少見，其發生率在不同的文化、地域之間，也不會有較大的差異。
  - (B) 精神病人對於自己的異常狀態非常瞭解，常會主動尋求醫療或他人的幫助。
  - (C) 自殺是憂鬱症、躁鬱症的最大問題。
  - (D) 精神病經治療後，皆能達到痊癒狀態，不會復發或變為慢性長期病症。
25. 下列針對「肺膿瘍(Lung Abscess)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 抗生素治療
  - (B) 支氣管鏡排膿或引流
  - (C) 外科手術
  - (D) 支氣管胸膜瘻管非併發症之一
26. 下列「腎功能不全(Renal Insufficiency)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可能指腎臟功能急性受損惡化
  - (B) 可能指腎臟功能慢性受損惡化
  - (C) 腎功能降至正常的百分之五十以下即達「尿毒症」階段
  - (D) 末期腎臟疾病階段需考慮腎臟替代療法
27. 下列有關「扁桃腺」的敘述，何者是正確的？
- (A) 非由淋巴組織構成
  - (B) 位於鼻咽部、口咽部及舌根
  - (C) 與人體免疫機能無關
  - (D) 習慣性扁桃腺炎不適合以「扁桃腺切除術」治療
28. 下列「尿石症」治療方式何者為非侵入性治療？
- (A) 經皮腎造口術
  - (B) 經皮超音波碎石取出術
  - (C) 體外震波碎石術
  - (D) 以上(A)(B)(C)皆是

29. 下列針對「鼻咽癌(Nasopharyngeal cancer)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 發生時可能會有耳、鼻及腦部症狀
  - (B) 與 EB 病毒(Epstein Barr virus) 可能有關
  - (C) 非屬於放射敏感的腫瘤
  - (D) 超過五年以後才復發的機率小於兩年內復發的機率
30. 「癌症已穿出前列腺的被膜，但仍侷限於前列腺附近」的敘述，為前列腺癌(Prostatic cancer)第幾期？
- (A) A 期
  - (B) B 期
  - (C) C 期
  - (D) D 期
31. 下列針對「重積性氣喘(Status asthmaticus)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種氣喘危象
  - (B) 氣喘急性發作時對治療反應不佳而造成咽喉暫時性痙攣收縮
  - (C) 嚴重時可導致呼吸衰竭和死亡
  - (D) 也為氣喘併發症之一
32. 下列針對「腎絲球腎炎(Glomerulonephritis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指腎臟的腎絲球發生損傷和發炎
  - (B) 會影響腎臟的過濾功能
  - (C) 可能表現出蛋白尿、水腫、高血壓
  - (D) 不可能發生末期腎臟衰竭
33. 請問「第一心音」是由心臟什麼構造與什麼構造之間的動作所完成的？
- (A) 心房與心室之間的瓣膜關閉
  - (B) 心房與心室之間的瓣膜打開
  - (C) 心室與動脈之間的瓣膜關閉
  - (D) 心室與動脈之間的瓣膜打開
34. 下列關於血球的敘述，何者為非？
- (A) 血小板是由骨髓中的巨核細胞(Megakaryocyte)所形成
  - (B) 貧血是指紅血球中的血紅素(Hemoglobin)缺乏所致，男生血紅素正常狀態下通常比女生低
  - (C) 主要製造血球的場所是骨髓
  - (D) 白血球中有很多分類，主要負責身體的免疫功能

35. 可以精確診斷「缺氧性心臟病」，甚至也可一併治療的為下列哪一種檢查？
- (A) 運動心電圖壓力測試
  - (B) 心導管檢查
  - (C) 氯化亞鉍心肌顯像
  - (D) 24 小時心電圖
36. 長期未控制的高血壓，可造成末梢器官的損傷，下列何器官「不屬於」常見損傷的末梢器官或部位？
- (A) 眼睛視網膜動脈
  - (B) 腦部
  - (C) 胰臟
  - (D) 腎臟
37. 以下關於「發紺(cyanosis)」的敘述，何者正確？
- (A) 「先天性心臟病」可以造成中心型發紺
  - (B) 「變性血紅素血症」可以造成周邊型發紺
  - (C) 「雷諾氏現象」(Raynaud phenomenon)為中心型發紺的表現
  - (D) 外在環境如高海拔處所致為周邊型發紺
38. 關於心臟疾病的治療方式，何者配對為「錯」？
- (A) 心衰竭——找原因，強心劑，利尿劑，給氧
  - (B) 嚴重主動脈瓣狹窄——冠狀動脈繞道手術
  - (C) 心肌梗塞——臥床給氧，抗凝血劑，血小板抑制劑，嗎啡止痛
  - (D) 心絞痛——冠狀動脈擴張術
39. 下列哪個檢查可診斷出心律不整？
- (A) 胸部 X 光攝影
  - (B) 心導管檢查
  - (C) 抽血檢驗心肌酶
  - (D) 心電圖
40. 以下心臟疾病與物質使用(Substance use)的配對，何者為「非」？
- (A) 心包膜炎——靜脈毒品注射
  - (B) 竇性心跳過速(sinus tachycardia)——咖啡
  - (C) 缺血性心臟病——抽菸
  - (D) 心房纖維顫動(atrial fibrillation)——急、慢性酒精中毒



貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 糖尿病與下列何者眼疾有密切的關係？
- (A) 青光眼
  - (B) 白內障
  - (C) 近視眼
  - (D) 視網膜剝離
42. 以下何者疾病，是造成白內障的原因？
- (A) 高度近視眼
  - (B) 眼科手術
  - (C) 眼外傷
  - (D) 老化
43. 下列關於 C 型肝炎的描述，何者錯誤？
- (A) 台灣的 C 型肝炎大多於嬰幼兒時期感染
  - (B) 感染 C 型肝炎後大多可自然痊癒
  - (C) C 型肝炎主要經口感染
  - (D) C 型肝炎感染可能導致肝硬化或肝癌
44. 下列關於胰臟炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 腹部外傷是台灣急性胰臟炎的最常見原因
  - (B) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
  - (C) 急性胰臟炎發作時血清脂肪酶(Lipase)數值會下降
  - (D) 腹痛是急性胰臟炎的常見症狀
45. 下列的敘述，何者是正確的？
- (A) 風濕性心臟病併發腦栓塞者其發生年齡多較輕，而血管硬化相關的斑塊剝落或冠心症併發腦栓塞者，則多以年長者居多。
  - (B) 每千名嬰兒，大約有兩個腦性麻痺。這種狀況未因科技及環境的進步，而使發生率有所減少。
  - (C) 腦性麻痺是腦部中樞神經在出生前後受到傷害所造成的綜合結果。
  - (D) 腦栓塞(Cerebral embolism)的臨床症狀，依血管堵塞的大小及相關位置的不同而異。

46. 下列的敘述，何者是不正確的？
- (A) 『器質性精神病』是因為來自頭顱鄰近部位如牙齒感染、鼻竇炎、耳炎等的感染造成。
  - (B) 暫時性腦缺血(T. I. A.)，這種狀況可視為腦性麻痺的前兆。
  - (C) 腦炎(Encephalitis)，若因皰疹病毒、日本腦炎病毒、腸病毒造成，則發生的過程相當緩慢。若是寄生蟲、黴菌等造成，則病程發生相對急速。
  - (D) 腦膿瘍(Brain Abscess)是腦部因藥物、酒精、代謝異常等，造成腦組織病變，所引起的腦部功能退化障礙。
47. 下列針對「慢性支氣管炎(Chronic Bronchitis)」的定義敘述，何者是必需的？
- (A) 至少連續二年，每年至少有三個月，幾乎每天持續性地有痰和黏液的咳
  - (B) 且需先排除其他明確原因引起的咳嗽
  - (C) 肺腺泡(pulmonary acinus)呈現永久破壞性的擴張
  - (D) 肺血管需被血液循環而來的栓子所堵塞
48. 下列針對「腎臟」的敘述，何者是正確的？
- (A) 位於腹腔
  - (B) 腎元(Nephron)是腎臟內產生尿液的部份
  - (C) 可分泌「紅血球生成素(Erythropoietin)」
  - (D) 尿液產生後會通往腎盞、腎盂，然後經由輸尿管離開腎臟
49. 下列哪些心臟疾病容易感染心內膜炎？
- (A) 先天性心臟病
  - (B) 冠狀動脈疾病
  - (C) 心臟瓣膜疾病
  - (D) 風溼性心臟病
50. 下列哪些可以發生在心臟正常的人身上？
- (A) 陣發性心房性心跳過速(Paroxysmal supraventricular tachycardia)
  - (B) 竇性心跳過速(Sinus tachycardia)
  - (C) 心室期外收縮(ventricular extrasystole)
  - (D) 運動員生理性心肌肥厚