

中華民國人壽保險管理學會
108 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下哪一種狀況最可能造成凝血因子 I、凝血因子 II 的缺乏，而造成身體容易出血？
 - (A) 肝臟疾病
 - (B) 腎功能不良
 - (C) 脾臟功能阻礙
 - (D) 骨髓造血功能障礙

2. 以下有關何杰金氏症(Hodgkin' s Disease)的敘述，何者是對的？
 - (A) 是一種淋巴瘤，是屬於惡性疾病(癌症)
 - (B) 是一種內分泌的疾病
 - (C) 是起源於肺部腫瘤
 - (D) 主要是侵犯肺臟、皮膚等

3. 高度近視眼與以下何者疾病無明顯關係？
 - (A) 白內障
 - (B) 虹彩炎
 - (C) 視網膜出血
 - (D) 視網膜剝離

4. 以下何種疾病與鼻竇炎相關？
 - (A) 腺樣體肥大
 - (B) 鼻中膈彎曲
 - (C) 囊狀纖維化(cystic fibrosis)
 - (D) 以上皆是

5. 以下何者不是構成胸廓的骨頭？
 - (A) 胸骨
 - (B) 肋骨
 - (C) 胸椎
 - (D) 肩胛骨

6. 以下何者不是屬於頭蓋骨(cranial bone)的一部分？
- (A) 顴骨
 - (B) 額骨
 - (C) 頂骨
 - (D) 顳骨
7. 以下何者狀況是導致貧血的原因？
- (A) 葉酸缺乏
 - (B) 自體免疫疾病
 - (C) 慢性腎衰竭
 - (D) 以上皆是
8. 有關類風濕性關節炎的敘述，何者是錯的？
- (A) 是一種慢性發炎性疾病
 - (B) 可能產生心臟病、腎臟病和血管炎
 - (C) 容易發病於中年婦女
 - (D) 主要侵犯的關節為身體的大關節
9. 「遭 B 型肝炎病毒垂直感染之嬰幼兒於幼年時期因免疫機能尚未健全，故與體內繁殖之 B 型肝炎病毒相安無事，和平共存，此時之肝功能一切正常」，此期稱之為？
- (A) 感染後已痊癒
 - (B) 殘餘期
 - (C) 免疫廓清期
 - (D) 免疫耐受期
10. 下列關於糖尿病治療的敘述，何者錯誤？
- (A) 第一型糖尿病主要以胰島素注射治療
 - (B) 嚴重的第二型糖尿病也可能需要使用胰島素注射治療
 - (C) 食物控制也是第二型糖尿病治療的選擇
 - (D) 口服降血糖藥只適用在第一型糖尿病
11. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過多少，即可診斷為糖尿病？
- (A) 110mg/dl
 - (B) 126mg/dl
 - (C) 140mg/dl
 - (D) 200mg/dl

12. 下列關於肝硬化(Liver cirrhosis)的敘述，何者錯誤？
- (A) 肝細胞因反覆發炎逐漸被纖維組織取代
 - (B) 早期不一定會有明顯的症狀
 - (C) 台灣造成肝硬化的最主要病因為酗酒
 - (D) 重度肝硬化可能發生食道靜脈曲張
13. 下列何者上升為診斷肝性腦病變(Hepatic encephalopathy)的主要驗血檢查指標？
- (A) 血液凝血酶原時間
 - (B) 血中氨值
 - (C) 血中膽紅素值
 - (D) 血中白蛋白值
14. 下列關於甲狀腺的敘述，何者錯誤？
- (A) 甲狀腺分泌甲狀腺激素(T3、T4)
 - (B) 甲狀腺分泌的激素過多，稱為功能亢進
 - (C) 甲狀腺缺乏甲狀腺刺激素(Thyroid stimulating hormone, TSH)的刺激，甲狀腺激素的分泌就會增加
 - (D) 甲狀腺功能亢進的發生率，女性比男性高，好發年齡約 20 至 40 歲
15. 目前已確知的肝炎病毒，有 A、B、C、D、E 五型。下列何者以血液或體液為主要傳染途徑？
- (A) A 型、B 型、C 型
 - (B) B 型、C 型、E 型
 - (C) C 型、D 型、E 型
 - (D) B 型、C 型、D 型
16. 下列腦下垂體所分泌的激素，何者分泌過多，若發生在青春期之後，會造成「肢端肥大症」？
- (A) 生長激素(Growth hormone)
 - (B) 甲狀腺刺激素(Thyroid stimulating hormone)
 - (C) 腎上腺刺激素(Adrenal cortical stimulating hormone)
 - (D) 黃體成長素(Luteinizing hormone)

17. 下列針對「癲癇 (Epilepsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 癲癇的病因甚廣，但是大約有三分之一到半數以上的患者，無法找到導致癲癇發作確定的原因
 - (B) 大部分的癲癇患者需經手術治療
 - (C) 癲癇發病是由於肌肉細胞過度放電所引起的現象
 - (D) 癲癇發作時一定會合併意識喪失
18. 下列針對「頭痛」的敘述，何者不正確？
- (A) 不同原因造成的頭痛，其性質、位置、嚴重性、相關誘發因素、有否預感、變化程度、持續時間等，也各不相同
 - (B) 頭痛一般依其發生原因來治療
 - (C) 精神壓力、精神疾病不可能是導致頭痛的原因
 - (D) 絕大部分的頭痛不會影響壽命，但慢性嚴重頭痛對生活品質有大的影響
19. 下列針對「阿爾茲海默氏症 (Alzheimer' s disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 阿爾茲海默氏症導因於腦神經細胞退化
 - (B) 藉由臨床失智量表 (Clinical Dementia Rating Scale CDR) 評估
 - (C) 失智症中以阿茲海默氏症佔最多，次之為血管性失智症
 - (D) 以上皆是
20. 下列何者是「巴金森氏症 (Parkinsonism)」的治療方式？
- (A) 藥物治療
 - (B) 外科手術治療
 - (C) 物理治療
 - (D) 以上皆是
21. 關於「精神官能症 (Neurosis, Psychosomatic Disorders)」之敘述，下列何者正確？
- (A) 精神官能症是一種常見的精神疾病，盛行率一般可達 10% 以上，相對於嚴重精神病而言，精神官能症是一群較輕型的精神疾病，但它不是一種單一的疾病，而是包含有焦慮性精神官能症、強迫性精神官能症、畏懼性精神官能症、身心症、焦慮症、恐慌性精神官能症等。
 - (B) 此類病患的精神狀態與現實嚴重脫離。
 - (C) 此症與嚴重的精神病最大不同，在於此類患者無自覺病感。
 - (D) 精神官能症不會引起生理及心理上的不適。

22. 下列的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 外科手術多用於坐骨神經痛症狀長期無改善或持續惡化患者。
 - (B) 成人原發性惡性腦瘤多好發於後顱窩，其中以惡性膠質細胞瘤為最常見。
 - (C) 巴金森氏症(Parkinsonism)，目前仍沒有根治的方法。
 - (D) 腦脊髓液來源自腦室壁脈絡叢的分泌。
23. 下列的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腦出血的症狀通常較腦栓塞來的嚴重。
 - (B) 造成坐骨神經痛最多的原因是腰椎椎間盤軟骨突出病變。
 - (C) 暫時性腦缺血(T. I. A.)這種狀況可視為較嚴重腦梗塞的前兆。
 - (D) 腦性麻痺的功能障礙經過治療後，皆可得到根治。
24. 下列針對「精神病 (Psychosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 精神病的診斷，因為症狀常會變化 所以診斷的變異性較大。
 - (B) 「器質性精神病」是腦部因疾病，藥物、酒精、創傷、代謝異常等，造成腦組織病變，所引起的腦部功能障礙。
 - (C) 此病由症狀出現到診斷確定，有時需經過很長的時間。
 - (D) 以上皆是
25. 下列何疾病乃指「終末細支氣管遠端的肺組織〔即肺腺泡 (pulmonary acinus)〕，呈現永久破壞性的擴張，併伴有肺泡壁破裂及彈性組織的損傷，造成肺彈性回縮力的喪失和呼吸道的塌陷與阻塞」？
- (A) 支氣管擴張症
 - (B) 氣喘
 - (C) 慢性支氣管炎
 - (D) 肺氣腫
26. 下列有關「腎絲球腎炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 「腎絲球」為腎臟結構之一
 - (B) 會影響腎臟的過濾功能
 - (C) 不會發生末期腎臟衰竭
 - (D) 「糖尿病腎病變」為腎絲球腎炎的型態之一

27. 下列有關「肺膿瘍 (Lung Abscess)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為肺部各種惡性腫瘤之一
 - (B) 會造成肺實質組織壞死空洞
 - (C) 以放射治療為主
 - (D) 外科手術非治療選項之一
28. 下列有關「經皮超音波碎石取出術(Percutaneous ultrasonic lithotripsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為一種非侵入性的治療
 - (B) 在腹部造口，利用內視鏡取出在腎盂的結石
 - (C) 超音波探針可經由腎臟造瘻口插入
 - (D) 腎結石所在之部位手術切開組織取出結石
29. 下列針對「鼻咽癌 (Nasopharyngeal cancer)」治療的敘述，何者是正確的？
- (A) 屬於對放射治療不敏感的腫瘤
 - (B) 某些期別加上化學治療可提高治療率
 - (C) 放射治療不會出現副作用
 - (D) 放射治療只可使用在局部復發者
30. 下列有關「子宮內膜異位症(Endometriosis)」的敘述，何者是正確的敘述？
- (A) 為子宮惡性腫瘤之一
 - (B) 非慢性骨盆腔疼痛的原因之一
 - (C) 手術治療為唯一治療選項
 - (D) 子宮肌腺症為子宮內膜的組織結構侵入子宮肌層中
31. 下列針對「支氣管擴張症(Bronchiectasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指支氣管壁的構造遭受發炎和破壞
 - (B) 使支氣管呈現可回復的不正常擴張
 - (C) 纖毛清除功能會受損
 - (D) 兒童也可能罹病
32. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因腎臟的腎盂受損
 - (B) 會導致蛋白尿
 - (C) 會導致全身性水腫
 - (D) 會導致高脂血症

33. 關於「腫瘤」在理賠實務的相關敘述,何者為錯?
- (A) 在無法取得病理報告的特殊狀況下,可適時參酌影像、抽血檢驗報告、臨床醫師病歷描述,或死亡診斷證明。
 - (B) 子宮頸抹片報告為細胞學報告。
 - (C) 胸腺瘤在現行醫學分類裡為良性的腫瘤。
 - (D) 病理報告中,組織病理碼(ICD-0)結尾 3 代表此為惡性腫瘤。
34. 病理報告中最重要的是診斷的部份,以下為某個病理報告之診斷:
Stomach, high body, endoscopic mucosal resection -----
Adenocarcinoma in situ, margin free
請問哪段文字是指「病理診斷」?
- (A) Stomach
 - (B) high body
 - (C) endoscopic mucosal resection
 - (D) Adenocarcinoma in situ
35. 下列哪個檢查可診斷出心律不整?
- (A) 胸部 X 光攝影
 - (B) 心導管檢查
 - (C) 抽血檢驗心肌酶(cardiac enzymes)
 - (D) 心電圖
36. 下列關於血球的敘述,何者為非?
- (A) 血小板是由骨髓中的巨核細胞(Megakaryocyte)所形成。
 - (B) 貧血是指紅血球中的血紅素(Hemoglobin)缺乏所致,男生血紅素正常狀態下通常比女生低。
 - (C) 主要製造血球的場所是骨髓。
 - (D) 白血球主要負責身體的免疫功能。
37. 下列關於「主動脈血管瘤」的敘述,何者為「非」?
- (A) 剝離位置發生在升主動脈比較危險。
 - (B) 風濕免疫疾病可為病因之一。
 - (C) 平常無症狀,剝離時會出現劇烈疼痛。
 - (D) 併發症為壓迫鄰近血管,造成上游器官缺血;也可以造成血栓或大出血,甚至導致死亡。

38. 關於心臟各構造及其功能的相關敘述，何者為非？
- (A) 心房與心室中間有瓣膜，右邊為三尖瓣，左邊為二尖瓣
 - (B) 心臟瓣膜的功能在於防止血液逆流
 - (C) 心臟分層由外而內，為心肌→心包膜→心內膜
 - (D) 左幫浦排出血液到主動脈，主動脈提供全身組織富含氧氣的血液
39. 將病人腿部隱靜脈 (Saphenous vein)，相接於冠狀動脈阻塞處之遠端區與降主動脈，或是撥出病人的內乳動脈接於冠狀動脈阻塞處的下方，此手術是稱為？
- (A) 經皮穿腔冠狀動脈成型術
 - (B) 冠狀動脈血管支架置入術
 - (C) 冠狀動脈粥狀硬化物刮除術
 - (D) 冠狀動脈繞道手術
40. 關於「不穩定心絞痛」，「沒有」下列哪個特徵？
- (A) 運動跟休息都會發作
 - (B) 冠狀動脈攝影檢查會發現血管沒有狹窄
 - (C) 一次又一次發作的症狀越來越嚴重
 - (D) 發作的頻率越來越高

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 有關椎間盤突出(Herniation of Intervertebral Disc) 的敘述，何者有誤？
- (A) 最常發生椎間盤突出的部位是尾椎
 - (B) 年齡老化是危險因子之一
 - (C) 腰椎間盤突出可能會造成坐骨神經痛
 - (D) 大部分的人需要經過手術才能改善症狀
42. 有關骨髓炎的敘述，何者是對的？
- (A) 在台灣最常見的慢性骨髓炎的原因是外傷
 - (B) 台灣最常見的致病微生物是結核桿菌
 - (C) 慢性骨髓炎的症狀常常僅是一個反覆發作無法癒合的傷口或膿管
 - (D) 骨髓炎的治療常需要抗生素與清創術同時進行

43. 下列關於胰臟炎的敘述，何者正確？
- (A) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
 - (B) 在台灣造成急性胰臟炎最主要的原因為膽石症及酒精
 - (C) 慢性胰臟炎最常見的原因是酗酒
 - (D) 血清澱粉酶與脂肪酶指數下降是診斷急性胰臟炎的重要診斷工具
44. 下列關於肝功能檢查的敘述，何者正確？
- (A) 當一次大量飲酒後，r-GT(麩胺醯轉移酶) 即可能顯著上升
 - (B) 發育中的兒童 ALK-P(鹼性磷酸酶) 會下降
 - (C) GPT(ALT) 明顯高於 GOT(AST) 時，可能代表酒精性肝病
 - (D) 肝硬化患者，Albumin(白蛋白) 可能降低
45. 下列的敘述，何者是正確的？
- (A) 風濕性心臟病併發腦栓塞者其發生年齡多較輕，而血管硬化相關的斑塊剝落或冠心症併發腦栓塞者，則多以年長者居多。
 - (B) 肌腱肌膜炎、頸椎問題也可能是導致頭痛的原因。
 - (C) 腦性麻痺是腦部中樞神經在出生前後受到傷害所造成的綜合結果。
 - (D) 腦栓塞(Cerebral embolism) 的臨床症狀，依血管堵塞的大小及相關位置的不同而異。
46. 下列針對「神經系統」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦幹是神經系統內相當重要的一部份，若腦幹已經停止活動的人可判定為死亡。
 - (B) 在神經系統內有多種的化學傳導物，其中最主要的是乙醯膽鹼(Acetylcholine) 與正腎上腺素(Noradrenaline)。
 - (C) 中樞神經系統定義為存在於腦部與脊髓內的神經組織。
 - (D) 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為：硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜。
47. 下列何者可能為治療「肺栓塞」時所需要的？
- (A) 給予氧氣
 - (B) 血栓溶解劑治療
 - (C) 「栓子切除」的手術治療
 - (D) 手術置入「下腔靜脈濾器」

48. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為早期腎臟功能不全的臨床表現
 - (B) 可由急性腎臟衰竭導致
 - (C) 只會對泌尿系統造成傷害
 - (D) 肌酸酐清除率(Creatinine clearance)低於 10 mL/min 時就有可能出現
49. 以下關於「全身性水腫」的病因有哪些？
- (A) 肝臟疾病
 - (B) 腎臟疾病
 - (C) 營養不良
 - (D) 懷孕期間下腔靜脈被壓迫
50. 以下哪些為「發紺性先天性心臟病」？
- (A) 法洛氏四合症
 - (B) 大血管轉位
 - (C) 全肺靜脈回流異常
 - (D) 心房中膈缺損