

**中華民國人壽保險管理學會**  
**109 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 下列有關類風濕性關節炎之敘述，何者為錯誤？
  - (A) 是一種急性、發炎性的疾病，可完全痊癒而無留下後遺症
  - (B) 以女性患者較多
  - (C) 發病原因不明，可能與遺傳和環境因子互相作用有關
  - (D) 類風濕性關節炎主要的關節病理變化是”滑膜炎”(Synovitis)
  
2. 下列有關全身性紅斑性狼瘡之敘述，何者為錯誤？
  - (A) 是一種反覆的、慢性的、侷限性的感染性疾病
  - (B) 女性患者比男性多
  - (C) 症狀千奇百怪，每個人都不盡相同
  - (D) 患者抗細胞抗體(ANA)可能會有陽性反應
  
3. 下列有關愛滋病(AIDS)之敘述，何者為錯誤？
  - (A) 愛滋病是感染人類免疫缺乏病毒(HIV)所引起的疾病表現
  - (B) 感染愛滋病的病毒後，主要是人體的細胞免疫被破壞
  - (C) 目前愛滋病人都是同性戀者
  - (D) 受愛滋病毒感染後，需要一段時間才能檢驗出愛滋病毒的抗體
  
4. 下列何者為早產兒最常出現的眼睛疾病？
  - (A) 白內障
  - (B) 青光眼
  - (C) 視網膜病變
  - (D) 視神經病變
  
5. 乳突炎(Mastoiditis)最常是下列哪一個疾病的併發症？
  - (A) 鼻竇炎
  - (B) 中耳炎
  - (C) 結膜炎
  - (D) 肺炎

6. 有關再生不良性貧血之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 是骨髓造血細胞減少或衰竭的臨床表現
  - (B) 患者的血液中，只有紅血球會減少，而有貧血的現象
  - (C) 藥物(如氯黴素)或化學製品(如苯)都能造成此疾病發生
  - (D) 是一種慢性疾病，可能反覆再發
7. 有關免疫性血小板缺乏性紫斑症敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 抗磷脂質症候群(Antiphospholipid Syndrome)是可能的原因之一
  - (B) 血液常規的檢查，可發現血小板減少
  - (C) 無法治療，會慢性化並終身伴隨的疾病
  - (D) 脾臟切除也是治療的方式之一
8. 下列何種疾病不是由病毒感染？
- (A) 水痘
  - (B) 單純性疱疹
  - (C) 香港腳
  - (D) 帶狀疱疹
9. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 200mg/dl
  - (B) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 200mg/dl
  - (C) 糖化血色素(HbA1c)超過 5.6%
  - (D) 飯前血糖超過 126mg/dl
10. 下列何種肝炎病毒不易導致慢性肝炎？
- (A) D 型肝炎
  - (B) C 型肝炎
  - (C) B 型肝炎
  - (D) A 型肝炎
11. 下列何者不是夏科氏三症(Charcot's triad)的症狀？
- (A) 發燒
  - (B) 水腫
  - (C) 膽絞痛
  - (D) 黃疸

12. 乳漏症常因下列何種腦下垂體荷爾蒙分泌太多引起？
- (A) 濾泡刺激素(FSH)
  - (B) 黃體生長素(LH)
  - (C) 腎上腺刺激素(ACTH)
  - (D) 泌乳激素(Prolactin)
13. 下列關於糖尿病之敘述，何者為錯誤？
- (A) 嚴重的第二型糖尿病可能需要使用胰島素注射治療
  - (B) 第一型糖尿病主要發生在小孩子及年輕人
  - (C) 口服降血糖藥只適用在第一型糖尿病
  - (D) 多吃、多喝、多尿為糖尿病常見的症狀
14. 下列何者不是消化性潰瘍的常見危險因子？
- (A) 服用阿斯匹靈藥物
  - (B) 飲酒過量
  - (C) 過量胃酸
  - (D) 大腸桿菌感染
15. 下列何者不是急性胰臟炎的常見危險因子？
- (A) 高三酸甘油酯血症
  - (B) 酒精
  - (C) 膽石症
  - (D) B型肝炎
16. 下列何項檢查最能真實直接反映B型肝炎病毒的活性及傳染力？
- (A) HBV DNA
  - (B) IgG-antiHBc
  - (C) AntiHBe
  - (D) HBsAg
17. 下列敘述，何者為正確？
- (A) 「巴金森氏症(Parkinsonism)」是因為中腦黑質所分泌的褪黑激素(Melatonin)細胞大量減少，而致病的。
  - (B) 癲癇症是精神疾病的一種。
  - (C) 先天因素是造成水腦症的唯一原因。
  - (D) 酒精或藥物濫用成癮患者常會發生一些戒斷症狀，如焦慮、憂鬱、沮喪、睡眠障礙、失憶、神經異常等。

18. 下列敘述，何者為正確？
- (A) 高血壓、高血脂、肥胖，糖尿病、吸煙等，是屬於「癲癇(Epilepsy)」的病因。
  - (B) 精神官能症若合併伴有憂鬱、或發展為慢性者，則多數預後不佳。
  - (C) 精神壓力是造成「腦動脈血管瘤(Cerebral aneurysm)」的主要原因。
  - (D) 腦栓塞(Cerebral embolism)的栓子最多的是來自腫瘤的栓子。
19. 下列有關「頭痛」之敘述，何者為正確？
- (A) 慢性頭痛有可能導致精神焦慮。
  - (B) 偏頭痛、血管性頭痛、壓力性頭痛，這些頭痛常可藉著藥物治療達到穩定。
  - (C) 頭痛有可能存在腦壓異常增高或器質性腦病的狀況。
  - (D) 以上皆是。
20. 下列有關「腦炎(Encephalitis)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 腦炎是腦部受到病原體的侵入，或是病原體感染後的免疫反應造成。
  - (B) 腦炎的病因很多，即使經過了仔細的檢查，有不少病例 仍無法找出病原體。
  - (C) 大部分患者會造成後遺症，如癲癇、智能或行為等身心障礙。
  - (D) 需藉由血液、脊髓液的免疫生化及細菌學檢查，以及影像檢查如 CT、MRI 及腦電圖等作為確定診斷的工具。
21. 下列有關「腦膿瘍(Brain Abscess)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 腦膿瘍若延誤治療，會造成嚴重的後果。
  - (B) 此症以外科手術治療為主，抗生素治療為輔。
  - (C) 症狀依腦膿瘍的大小、位置、病原菌的種類、顱內壓的增高程度等，有一些不同。
  - (D) 此症感染原或來自血行傳播，如慢性肺部感染、心內膜炎。
22. 下列針對「腦瘤(Brain tumor)」之敘述，何者為正確？
- (A) 部份腦瘤與一些遺傳因素有關，如多發性神經纖維瘤、結節性硬化症的病患罹患腦瘤機率較高。
  - (B) 兒童腦瘤好發於大腦天幕以上。
  - (C) 成人原發性惡性腦瘤多好發於後顱窩，其中以惡性膠質細胞瘤為最常見。
  - (D) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤佔第二位，僅次於肝臟癌症。

23. 下列敘述，何者為錯誤？
- (A) 精神疾病可能是導致頭痛的原因。
  - (B) 腦性麻痺是造成腦梗塞(Cerebral infarction)的主要原因。
  - (C) 暫時性腦缺血(T. I. A.)常是可恢復性的神經障礙。
  - (D) 有精神障礙問題者，是酒精或藥物濫用成癮此類病症的高危風險人群。
24. 下列敘述，何者為錯誤？
- (A) 阿爾茲海默氏症的部份患者可能會出現如幻覺、幻想、情緒障礙、人格和行為異常症狀。
  - (B) 一些慢性或嚴重的耳科疾病也可能會併發眩暈症。
  - (C) 癲癇發病是由於肌肉細胞過度放電所引起的現象。
  - (D) 智能障礙的成因可能有先天因素，或是後天因素。
25. 下列有關於「氣喘(Asthma)治療」之敘述，何者為正確？
- (A) 最差的方法為去除激起氣喘的因素
  - (B) 藥物治療對預防氣喘再發無效
  - (C) 乙二型交感神經興奮劑( $\beta_2$ -adrenergic agonists)為支氣管擴張劑
  - (D) 類固醇製劑給予方式只有口服或注射
26. 下列有關於「體染色體顯性多囊腎疾病(Autosomal dominant polycystic kidney disease)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 男女皆會罹患
  - (B) 發病於嬰幼兒期
  - (C) 囊腫可在其他器官被發現
  - (D) 可合併顱內動脈瘤的發生
27. 下列針對「塵肺症(Pneumoconiosis)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 因長期吸入有機或無機粉塵(Organic or inorganic dust)
  - (B) 不會導致肺部發炎纖維化
  - (C) 棉塵症、鐵質沈著症皆為塵肺症之一
  - (D) 屬職業性肺疾病之一
28. 下列針對「急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎(Acute poststreptococcal glomerulonephritis)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 在幾天內就可表現出明顯症狀或徵候
  - (B) 致病機轉可能與體液免疫有關
  - (C) 是兒童期腎炎最常見的原因之一
  - (D) 幼童在急性期經適當治療後無法完全痊癒。

29. 下列針對「肺功能檢查」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 「肺容量」是肺功能檢查唯一可獲得的數值
  - (B) 可評估通氣障礙的型態
  - (C) 可評估通氣障礙的嚴重程度
  - (D) 肺氣腫可用肺功能檢查判斷嚴重程度
30. 下列針對「腎功能不全(Renal insufficiency)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 指腎臟功能急性或慢性受損惡化
  - (B) 進而影響水份和蛋白質代謝時所產生的含氮廢物的排除
  - (C) 使體內電解質、酸鹼平衡、內分泌代謝的衡定產生障礙
  - (D) 急性或慢性腎功能不全一定會造成腎臟功能不可逆的損害
31. 下列針對「肺氣腫(Pulmonary emphysema)」之敘述，何者為正確？
- (A) 肺腺泡呈現永久破壞性的擴張
  - (B) 型態依肺腺泡原發病變位置只有一種
  - (C) 盛行率與吸菸量無關
  - (D) 併發症不包括右心衰竭
32. 下列針對「梅毒(Syphilis)」之敘述，何者為正確？
- (A) 為病毒感染所導致的慢性全身性的傳染性疾病
  - (B) 不會經由胎盤傳染給胎兒
  - (C) 無所謂「隱性梅毒期」
  - (D) 梅毒螺旋體血球凝集反應(TPHA)有可能不會因治療成功而轉呈陰性
33. 關於「血壓」，下列敘述何者為錯誤？
- (A) 體檢時丈量的血壓，為動脈之血壓。
  - (B) 一般高血壓症狀不很明顯，但長期血壓高於140/90mmHg不治療的話，併發中風、心臟病、腎臟病的機率比一般人高。
  - (C) 影響血壓的因素眾多，年齡、性別、情緒、新陳代謝、體溫、呼吸、姿勢均為可能因素。
  - (D) 因腎動脈狹窄而造成之續發性高血壓，為內分泌性高血壓之一種。
34. 下列關於「動脈粥狀硬化」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 有關的脂肪是膽固醇(cholesterol)與三酸甘油脂(triglyceride)。
  - (B) 若影響心臟的血管，可引起狹心症與心肌梗塞。
  - (C) 其中膽固醇分類中，好的膽固醇是低密度脂蛋白(LDL)。
  - (D) 治療此疾病，除了藥物控制外，生活調節與飲食控制也是重要的，例如戒菸與少喝酒。

35. 今有一客戶前來投保，告知乳癌病史，其病歷敘述癌症分期為T2N1M0，下列敘述何者為錯誤？
- (A) 此客戶有淋巴結轉移。
  - (B) 此客戶有遠端轉移。
  - (C) T代表乳房腫瘤相關資訊，例如其大小、有無侵犯到皮膚。
  - (D) 體況是否合適承保，應看購買之險種，與後續追蹤癌症治療結果，有否復發或轉移來決定。
36. 關於「癌症」此疾病在核保相關之考量，下列何者「不為」需要考慮的相關因子？
- (A) 癌症分期
  - (B) 有否轉移或復發
  - (C) 若因生活習慣（檳榔、抽菸、喝酒）所致，有否造成其他疾病
  - (D) 以上均是需要考慮的相關因子
37. 心血管系統之相關症狀及徵象，下列敘述何者為錯誤？
- (A) 心悸是一種客觀的評估，非主觀的感受。
  - (B) 水腫是指體液滯留於組織間隙，可分為全身性水腫與局部性之水腫。
  - (C) 發紺代表血球之攜氧量不足，代表缺氧，最常表現在嘴唇與指甲床。
  - (D) 缺血的成因可分為：血管外有壓迫、血管內有阻塞，或是血管痙攣。
38. 下列何者「不能」造成心內膜炎？
- (A) 細菌
  - (B) 病毒
  - (C) 黴菌
  - (D) 動脈粥狀硬化
39. 下列何者為發紺性之先天性心臟病？
- (A) 心房中膈缺損
  - (B) 法洛氏四合症
  - (C) 開放性動脈導管
  - (D) 心室中膈缺損
40. 關於「期外收縮」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 是一種心律不整
  - (B) 正常人也可見
  - (C) 若頻繁發生，不需治療，也不嚴重，可以忽略。
  - (D) 有分為兩大類：「心房期外收縮」與「心室期外收縮」



**貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 下列何種疾病可能會合併關節炎？
- (A) 尿酸過高
  - (B) 細菌感染
  - (C) 硬皮病
  - (D) 牛皮癬(乾癬)
42. 最容易造成椎間盤突出的位置是下列哪兩者？
- (A) 頸椎
  - (B) 胸椎
  - (C) 腰椎
  - (D) 尾椎
43. 下列關於高血脂症的描述，何者為錯誤？
- (A) 甲狀腺功能低下易導致三酸甘油酯(TG)濃度升高
  - (B) 糖尿病易導致低密度脂蛋白膽固醇(LDL)的濃度減少
  - (C) 三酸甘油酯(TG)濃度不易受酒精、飲食等影響而改變
  - (D) 高密度脂蛋白膽固醇(HDL)又稱為「壞膽固醇」
44. 下列何者不是甲狀腺機能亢進的常見症狀？
- (A) 心跳變慢
  - (B) 腹瀉
  - (C) 體重減輕
  - (D) 怕冷
45. 下列有關「重症肌無力(Myasthenia Gravis)」之敘述，何者為正確？
- (A) 重症肌無力症是一種慢性自體免疫疾病。
  - (B) 病情嚴重者可能出現呼吸系統障害，甚至呼吸衰竭現象。
  - (C) 多數患者經藥物治療及胸腺切除治療後，症狀可得到改善。
  - (D) 發病的原因是體內產生抗乙醯胺受體的抗體(anti-AchR autoantibody)。

46. 下列有關「坐骨神經痛(Sciatica)」之敘述，何者為正確？
- (A) 從疼痛症狀本身，通常無法分辨出造成坐骨神經痛的特定原因。
  - (B) 造成坐骨神經痛最多的原因是腰椎椎間盤軟骨突出病變。
  - (C) 糖尿病、腫瘤壓迫、外在壓迫、脊椎骨退化、脊椎椎孔狹窄、脊椎傷害或病變等也是直接或間接造成坐骨神經痛的原因之一。
  - (D) 外科手術多用於坐骨神經痛狀長期無改善或持續惡化患者。
47. 下列哪些可能是核保人員在評估告知曾罹患「肺結核(Pulmonary tuberculosis)」承保個案時，以「醫學資料」而言，相對上為預後較有利的敘述？
- (A) 現症尚未治療結束
  - (B) 相對於「繼發性肺結核」，「原發性肺結核」對預後較有利
  - (C) 有中樞神經系統併發症
  - (D) 正常的肺功能檢查報告
48. 下列哪些是「腎病症候群(Nephrotic syndrome)」可能的病因或危險因子？
- (A) 微小病變性腎病
  - (B) 局部節段性腎絲球硬化症
  - (C) 全身性紅斑性狼瘡
  - (D) B 或 C 型肝炎
49. 下列哪些是可以造成「竇性心跳過速」的原因？
- (A) 咖啡
  - (B) 運動
  - (C) 甲狀腺功能亢進
  - (D) 貧血
50. 下列關於「心絞痛」之敘述，何者為正確？
- (A) 穩定型心絞痛，在運動時發作，舌下硝化甘油可緩解。
  - (B) 不穩定型心絞痛，比穩定型心絞痛更嚴重，為心肌梗塞前兆。
  - (C) 變異型心絞痛與冠狀動脈痙攣有關。
  - (D) 變異型心絞痛，若施行冠狀動脈攝影檢查，不會看到有血管堵塞。