

中華民國人壽保險管理學會
109 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 下列有關淋巴瘤的敘述，何者為錯誤？
 - (A) 是淋巴組織良性增生的結果
 - (B) 在身體任何器官均可能發生
 - (C) 發病時，可從單一淋巴腺發病而蔓延到其他淋巴腺
 - (D) 何杰金氏病是一種淋巴瘤

2. 下列有關白血病的敘述，何者為錯誤？
 - (A) 是骨髓癌化病變的結果
 - (B) 臨床症狀為不正常白血球大量增加，而也導致紅血球、血小板也大量增加
 - (C) 曾接受放射線治療的人，罹患白血病機會較高
 - (D) 因骨髓造血異常，可能有出血傾向，而導致因腸胃道或腦出血而死亡

3. 下列何種營養素缺乏，不是造成貧血的主要原因？
 - (A) 鐵
 - (B) 維他命 B12
 - (C) 葉酸
 - (D) 茄紅素

4. 有關出血的原因，下列敘述何者為錯誤？
 - (A) 壞血病(Scurvey)是因維他命 C 不足而導致血管異常而出血
 - (B) 過敏性紫斑的出血是因血小板減少造成
 - (C) 血友病是因凝血因子缺乏而造成出血
 - (D) 維他命 K 缺乏，會造成凝血異常

5. 下列有關關節炎之敘述，何者為錯誤？
 - (A) 痛風性關節炎與尿酸沉積於關節有關
 - (B) 細菌或病毒感染可能會造成關節炎
 - (C) 類風濕性關節炎是因感染鏈球菌造成
 - (D) 有皮膚症狀的牛皮癬(乾癬)可能合併關節炎發作

6. 有一病患多處淋巴腺腫大，感染結核病且得到卡波西氏肉瘤(Kaposi's Sacoma)則此人最有可能得到下列何種疾病？
- (A) 紅斑性狼瘡
 - (B) 風濕熱
 - (C) 再生不良性貧血
 - (D) 愛滋病
7. 有關肌肉萎縮症之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 大都是遺傳性的疾病
 - (B) 有可能是肌肉或脊髓病變所致
 - (C) 患者僅有肌肉萎縮症狀，不會侵犯其他器官
 - (D) 目前無根本治療方法，只能藉由輔助療法減緩疾病惡化
8. 有關地中海型貧血之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 是最常見的體染色體顯性遺傳疾病，是代代相傳，每個子孫都可能會得到
 - (B) 是因血紅素中的球蛋白多胜鏈合成異常所致
 - (C) 分為 α (甲)型與 β (乙)型
 - (D) 貧血狀況，因溶血嚴重程度可分輕、中、重，故臨床表現也輕重不一
9. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，若確認符合下列何種狀況，即可診斷為糖尿病？
- (A) 明顯尿糖症狀
 - (B) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
 - (C) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (D) 糖化血色素(HbA1c)小於 6.5%
10. 下列何種肝炎病毒不是導致肝硬化的風險因子？
- (A) A 型肝炎
 - (B) B 型肝炎
 - (C) C 型肝炎
 - (D) D 型肝炎
11. 下列何者是潰瘍性大腸炎的可能成因？
- (A) 感染
 - (B) 基因失常
 - (C) 免疫失序
 - (D) 以上皆是

12. 下列何者不是糖尿病導致的常見症狀？
- (A) 多吃
 - (B) 多喝
 - (C) 少尿
 - (D) 體重減輕
13. 下列何者不是成年人甲狀腺機能低下的常見症狀？
- (A) 疲倦
 - (B) 心跳變快
 - (C) 繼發性高血脂症
 - (D) 怕冷
14. 下列關於 C 型肝炎之敘述，何者為錯誤？
- (A) 為一種 RNA 病毒
 - (B) 主要經血液、體液傳染
 - (C) 可打 C 型肝炎疫苗預防感染
 - (D) 新型 C 型肝炎口服抗病毒藥療效可達 9 成以上
15. 下列何者是造成膽道阻塞的最常見原因？
- (A) B 型肝炎
 - (B) 膽管結石
 - (C) 酗酒
 - (D) 高三酸甘油酯血症
16. 下列何種內分泌疾病易造成心房顫抖(Atrial Fibrillation)之心律不整？
- (A) 甲狀腺機能亢進
 - (B) 甲狀腺機能低下
 - (C) 副甲狀腺機能亢進
 - (D) 副甲狀腺機能低下
17. 下列敘述，何者為正確？
- (A) 「重症肌無力(Myasthenia Gravis)」患者，多數經藥物治療及腎上腺切除治療後，症狀可得到改善。
 - (B) 腦動脈硬化症嚴重者會發生腦缺血或併發腦溢血。
 - (C) 重症肌無力(Myasthenia Gravis) 是一種根源於消化系統的問題。
 - (D) 脊髓內的灰質終止於腰椎第五節的高度。

18. 下列敘述，何者為正確？
- (A) 酒精或藥物濫用成癮(Alcoholism, Drug abuse)易造成次發性精神疾病及身體多器官的病變。
 - (B) 腦動脈血管硬化狹窄是造成腦膿瘍的主要原因。
 - (C) 腫瘤壓迫是造成坐骨神經痛最多的原因。
 - (D) 阿爾茲海默氏症(Alzheimer' s disease)的診斷，一般非以臨床症狀判斷為主。
19. 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為：
- (A) 硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
 - (B) 軟腦膜→脈絡叢→硬腦膜
 - (C) 蜘蛛膜→硬腦膜→軟腦膜
 - (D) 脈絡叢→軟腦膜→硬腦膜
20. 關於「眩暈 (Vertigo)」之敘述，下列何者為正確？
- (A) 前庭神經炎、梅尼爾氏症、頸椎性眩暈、良性陣發性眩、聽神經瘤、椎底動脈循環障礙、部分藥物影響、中樞神經病變、精神或情緒不良疾病等，皆可能是造成眩暈的原因。
 - (B) 身體的平衡維持主要由前庭系統，小腦，視覺，及本體感受神經一起管理。
 - (C) 多數狀況下，即使經過了一系列的詳細診斷，但眩暈的病因仍不易輕易被發現。
 - (D) 以上皆是
21. 關於腦膜炎(Meningitis)之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 腦膜炎的致病因以黴菌、寄生蟲感染較為常見
 - (B) 腦脊髓液的生化及微生物檢查是確診此症的關鍵
 - (C) 細菌性腦膜炎一般較病毒性腦膜炎的症狀更為嚴重
 - (D) 腦膜炎嚴重者可併發腦炎、及一些神經性後遺症
22. 關於「腦動脈血管瘤(Cerebral aneurysm)」之敘述，下列何者為正確？
- (A) 腦動脈血管瘤是腦部的危險疾病，破裂後致死率很高。
 - (B) 腦動脈血管瘤造成的原因包括高血壓、動脈硬化、動脈感染或炎症、遺傳、先天等因素。
 - (C) 大部分的腦動脈血管瘤皆微小，未破裂時，多半不會有明顯症狀。
 - (D) 以上皆是

23. 下列敘述，何者為錯誤？
- (A) 腦栓塞患者在發作初期可以接受血栓融解治療
 - (B) 中樞神經系統定義為存在於腦部與骨髓內的神經組織
 - (C) 腦瘤不一定會造成明顯的症狀
 - (D) 精神病經治療後，皆能達到痊癒狀態，不會變為慢性長期病症
24. 下列敘述，何者為錯誤？
- (A) 腦性麻痺是腦動脈硬化症所造成的綜合結果
 - (B) 頭痛有可能存在腦壓異常增高或器質性腦病的狀況
 - (C) 巴金森氏症 (Parkinsonism)，目前仍沒有根治的方法
 - (D) 腦出血的症狀通常較腦栓塞來的嚴重
25. 關於「肺結核(Pulmonary tuberculosis)」之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 致病菌為結核分枝桿菌 (Mycobacterium tuberculosis)
 - (B) 具傳染性的肺部惡性腫瘤
 - (C) 可感染任何年齡群
 - (D) 肺外結核為併發症之一
26. 關於「慢性腎絲球腎炎(Chronic glomerulonephritis)」之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 可能會呈現持續性的尿液異常
 - (B) 會呈現不同程度的腎功能受損
 - (C) 經數年後不會惡化至末期腎臟衰竭
 - (D) 高血壓控制不當會加速其進展
27. 關於「肺栓塞(Pulmonary embolism)」之敘述，下列何者為正確？
- (A) 指肺腺泡被經由血液循環而來的栓子(Embolus)所堵塞
 - (B) 長期臥床者的發病率極低
 - (C) 藥物治療不包括抗凝血劑的使用
 - (D) 下腔靜脈濾器(Inferior vena cava filter)置入為治療方式之一
28. 關於「尿路結石(Urolithiasis)」之敘述，下列何者為錯誤？
- (A) 指尿液中的物質於膽囊內形成不易溶解的結晶沈積物
 - (B) 成份可為草酸鈣結石
 - (C) 發病高峰介於四十至六十歲
 - (D) 尿路結石復發機會高

29. 下列針對「肺膿瘍」的治療，何者為錯誤？
- (A) 抗生素治療
 - (B) 支氣管鏡協助排膿或引流
 - (C) 外科手術
 - (D) X光放射治療
30. 下列有關「乳腺炎(Mastitis)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 為乳房組織發炎性疾病
 - (B) 可分為急性、慢性乳腺炎
 - (C) 只發生於哺乳婦女
 - (D) 急性乳腺炎若治療延誤可能導致乳房膿腫
31. 下列針對「肺(Lung)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 肺臟佔腹腔大部份的空間
 - (B) 右邊肺臟有三個肺葉(Lobe)
 - (C) 肺葉可分成更小的區段(Segment)
 - (D) 肺泡為肺組織之一
32. 下列針對「良性攝護腺肥大(Benign prostatic hypertrophy)」之敘述，何者為錯誤？
- (A) 在年紀較大的男性相當常見
 - (B) 會壓逼腎盂而導致水腎
 - (C) 症狀與初期攝護腺癌可能相似
 - (D) 治療方式包括藥物或手術治療
33. 有時病理報告上可見組織病理碼，下列哪個組織病理碼「非」惡性腫瘤之組織病理碼？
- (A) ICD-0 code= 72040
 - (B) ICD-0 code= 81403
 - (C) ICD-0 code= 80706
 - (D) ICD-0 code= 82493
34. 理賠惡性腫瘤時，須注意下列幾點，何者敘述「不適當」？
- (A) 須注意文件是否齊全。
 - (B) 若放射或化學治療過，後續手術的病理報告未見腫瘤，並不是客戶沒有癌症，而是癌細胞被放射或化學治療消滅，故後續手術檢體上看不到癌細胞的樣態。
 - (C) 應因應最新世界衛生組織對腫瘤的良惡性判定，與時俱進。
 - (D) 胸腺瘤在現今標準不屬於癌症。

35. 關於心臟血管循環的解剖概念，下列敘述何者為正確？
- (A) 有分為體循環與肝循環。
 - (B) 心臟分為四區，上面為心室，下面為心房，各分為左右。
 - (C) 心房與心室中間有瓣膜，左邊的為二尖瓣。
 - (D) 心臟分層有三層，最外層為心肌，最內層為心內膜。
36. 心臟電位傳導的起始位置為？
- (A) 房竇結(SA node)
 - (B) 房室結(AV node)
 - (C) HIS 束
 - (D) 僧帽瓣
37. 關於高血壓的併發症，下列選項何者為非？
- (A) 腎衰竭
 - (B) 腦中風
 - (C) 心肌梗塞
 - (D) 肺間質肺病
38. 關於心肌梗塞，下列敘述何者為正確？
- (A) 心電圖不一定看得到 S T 波變化
 - (B) Q 波代表正在發生的心肌梗塞
 - (C) 心肌酶一定不會上升
 - (D) 胸痛一定在典型發生位置
39. 將病人腿部隱靜脈 (Saphenous vein)，相接於冠狀動脈阻塞處之遠端區與降主動脈，或是撥出病人的內乳動脈接於冠狀動脈阻塞處的下方，此術式稱之為？
- (A) 經皮穿腔冠狀動脈成型術
 - (B) 冠狀動脈血管支架置入術
 - (C) 冠狀動脈粥狀硬化物刮除術
 - (D) 冠狀動脈繞道手術
40. 下列哪個檢查可診斷出心律不整？
- (A) 胸部 X 光攝影
 - (B) 心導管檢查
 - (C) 抽血檢驗心肌酶(cardiac enzymes)
 - (D) 心電圖

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 下列何者是構成骨盆的骨骼？

- (A) 坐骨(ischium)
- (B) 恥骨(pubis)
- (C) 髌骨(ilium)
- (D) 薦骨(sacrum)

42. 足部的跗骨(tarsal bone)包含下列何者骨頭？

- (A) 距骨(talus)
- (B) 跟骨(calaneus)
- (C) 舟狀骨(navicular)
- (D) 蹠骨(metatarsal bone)

43. 下列關於高血脂症的敘述，何者為正確？

- (A) 嚴重的高三酸甘油酯血症，可能引發急性胰臟炎
- (B) 部分降血脂藥可能造成肝功能異常或肌肉病變
- (C) 過度飲酒易導致高三酸甘油酯血症
- (D) 糖尿病易導致低密度脂蛋白膽固醇(LDL)的濃度增加

44. 下列關於肝功能檢查的敘述，何者為正確？

- (A) 心肌梗塞可能造成 GOT 上升
- (B) GPT 明顯高於 GOT 時($GPT/GOT > 2$)，可能代表罹患酒精性肝病
- (C) 肝炎發作時，可能造成 α -Fetoprotein(AFP)上升
- (D) 發育中的青少年，鹼性磷酸酶(ALK-P)會上升

45. 下列針對「水腦症(Hydrocephalus)」的敘述，何者為正確？

- (A) 腦脊髓液來源自腦室壁脈絡叢的分泌。
- (B) 若延宕治療，即使手術處理，也會有相當程度的後遺症留下來。
- (C) 造成此症的原因很多，罹患年齡層也從新生兒到老人皆有。
- (D) 水腦症是可以治療的，一般以外科手術治療為主。手術後腦脊髓液引流管發生阻塞時有所見，因此定期醫療回診追蹤是必須的。

46. 下列何者為「腦出血(Cerebral Hemorrhage)」的併發症？
- (A) 肺炎
 - (B) 癲癇
 - (C) 失語症
 - (D) 憂鬱症
47. 下列針對「氣喘(Asthma)」之敘述，何者為正確？
- (A) 為不可回復性的阻塞性呼吸道疾病
 - (B) 為口咽部對多樣性的刺激產生異常過度反應
 - (C) 可出現於任何年齡
 - (D) 重積性氣喘(Status Asthmaticus)是一種氣喘危象
48. 下列針對「腎臟囊腫」之敘述，何者為正確？
- (A) 指於腎臟出現的囊腔
 - (B) 皆為良性病灶
 - (C) 最常見的腎臟囊腫病灶為單純性腎囊腫(Simple renal cysts)
 - (D) 腹腔鏡腎囊腫去頂手術為治療方式之一
49. 下列何者為心房撲動(Atrial flutter)及心房纖維性顫動(Atrial fibrillation)的可能病因？
- (A) 急或慢性酒精中毒
 - (B) 甲狀腺功能亢進所致之心肥大
 - (C) 心肌炎
 - (D) 瓣膜性心臟病, 例如二尖瓣狹窄或閉鎖不全
50. 下列針對「心肌肥厚(Myocardial hypertrophy)」的敘述，何者為正確？
- (A) 是相同的原因所造成
 - (B) 本身就是一種併發症
 - (C) 胸部 X 光片顯示心胸比(Cardiothoracic ratio)為 50%以上
 - (D) 心臟超音波檢查對確認是否有心肌肥厚是沒有幫忙的