

**中華民國人壽保險管理學會**  
**111 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題（單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分）（共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣）**

1. 以下有關紫斑症（Purpura）的敘述，何者是錯的？
  - (A) 血管異常可造成紫斑症
  - (B) 維生素 C 不足可導致的壞血病（scurvey）造成紫斑症
  - (C) 人體老化會使血管通透性增加，可能造成老人性紫斑症
  - (D) 免疫性血小板缺乏性紫斑的原因大多明確可知
  
2. 以下有關貧血的敘述，何者是錯的？
  - (A) 缺鐵性貧血有可能是因鐵吸收不足或失血造成的
  - (B) 當胃切除而導致無法分泌內在因子會導致惡性貧血（Pernicious anemia）
  - (C) 葉酸缺乏會導致小血球性貧血
  - (D) 慢性疾病（如慢性感染、慢性腎衰竭）者可導致貧血
  
3. 以下有關白血病（Leukemia）的敘述，何者是錯的？
  - (A) 白血病是造血器官之一的淋巴結異常增生所致
  - (B) 如經常接觸放射線、化學藥劑則會增加罹病的機會
  - (C) 患有自體免疫疾病者比較容易發生白血病
  - (D) 罹患白血病時，雖然白血球大量增加，但功能不良，會導致免疫功能不佳
  
4. 以下造成視障有關原因，何者是錯的？
  - (A) 青光眼會造成視神經萎縮
  - (B) 白內障會造成玻璃體混濁
  - (C) 高度近視眼可造成視網膜病變
  - (D) 甲醇可造成視神經病變
  
5. 年輕的女子如果得到視神經炎，須考慮以下何者疾病的可能性？
  - (A) 糖尿病
  - (B) 高血壓
  - (C) 肝硬化
  - (D) 多發性硬化症

6. 有關耳朵的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 負責聽力的耳蝸與負責平衡的前庭器官位於內耳
  - (B) 膽脂瘤 (Cholesteatoma) 可造成內耳炎而有聽障發生
  - (C) 罹患中耳炎時，可能因細菌進入乳突而產生乳突炎
  - (D) 造成突發性耳聾的原因是細菌感染，罹病後大多會造成永久聽障
7. 以下有關類風濕性關節炎的敘述，何者是錯的？
- (A) 是慢性進行性、發炎性的，局限於關節的疾病
  - (B) 發病年齡以中年婦女較多
  - (C) 關節炎主要病理變化是滑膜炎 (Synovitis)。嚴重者會侵犯整個關節
  - (D) 病程較長者，病況嚴重者，多關節侵犯者，預後會比較差
8. 有一女性保戶告知有貧血相關疾病未曾治療，檢查結果為 Hb:12mg/dl (正常值 12-16mg/dl)，則最有可能的診斷是？
- (A) 地中海型貧血
  - (B) 缺鐵性貧血
  - (C) 維他命 B12 缺乏性貧血
  - (D) 慢性出血性貧血
9. 血中 HbA1c 數值可反映受檢者過去多長時間的血糖狀況？
- (A) 三天
  - (B) 三周
  - (C) 三個月
  - (D) 三年
10. 下列何者不是庫欣氏症狀群 (Cushing Syndrome) 的常見症狀？
- (A) 體重減輕
  - (B) 水牛肩
  - (C) 月亮臉
  - (D) 妊娠紋
11. 下列何者不是長期酗酒者常見的血液檢查變化？
- (A) 紅血球變大 (MCV 增加)
  - (B) 尿酸上升
  - (C) 三酸甘油酯下降
  - (D) r-GT 上升

12. 下列何種賀爾蒙的主要功能是調節鈣與磷的平衡？
- (A) 泌乳激素
  - (B) 腎上腺刺激素
  - (C) 副甲狀腺激素
  - (D) 生長激素
13. 下列何項血液檢查最能真實反映C型肝炎病毒活性及傳染力？
- (A) HCV RNA
  - (B) Anti HCV
  - (C) GOT
  - (D) r-GT
14. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者為非？
- (A) 肝硬化可致白蛋白下降
  - (B) 紅血球破壞（如溶血），可致膽紅素下降
  - (C) 酒精性肝病可致 GOT/GPT>2
  - (D) 心肌梗塞亦可能造成 GOT 上升
15. 下列何者不是急性胰臟炎的常見原因？
- (A) 消化性潰瘍
  - (B) 高三酸甘油酯血症
  - (C) 膽石症
  - (D) 酒精
16. 下列何者是台灣肝癌的最主要致病病因？
- (A) 黃麴毒素
  - (B) A型肝炎
  - (C) 酗酒
  - (D) B型肝炎
17. 下列哪個不屬於「眩暈 (Vertigo)」的可能病因？
- (A) 「梅尼爾氏症」或「中樞神經病變」
  - (B) 藥物影響
  - (C) 腦性麻痺
  - (D) 「動脈循環障礙」或「前庭神經炎」

18. 關於腦膜炎 (Meningitis) 之敘述，下列何者是正確的？
- (A) 腦膜炎是中樞神經的急性感染症
  - (B) 腦膜炎的致病因以病毒感染較為常見
  - (C) 病毒性腦膜炎的復原較好，細菌性腦膜炎易造成後遺症
  - (D) 以上皆是
19. 關於「腦出血 (Cerebral Hemorrhage)」之敘述，下列何者是錯誤的？
- (A) 腦出血的急性死亡率高且日後易造成殘障
  - (B) 癲癇是腦出血最常見的既往症
  - (C) 高血壓性腦出血發生的位置多位在如大腦基底核、丘腦、腦幹、或小腦處
  - (D) 腦出血有時若要確定出真正的致病原因到底是外傷性或是自發性腦出血，確實較為困難
20. 下列有關於腦膿瘍 (Brain Abscess) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 致病菌種以葡萄球菌、鏈球菌最為常見
  - (B) 此症以外科手術治療為主，抗生素治療為輔
  - (C) 此症以往較為少見，但近年來或許因免疫系統疾病增加的關係，而有逐漸上升的趨勢
  - (D) 大部分患者皆可治癒，且不會存留神經後遺症
21. 下列有關於精神官能症 (Neurosis, Psychosomatic Disorders) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 精神官能症包含有焦慮性精神官能症、強迫性精神官能症、畏懼性精神官能症、身心症、焦慮症、恐慌性精神官能症等
  - (B) 此類病患的精神狀態會與現實脫離
  - (C) 此類患者有自覺病感，絕大多數症狀的發生是緩慢進行的，表現於各個不同的生理系統
  - (D) 治療包括藥物治療，行為治療，心理治療等
22. 下列敘述何者是正確的？
- (A) 從疼痛症狀本身，通常可以分辨出造成坐骨神經痛的特定原因
  - (B) 腦脊髓液來源自腦室壁脈絡叢的分泌
  - (C) 巴金森氏症 (Parkinsonism) 病患的小腦黑質所分泌 Dopamine 的細胞大量減少
  - (D) 腦栓塞的栓子最多的是來自骨頭斷裂釋出的脂肪栓子

23. 下列的敘述，何者錯誤？
- (A) 腦性麻痺的功能障礙基本上無法得到根治
  - (B) 頭痛一般依其發生原因來治療
  - (C) 成人後顱窩腫瘤中，以轉移性腫瘤為多
  - (D) 造成坐骨神經痛最多的原因是腫瘤壓迫
24. 下列敘述何者是正確的？
- (A) 阿爾茲海默氏症有些同時會合併如失語症 (Aphasia)，或失用症 (Apraxia)，或失認症 (Agnosia)
  - (B) 因為症狀變化不大，所以精神病的診斷變異性較小
  - (C) 血管介入治療 (如栓塞) 以及外科手術治療絕對無法根除已發現的腦動脈血管瘤
  - (D) 大部分的腦動脈血管瘤，未破裂時，都會有明顯症狀
25. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因鏈球菌感染肺部造成
  - (B) 在工業化或發達國家相對較不會影響年老者
  - (C) 一般規則性口服二種或以上藥物需持續 6 個月以上
  - (D) 目前尚未有多重抗藥性菌種的出現
26. 下列有關於「染色體顯性多囊腎疾病 (Autosomal dominant polycystic kidney disease; ADPKD)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為最常見的腎臟囊腫病灶
  - (B) 多發病於嬰幼兒期
  - (C) 囊腫不可能在其他器官出現
  - (D) 可合併有心臟血管異常
27. 下列有關核保具「肺膿瘍 (Lung Abscess)」病史者的醫學資料，何者相對上在核保考量上屬較負向的訊息？
- (A) 為既往症已痊癒
  - (B) 具口咽部功能異常
  - (C) 不併有糖尿病
  - (D) 正常的肺功能檢查報告

28. 下列各種型態的「腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis)」，何者依其大致病程的預後屬於較佳的？
- (A) 微小變化型腎病 (Minimal change disease)
  - (B) 局部節段性腎絲球硬化症 (Focal segmental glomerulosclerosis)
  - (C) 膜狀增生性腎絲球腎炎 (Membranoproliferative glomerulonephritis)
  - (D) 肺出血—腎炎綜合症 (Goodpasture's syndrome)
29. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可獲得肺容量
  - (B) 可獲得肺流量
  - (C) 不可評估通氣障礙的型態
  - (D) 可評估通氣障礙的嚴重程度
30. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 血中蛋白質異常地大量排泄於尿中
  - (B) 兒童與成人皆有可能發生
  - (C) 會引起此症候群的原因只有一種
  - (D) 血栓性栓塞症為可能併發症之一
31. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 有痰和黏液的咳為肺部惡性腫瘤所引起
  - (B) 分類有慢性非阻塞性和慢性阻塞性支氣管炎
  - (C) 長期吸菸者罹患率比未吸菸者低
  - (D) 併發症不包括肺高壓
32. 下列針對「腎功能不全 (Renal Insufficiency)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
  - (B) 慢性腎功能不全可藉由腎絲球過濾率預測值 (Estimated glomerular filtration rate; eGFR) 以評估期別或嚴重程度
  - (C) 腎臟損害併有或不併有 eGFR 的下降大於或等於三個月為慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease) 定義之一
  - (D) eGFR 小於 60 ml/min/1.73m<sup>2</sup> 大於或等於三個月併有或不併有腎臟的損害為慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease) 定義之一

33. 以下何者「不屬於」造成「低血壓」的原因之一？
- (A) 愛迪生氏病 (Addison's disease)
  - (B) 甲狀腺功能低下
  - (C) 姿勢
  - (D) 腎動脈狹窄
34. 關於「不穩定心絞痛」(unstable angina pectoris)，其特色如下列所示，何者為錯？
- (A) 無論運動或休息時都會發作
  - (B) 若安排冠狀動脈攝影檢查可發現血管有狹窄
  - (C) 心電圖一定可以看到變化
  - (D) 一次比一次發作的症狀更嚴重
35. 下列何者不屬於「複雜型先天性心臟病」？
- (A) 右心發育不全 (Right heart hypoplasia)
  - (B) 大血管轉位 (Transposition of the great vessels)
  - (C) 開放性動脈導管 (Patent ductus arteriosus)
  - (D) 法洛氏四合症 (Tetralogy of Fallot)
36. 關於心室纖維性顫動 (Ventricular Fibrillation) 之敘述，何者為非？
- (A) 每分鐘可到 350 - 450 次
  - (B) 與某種顯性染色體疾病 Jervell-Lange-Neilsen 症候群有關
  - (C) 核保時須注意潛在病因，才能整體考量其風險
  - (D) 心臟疾病可導致此種心律不整
37. 關於「意外」與「中毒」可導致的體況，下列何者為錯？
- (A) 外傷可以導致主動脈血管瘤破裂
  - (B) 中毒可以導致發紺
  - (C) 心因性休克與意外一定無關
  - (D) 電擊可以導致心律不整
38. 「冠狀動脈心臟疾病」患者日常生活須注意什麼，下列何者為非？
- (A) 情緒不能太激動
  - (B) 避免尼古丁攝取
  - (C) 冷天注意保暖
  - (D) 盡量運動與爬樓梯

39. 關於「腫瘤」(Tumor)的敘述，下列何者為「錯」？
- (A) 腫瘤不一定是惡性的，也有良性的
  - (B) 惡性腫瘤會侵犯組織與器官，也具有遠端轉移的潛力
  - (C) 所有治療皆不會帶來次發性癌症，絕對安全
  - (D) 核保時可以拿病理報告與追蹤病歷及影像報告
40. 關於「病理分期」的規則與出處，下列何者為是？
- (A) T描述腫瘤本身，在各個器官的規則一致，無變化與邏輯
  - (B) M<sub>1</sub>代表有遠端轉移，期別也較後期
  - (C) 現在依循的是AJCC 7th版
  - (D) N代表淋巴結，分級的顆數在每個器官均為統一標準

**貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 以下有關淋巴瘤(Lymphoma)的敘述，何者是對的？
- (A) 淋巴瘤有良性與惡性的區別
  - (B) 淋巴瘤大體上可分為何杰金氏症(Hodgkin's Disease)與非何杰金氏症
  - (C) 何杰金氏淋巴瘤一般預後優於非何杰金氏淋巴瘤
  - (D) 發生淋巴瘤的位置可在淋巴結或其他淋巴組織分布的地方
42. 以下有關愛滋病(AIDS)敘述，何者是對的？
- (A) 是病毒感染引起的後天免疫缺乏症候群
  - (B) 盛行於同性戀間，而染愛滋病的總數以異性戀較多
  - (C) 愛滋病剛感染時會有一段時間無法檢驗出愛滋病毒抗體，此時稱為愛滋病空窗期
  - (D) 愛滋病患者容易有伺機性感染及得到特別腫瘤，如卡波氏肉瘤(Kaposi's Sarcoma)
43. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者為糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
  - (B) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
  - (C) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖)兩小時之血糖超過 126mg/dl
  - (D) 糖化血色素(HbA1c)超過 6.5%

44. 下列何者為造成血液中 HDL（高密度脂蛋白）下降的常見原因？
- (A) 減重
  - (B) 戒菸
  - (C) 血糖控制不良
  - (D) 停經
45. 下列有關於「癲癇 (Epilepsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 癲癇發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象
  - (B) 最嚴重的發作稱為癲癇重積狀態
  - (C) 若病況控制不好，此類病患發生意外傷害、失能、猝死的機會也較高
  - (D) 鑑別診斷必須與換氣過度症、恐慌症、昏厥、暫時性腦缺血區別
46. 下列針對「水腦症 (Hydrocephalus)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦脊髓液來源自硬腦膜的分泌
  - (B) 造成此症的原因很多，罹患年齡層也從新生兒到老人皆有
  - (C) 當腦脊髓液整個流過程程中有任何不暢通，或是異常分泌過多時，就會造成腦脊髓液的不正常滯留、積聚，久而久之便會使得腦壓增高，腦室擴大，進而會造成神經功能異常的狀態，這就是水腦症
  - (D) 水腦症是可以治療的，一般以外科手術治療為主，定期醫療回診追蹤是必須的
47. 可能造成「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)的病因或危險因子有下列何者？
- (A) 下肢深部靜脈栓塞
  - (B) 心房纖維顫動
  - (C) 下肢長骨骨折
  - (D) 細菌性心內膜炎
48. 下列針對「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 慢性全身性的傳染性疾病
  - (B) 無法經由胎盤傳染給胎兒
  - (C) 晚期梅毒可造成身體主要器官的傷害
  - (D) 患者經完整抗生素治療後血清梅毒螺旋體血球凝集反應 (TPHA) 會因治療成功必定會轉呈陰性

49. 以下哪些屬於「缺血性心臟病」的危險因子？
- (A) HDL（高密度膽固醇）過高
  - (B) 男性
  - (C) 抽菸
  - (D) 家族遺傳
50. 以下哪些在病理報告中的診斷字眼屬於「原位癌」？
- (A) Ductal carcinoma in situ（乳管內上皮癌）
  - (B) Paget's Disease（柏德氏病）
  - (C) intraepithelial carcinoma（上皮內癌）
  - (D) Melanoma（黑色素瘤）