

**中華民國人壽保險管理學會**  
**111 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件(限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件)及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問(如試題印刷不清等情形)，應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 有關關節痛的敘述，以下何者是錯的？
  - (A) 韌帶、肌腱疾病都可引起關節痛
  - (B) 痛風性關節炎是因焦磷酸鈣沉積於關節中，而引起關節發炎而造成關節痛
  - (C) 細菌感染可引起關節炎而造成關節痛
  - (D) 病毒感染可造成皮膚出疹，也可造成關節發炎疼痛
  
2. 有關惡性貧血(pernicious anemia)的敘述，以下何者是錯的？
  - (A) 惡性貧血在臨床上表現的貧血型態，以大血球性的貧血為主
  - (B) 當胃無法分泌內在因子時，常會引起惡性貧血
  - (C) 惡性貧血常見於大腸完全切除者
  - (D) 人體無法吸收維生素 B12 時，常會引起惡性貧血
  
3. 有關溶血性貧血的敘述，以下何者是錯的？
  - (A) 缺鐵性貧血是溶血性貧血最常見的原因
  - (B) 因先天性疾病而導致紅血球結構異常，可造成溶血性貧血，常會伴隨膽紅素增高及脾腫大等症狀
  - (C) 海洋性貧血(地中海型貧血)(thalassemia)是溶血性貧血原因之一
  - (D) 自體免疫性疾病也會有溶血性貧血現象發生
  
4. 有關類風溼性關節炎的敘述，以下何者是錯的？
  - (A) 類風溼性關節炎是一種慢性、進行性、發炎性的疾病
  - (B) 類風溼性關節炎是侷限於關節病變的疾病
  - (C) 遺傳因子與環境因子相互作用，可以引起類風溼性關節炎的發生
  - (D) 類風溼性關節炎在關節上主要病理變化是滑膜炎(synovitis)
  
5. 有關角膜炎的敘述，以下何者是錯的？
  - (A) 嚴重的角膜炎會引起角膜潰瘍
  - (B) 角膜炎都是因為外傷感染造成的，與全身疾病無關
  - (C) 罹患角膜炎時，會有畏光、流淚、視力降低的現象
  - (D) 角膜嚴重缺損破壞時，角膜移植是治療方法之一

6. 有關青光眼的敘述，以下何者是對的？
- (A) 測量眼壓如果正常，就不會有青光眼發生
  - (B) 青光眼是因眼球內壓力太低而造成視神經水腫，然後引起視野缺損
  - (C) 高度近視眼雖會造成視力不佳，但與青光眼無關
  - (D) 隅角開放型青光眼常以慢性型態表現，不容易早期發現
7. 有關中耳炎的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 中耳炎是指中耳黏膜發炎，可能會造成耳痛、聽力降低
  - (B) 耳咽管是中耳炎最常見的感染途徑
  - (C) 中耳炎會造成中耳積水，而引起梅尼爾氏症(Meniere' s disease)
  - (D) 中耳炎嚴重時會導致鼓膜(耳膜)破裂聽力降低
8. 有關鼻竇的敘述以下何者是錯的？
- (A) 額竇、篩竇、上額竇、蝶竇都是鼻竇的結構之一
  - (B) 鼻竇發炎最常見的位置是額竇
  - (C) 造成鼻竇炎最常見的原因是上呼吸道感染
  - (D) 腺體肥大、鼻中膈彎曲、鼻息肉都是鼻竇炎的危險因子
9. 下列何者是格雷夫氏病(Graves' Disease)的主要內分泌異常表現？
- (A) 甲狀腺功能低下
  - (B) 甲狀腺功能亢進
  - (C) 副甲狀腺功能低下
  - (D) 副甲狀腺功能亢進
10. 下列有關於肝功能檢查的描述，何者正確？
- (A) 肝炎急性期發作，多會使 $\alpha$ -胎兒蛋白(AFP)下降
  - (B) 肝硬化患者白蛋白(Albumin)多會上升
  - (C) 發育中的兒童，鹼性磷酸酶(ALK-P)多會下降
  - (D) 大量飲酒後，r-GT 即可能顯著上升
11. 驗血出現下列何種血清標記，可代表 B 型肝炎病毒仍在體內複製？
- (A) AntiHBs
  - (B) AntiHBe
  - (C) HBeAg
  - (D) AntiHBcIgG

12. 下列何者是造成巨人症(Gigantism)的主要病因？
- (A) 青春期前，生長激素(GH)分泌過多
  - (B) 青春期前，生長激素(GH)分泌過少
  - (C) 青春期後，生長激素(GH)分泌過多
  - (D) 青春期後，生長激素(GH)分泌過少
13. 下列何者不是肝硬化的常見病因？
- (A) 酗酒
  - (B) B型肝炎
  - (C) A型肝炎
  - (D) C型肝炎
14. 下列關於「第2型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 較第1型糖尿病常見
  - (B) 主要發生在小孩子及年輕人
  - (C) 肥胖為病因之一
  - (D) 主要用口服降血糖藥治療
15. 何者不是甲狀腺功能亢進的常見症狀？
- (A) 怕冷
  - (B) 體重減輕
  - (C) 心跳變快
  - (D) 腹瀉
16. 下列何者不是急性胰臟炎的常見致病原因？
- (A) 高三酸甘油脂血症
  - (B) 酒精
  - (C) 膽石症
  - (D) 消化性潰瘍
17. 下列關於「氣喘(Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為不可回復性的侷限性呼吸道疾病
  - (B) 為上呼吸道對多樣性的刺激產生異常過度反應
  - (C) 尖峰呼氣流速值(Peak expiratory flow)可用於氣喘診斷
  - (D) 藥物治療只可使用於緩解氣喘急性發作

18. 下列關於「染色體隱性多囊腎疾病(Autosomal recessive polycystic kidney disease; ARPKD)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 皆發病於四十歲以上
  - (B) 為遺傳性囊腫腎臟疾病中最常見的一種
  - (C) 可伴隨膽道先天性發育不全
  - (D) 其腎功能不良為非持續性惡化
19. 下列關於「肺結核(Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因鏈球菌感染肺部而導致具傳染性的肉芽腫性疾病
  - (B) 只會感染兒童
  - (C) 胸部 X 光攝影檢查報告呈現肺部「空洞性病變」屬輕度異常
  - (D) 「粟粒型結核」或稱「血行播散型結核」
20. 下列關於「快速進行性腎絲球腎炎(Rapidly progressive glomerulonephritis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 特徵為要經數年後才可能會惡化至末期腎臟衰竭
  - (B) 預後極佳
  - (C) 罹病者不會進展至需透析治療
  - (D) 腎臟切片檢查可發現腎絲球呈現所謂新月體(Crescent)的組織學病變
21. 下列針對「慢性支氣管炎(Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 診斷時無需排除其他明確原因引起的咳嗽
  - (B) 可分類慢性非阻塞性支氣管炎和慢性阻塞性支氣管炎
  - (C) 吸菸為最不常見的危險因子
  - (D) 患者肺功能檢查結果全為「侷限性通氣障礙」
22. 下列針對「腎功能不全 (Renal insufficiency) 或腎臟疾病 (Kidney disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腎功能不全專指腎臟功能慢性受損惡化
  - (B) 若病因可適時治癒排除，腎功能不全仍不可以復原
  - (C) 藉由腎絲球過濾率預測值(Estimated glomerular filtration rate; eGFR) 可評估慢性腎臟疾病的期別
  - (D) 判斷是否符合第一、二期慢性腎臟疾病者僅需考慮腎絲球過濾率預測值即可

23. 下列針對「塵肺症(Pneumoconiosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因長期吸入有機或無機粉塵造成
  - (B) 可能導致肺部發炎纖維化
  - (C) 通常與職業環境暴露有關
  - (D) 預後和吸入物的種類與暴露時間無關
24. 下列針對「腎病症候群(Nephrotic syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不會導致蛋白尿
  - (B) 血中蛋白質會增加即高白蛋白血症
  - (C) 臨床表徵會有周邊水腫
  - (D) 血中脂肪會減少即低脂血症
25. 以下關於巴金森氏病(Parkinson's disease)的症狀，何者敘述有誤？
- (A) 僵直，出現面具臉(mask face)
  - (B) 自主神經症狀，例如姿勢性低血壓與頻尿，部分病人出現失智症
  - (C) 運動不能(akinesia)或運動遲緩(bradykinesia)，步伐會特別大
  - (D) 最早出現的是靜止性震顫(resting tremor)
26. 關於阿茲海默氏病(Alzheimer's Disease)相關敘述，何者有誤？
- (A) 症狀有失語症、失用症、失認症
  - (B) 長期記憶在疾病晚期也不受影響
  - (C) 診斷中可能會藉由影像檢查輔助，以排除腦腫瘤、外傷、感染等病
  - (D) 若能早期診斷較可維持良好狀況，有藥物可治療
27. 下列有關於腦膿瘍(Brain Abscess)的敘述，何者錯誤？
- (A) 致病菌種以葡萄球菌、鏈球菌最為常見
  - (B) 此症以外科手術治療為主，抗生素治療為輔
  - (C) 此症以往較為少見，但近年來或許因免疫系統疾病增加的關係，而有逐漸上升的趨勢
  - (D) 大部分患者皆可治癒，且不會存留神經後遺症
28. 下列關於「腦炎」(encephalitis)，何者為正確敘述？
- (A) 感染病因以病毒較多
  - (B) 症狀可能以多種呈現，例如：頭痛、昏睡、痙攣，但不包含行為異常
  - (C) 併發症不包含癲癇
  - (D) 預後很好，沒有智能或身心障礙的後遺症

29. 下列選項，哪個不屬於「腦血管意外」(cerebrovascular accident)的類型？
- (A) 腦出血
  - (B) 水腦症
  - (C) 腦栓塞
  - (D) 腦梗塞
30. 下列選項，何者不屬於「坐骨神經痛」(Sciatica)的併發症？
- (A) 下肢麻木
  - (B) 下肢無力
  - (C) 大小便控制問題
  - (D) 單邊下肢水腫
31. 關於「酒精藥物濫用成癮」與「精神官能症」的預後，何者敘述為錯？
- (A) 精神官能症合併酒精藥物濫用，預後不佳
  - (B) 精神官能症比較輕微，不會造成失能
  - (C) 酒精與藥物濫用成癮，易復發
  - (D) 酒精與藥物濫用成癮，易有意外事故、身體多器官病變
32. 下列關於「精神病」與「智能障礙」的敘述，何者為非？
- (A) 精神病不易有病識感
  - (B) 精神病因為症狀常會變化，所以診斷的變異性較大
  - (C) 智能障礙合併精神問題，預後較差
  - (D) 智能障礙的成因只有先天因素，例如染色體異常
33. 以下哪個不是「惡性腫瘤」的外來致癌因子？
- (A) E G F R(表皮生長因子接受器)過度表現
  - (B) 紫外線
  - (C) 染劑
  - (D) H B V(B型肝炎病毒)
34. 關於可在「病理報告」中看到的「巨觀描述」，不包括下列哪個選項？
- (A) 腫瘤距離邊緣幾公分
  - (B) 腫瘤切下來是完整或是碎片的
  - (C) 細胞的分級
  - (D) 有沒有拿淋巴結

35. 關於 c T N M 與 p T N M 的病理分期的敘述，下列何者錯誤？
- (A) c T N M 指的是臨床分期
  - (B) p T N M 指的是病理分期
  - (C) 兩個不一定相同
  - (D) p T N M 是在手術移除腫瘤前所判斷的期別
36. 下列於癌症分期的 T N M 系統，何者錯誤？
- (A) M 指的是淋巴轉移
  - (B) 有的器官的 T 會以腫瘤大小決定
  - (C) 有的器官的 T 會以腫瘤侵犯的深度決定
  - (D) 甲狀腺的未分化癌(anaplastic carcinoma)預後很差，一律是第四期的
37. 關於「心房顫動」(atrial fibrillation)，下列敘述何者正確？
- (A) 併發症不包含腦中風
  - (B) 一定有症狀
  - (C) 甲狀腺亢進是其中的一個可能病因
  - (D) 只有藥物可治療，電擊無法
38. 關於高血壓(hypertension)的併發症，何者錯誤？
- (A) 視網膜病變
  - (B) 末梢血管硬化
  - (C) 心內膜炎
  - (D) 腎衰竭
39. 下列選項，何者不屬於「先天性心臟病」的單純型？
- (A) 大血管轉位
  - (B) 心房中膈缺損
  - (C) 心室中膈缺損
  - (D) 肺動脈瓣狹窄
40. 關於「心衰竭」(heart failure)，何者敘述是錯誤的？
- (A) 有分為左心衰竭與右心衰竭
  - (B) 強心劑是其中的一種治療藥物
  - (C) 心肺症(cor pulmonale)是左心衰竭的成因
  - (D) 胸部 X 光可以見到心臟擴大與肺水腫

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者疾病嚴重時，可造成身體有容易出血傾向？
- (A) 脾臟功能亢進
  - (B) 尿毒症
  - (C) 肝病
  - (D) 骨髓功能衰竭
42. 有關白血病的敘述，以下何者是對的？
- (A) 白血病俗稱血癌，是很嚴重的血液疾病
  - (B) 白血病是因為人體的造血器官—脾臟產生癌化病變引起的
  - (C) 白血病發病時，白血球、紅血球、血小板都會受到影響
  - (D) 罹患自體免疫疾病的人，比較容易得到白血病
43. 下列關於肝炎的描述，何者為非？
- (A) 垂直傳染為台灣 C 型肝炎的主要傳染途徑
  - (B) 台灣的肝癌，一半以上皆由 C 型肝炎引起
  - (C) 慢性 B 型肝炎可以注射干擾素或口服抗病毒藥物治療
  - (D) 台灣 30 歲以下的年輕人大多感染過 B 型肝炎
44. 依美國糖尿病協會 2010 年的建議標準，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯後血糖超過 126mg/dl
  - (B) 小便出現尿糖
  - (C) 糖化血色素超過 5.6%
  - (D) 葡萄糖耐力試驗兩小時之血糖超過 200mg/dl
45. 下列針對「肺栓塞(Pulmonary embolism)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指肺腺泡被經由血液循環而來的栓子(Embolus)所堵塞
  - (B) 於患有近端深部靜脈栓塞的住院病人的發病率極低
  - (C) 服用口服避孕藥丸者有可能是肺栓塞的危險因子
  - (D) 預後非取決於病因、再發次數

46. 下列針對後天性梅毒(Syphilis)的核保考量，何者是錯誤的敘述？
- (A) 無需評估診斷時的期別
  - (B) 治療是否完整成功可參酌快速血漿反應素試驗(RPR)或性病研究實驗室試驗( VDRL)
  - (C) 需評估身體心理狀態是否存留異常或失能
  - (D) 無需評估是否合併其他性接觸傳染病
47. 以下選項哪些屬於「老年憂鬱症」的症狀？
- (A) 對任何事都提不起勁，持續兩週以上
  - (B) 常抱怨身體許多部位不舒服，如全身疼痛、失眠、頭暈
  - (C) 記憶力變差
  - (D) 情緒低落，活動力遲緩
48. 以下選項哪些不屬於「頭部創傷」裡的「續發性頭部創傷」？
- (A) 腦腫脹(brain edema)
  - (B) 顱底骨折
  - (C) 腦震盪(concussion)
  - (D) 腦挫傷(contusion)
49. 以下選項哪些屬於「心肌梗塞」或「心肌缺血」會看到的心電圖變化？
- (A) 病理性 Q 波
  - (B) ST 節段上升
  - (C) ST 節段下降
  - (D) QT 波段延長
50. 關於主動脈血管瘤(aortic aneurysm)的預後，哪些敘述是對的？
- (A) B 型主動脈剝離比 A 型的好
  - (B) 大的比小的好
  - (C) 沒有壓迫到鄰近血管的好
  - (D) 沒有產生血栓的比較好