

**中華民國人壽保險管理學會**  
**112 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 以下有關背痛的敘述，何者是錯的？
  - (A) 神經系統或內臟病變也會引起背痛
  - (B) 背痛最常見的原因是肌肉拉傷或過度使用
  - (C) 罹患強(僵)直性脊椎炎的人，只會在脊椎發作關節炎，而有背痛的現象
  - (D) 脊椎裂、脊椎分解都是常見的脊椎先天畸形，也會引起背痛
  
2. 以下有關出血(Hemorrhage)的敘述，何者是錯的？
  - (A) 皮膚或黏膜有瘀血、紫斑、血腫都是屬於一種出血的現象
  - (B) 造成出血的原因主要是血小板、凝血因子及紅血球三大要素產生病變
  - (C) 攝取維他命 C 不足，可發生壞血病(Scurvey)而容易出血
  - (D) 老化可使毛細血管的通透性增加而產生老年性紫斑症
  
3. 以下有關貧血的敘述，何者是對的？
  - (A) 只有血紅素異常低時才稱為貧血
  - (B) 貧血最常見原因是缺乏維他命
  - (C) 慢性腎衰竭可以引起慢性貧血
  - (D) 慢性貧血者常在血紅素稍微異常時，就會有皮膚蒼白、心悸、暈眩、疲勞等症狀
  
4. 以下有關地中海型貧血(Thalassemia)的敘述，何者是對的？
  - (A) 地中海型貧血又稱海洋性貧血，是因為住海邊的人發生率最高
  - (B) 地中海型貧血是常見的性染色體遺傳的疾病
  - (C) 地中海型貧血可因基因缺失、變異輕重情況而表現出不同程度的貧血
  - (D) 地中海型貧血臨床表現與惡性貧血很像，診斷困難
  
5. 以下有關耳鳴的敘述，何者是錯的？
  - (A) 外耳、中耳、內耳的疾病都可能造成耳鳴
  - (B) 腦部疾病可造成耳鳴
  - (C) 長期耳鳴如不治療就會變成耳聾
  - (D) 大部分的耳鳴是自覺性的症狀，周遭的人沒有相同耳鳴感覺

6. 以下有關退化性關節炎的敘述，何者是對的？
- (A) 退化性關節炎又稱骨關節炎，是最常見的急性關節疾病
  - (B) 退化性關節炎最常見於年輕人
  - (C) 一般最常見的退化性關節炎發生於手腕與腳踝
  - (D) 頸椎、腰椎，都有發生退化性關節炎的可能性
7. 以下有關何杰金氏症 (Hodgkin's Disease) 的敘述，何者是錯的？
- (A) 是一種淋巴瘤，是淋巴細胞發生癌化病變
  - (B) 脾臟、腸胃道等器官無淋巴結，不會產生淋巴瘤
  - (C) 免疫疾病是罹患何杰金氏症的危險因子
  - (D) 何杰金氏症發生初期常會出現無痛性淋巴腫大
8. 有關血友病 (Hemophilia) 的敘述，以下何者是對的？
- (A) 血友病是一種可以治療的癌症
  - (B) 血友病是後天性凝血因子缺乏所導致
  - (C) 血友病發生以女性為主
  - (D) 血友病主要有 A、B 兩型，分別是第八、第九凝血因子缺乏
9. 泌乳激素 (Prolactin) 主要由何種內分泌腺體分泌？
- (A) 腦下垂體
  - (B) 腎上腺
  - (C) 卵巢
  - (D) 胰臟
10. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，糖化血色素 (HbA1c) 數值為診斷糖尿病的標準之一，此診斷標準係指糖化血色素 (HbA1c) 數值需大於多少？
- (A) >5.5%
  - (B) >6.0%
  - (C) >6.5%
  - (D) >7.0%
11. 幼年期甲狀腺功能低下若未治療，易導致下列何種疾病？
- (A) 葛瑞夫氏病 (Graves' disease)
  - (B) 呆小症 (Cretinism)
  - (C) 甲狀腺風暴
  - (D) 巴塞多氏病 (Basedow's disease)

12. 下列何者是造成肢端肥大症的主要原因？
- (A) 青春期前生長激素 (GH) 分泌過少
  - (B) 青春期前生長激素 (GH) 分泌過多
  - (C) 青春期後生長激素 (GH) 分泌過少
  - (D) 青春期後生長激素 (GH) 分泌過多
13. 下列關於 C 型肝炎的描述，何者正確？
- (A) 感染 C 型肝炎後，大多不會發展成慢性肝炎
  - (B) C 型肝炎新型抗病毒藥物，療效可達 9 成以上
  - (C) 感染 C 型肝炎後，大多會引起急性猛爆性肝炎發作
  - (D) C 型肝炎可以預防注射來預防感染
14. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 主要以口服降血糖藥物治療
  - (B) 佔台灣糖尿病病人總數少於 10%
  - (C) 大多發生在小孩或年輕人
  - (D) 主因胰臟無法製造胰島素而致病
15. 心房顫動 (Atrial fibrillation)，較常見於下列何種內分泌異常？
- (A) 副甲狀腺功能低下
  - (B) 副甲狀腺功能亢進
  - (C) 甲狀腺功能低下
  - (D) 甲狀腺功能亢進
16. 下列關於血脂肪 Friedewald 公式，何者正確？
- 【總膽固醇(TC), 三酸甘油酯(TG), 高密度脂蛋白(HDL-C), 低密度脂蛋白(LDL-C)】
- (A)  $LDL-C = TC - HDL-C - TG/5$
  - (B)  $LDL-C = TC - HDL-C - TG/3$
  - (C)  $LDL-C = TC - HDL-C + TG/5$
  - (D)  $LDL-C = TC - HDL-C + TG/3$
17. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為「非結核分枝桿菌 (Non-tuberculous mycobacteria)」感染肺部
  - (B) 為非傳染性的肉芽腫性疾病
  - (C) 粟粒型結核為併發症之一
  - (D) 潛隱性結核病指有症狀、有感染性的結核病

18. 下列有關於「體染色體隱性多囊腎疾病 (Autosomal recessive polycystic kidney disease; ARPKD)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為最常見的腎臟囊腫病灶
  - (B) 通常發病於四十歲左右
  - (C) 也稱為「多囊性腎發育不良 (Multicystic dysplastic kidney)」
  - (D) 可伴隨膽道先天性發育不全及肝臟纖維化
19. 下列有關於「肺功能檢查」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可評估通氣障礙的嚴重程度
  - (B) 阻塞型通氣障礙可用一秒鐘用力吐氣量與用力性肺活量比值做確認
  - (C) 侷限性通氣障礙可用肺總量做確認
  - (D) 通氣障礙的型態只分阻塞型和侷限性通氣障礙
20. 下列有關於「微小變化型腎病 (Minimal change disease)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 好發於兒童
  - (B) 有些病例甚至可自癒
  - (C) 預後大致相同於「原發性局部節段性腎絲球硬化症」
  - (D) 其蛋白尿可對類固醇治療有反應
21. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 支氣管會呈現不可回復的不正常擴張
  - (B) 易導致肺炎反覆發生
  - (C) 所有年齡都有可能罹患
  - (D) 「自體免疫性疾病」非病因之一
22. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic syndrome)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可因腎臟的腎絲球過濾機制受損而發生
  - (B) 可導致「高白蛋白血症」
  - (C) 治療可使用類固醇或免疫抑制劑
  - (D) 急性腎臟衰竭為可能併發症之一
23. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指肺血管被經由血液循環而來的栓子 (Embolus) 所堵塞
  - (B) 「心房纖維顫動」不會形成造成肺栓塞的血栓栓子
  - (C) 「細菌性心內膜炎」有可能形成造成肺栓塞的敗血性栓子
  - (D) 「下肢長骨骨折」有可能形成造成肺栓塞的脂肪栓子

24. 下列針對 2002 年美國國家腎臟基金會 (National kidney foundation)，對「慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease)」所下的定義的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 腎臟損害 (指腎臟的結構或功能異常) 併有腎絲球過濾率的下降大於或等於三個月
  - (B) 腎臟損害 (指腎臟的結構或功能異常) 不併有腎絲球過濾率的下降大於或等於三個月
  - (C) 腎絲球過濾率小於  $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$  大於或等於三個月不併有腎臟的損害
  - (D) 腎絲球過濾率大於  $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$  大於或等於三個月不併有腎臟的損害
25. 下列比較「酒癮」跟「藥癮」的相關敘述，何者為「是」？
- (A) 兩者均不會產生戒斷症狀
  - (B) 兩者有可能合併
  - (C) 精神障礙的患者，不易合併酒癮或藥癮
  - (D) 酒癮會產生身體多器官的病變，藥癮不會
26. 下列何者「不」屬於「精神官能症」？
- (A) 強迫症
  - (B) 恐慌症
  - (C) 思覺失調症
  - (D) 焦慮症
27. 下列關於「腦梗塞」的敘述，何者為「非」？
- (A) 起因為異常的栓子順著血液循環至腦部血管，將腦血管堵塞
  - (B) 此症漸漸有年輕化的趨勢
  - (C) 狹窄的腦動脈血管，再加上一些可能的誘發因素，如：突發性低血壓、嚴重高血糖、身體脫水、感染發燒
  - (D) 發病一年內再度發生的腦梗塞，症狀多數會較前一次更為嚴重
28. 下列關於「腦栓塞」的敘述，何者為「是」？
- (A) 空氣栓子可能導致
  - (B) 骨折絕對不會導致
  - (C) 臨床症狀與堵塞血管的相關位置無關
  - (D) 患者在發作初期均無法使用血栓溶解治療

29. 下列關於「腦瘤」的選項中，何者為「非」？
- (A) 聽神經瘤屬良性瘤
  - (B) 多形性神經膠質瘤屬良性瘤
  - (C) 肺部乳房轉移至腦部的轉移性腦瘤屬惡性瘤
  - (D) 腦下腺垂體腫瘤屬良性瘤
30. 下列有關「水腦症」的敘述，何者為「是」？
- (A) 有可能找不到特定致病原因
  - (B) 與失智症或巴金氏症容易在症狀上區分
  - (C) 腦部影像檢查是不必要的
  - (D) 幼兒發生的水腦症為核保考量的有利因素
31. 下列關於「三叉神經痛」的敘述，何者為「是」？
- (A) 好發於 50、60 多歲的女性
  - (B) 通常雙側發作
  - (C) 嚴重時不會引起病人顏面抽搐、眨眼及扭曲
  - (D) 疱疹病毒感染不會引發
32. 下列關於「顏面神經麻痺」的敘述，何者為「是」？
- (A) 好發在 20~40 歲的男性
  - (B) 貝爾氏麻痺是一種中樞神經麻痺
  - (C) 大部分病人在發病前沒有類似感冒症狀
  - (D) 大部分患者不能痊癒，會有後遺症
33. 關於主動脈血管瘤 (aortic aneurysm) 的預後，哪個敘述是「錯」的？
- (A) B 型主動脈剝離比 A 型的好
  - (B) 大的比小的好
  - (C) 沒有壓迫到鄰近血管的好
  - (D) 沒有產生血栓的比較好
34. 關於高血壓 (hypertension) 的併發症，何者錯誤？
- (A) 視網膜病變
  - (B) 末梢血管硬化
  - (C) 心內膜炎
  - (D) 腎衰竭

35. 關於「心房顫動」(atrial fibrillation)，下列敘述何者正確？
- (A) 併發症不包含腦中風
  - (B) 一定有症狀
  - (C) 甲狀腺亢進是其中的一個可能病因
  - (D) 只有藥物可治療，電擊無法
36. 下列何種心律不整，影響預後較小？
- (A) 心室纖維顫動
  - (B) 第一度房室阻斷
  - (C) 病竇症候群
  - (D) 第三度房室阻斷
37. 下列疾病何者「不會」引起「心因性休克」？
- (A) 脊髓損傷
  - (B) 急性心肌梗塞
  - (C) 心臟衰竭
  - (D) 心包填塞
38. 下列哪個引起胸痛的疾病，是屬於「心臟血管」分類？
- (A) 焦慮症
  - (B) 胃酸逆流
  - (C) 胸膜炎
  - (D) 心肌炎
39. 下列何選項，「不」屬於「動脈硬化」在「四肢動脈」產生的症狀？
- (A) 四肢末端疼痛
  - (B) 蒼白
  - (C) 脈搏微弱
  - (D) 發熱
40. 下列選項，何者不屬於「心肌梗塞」或「心肌缺血」會看到的心電圖變化？
- (A) S T節段上升
  - (B) S T節段下降
  - (C) Q T波段延長
  - (D) 病理性Q波

**貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 以下有關眼睛的疾病的敘述，何者是對的？
- (A) 青光眼會導致視神經萎縮而造成失明
  - (B) 白內障是因為水晶體混濁而造成視障
  - (C) 早產兒最常見的眼睛病變是視網膜病變
  - (D) 多發性硬化症常與視神經病變有相關性
42. 以下有關愛滋病 (AIDS) 的敘述，何者是對的？
- (A) 愛滋病是感染細菌引起的疾病
  - (B) 愛滋病可透過損傷的皮膚，體液的接觸而感染
  - (C) 愛滋病初期可能會有感冒症狀，進入潛伏期後可能 5-10 年才發病
  - (D) 愛滋病發病後可能得到伺機性的感染如肺囊蟲病、弓漿蟲病、巨噬細胞感染等
43. 下列關於胰臟炎的敘述，何者為「非」？
- (A) 腹痛是胰臟炎的常見症狀
  - (B) 急性胰臟炎發作時血中脂肪酶 (Lipase) 指數多會下降
  - (C) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
  - (D) 高尿酸是造成急性胰臟炎的最主要原因
44. 下列關於膽結石的描述，何者為「非」？
- (A) 典型症狀為左上腹痛
  - (B) 無症狀的膽結石，皆應接受預防性膽囊切除術
  - (C) 膽囊炎大多與膽結石有相關
  - (D) 大多數的膽結石不會產生症狀
45. 下列針對「氣喘 (Asthma)」治療的敘述，何者是錯誤？
- (A) 去除激起氣喘的因素非治療氣喘的方法
  - (B) 藥物治療只可用於緩解氣喘急性發作
  - (C) 乙二型交感神經興奮劑 ( $\beta 2$ -adrenergic agonists) 為支氣管擴張劑
  - (D) 吸入型類固醇製劑 (Glucocorticoids) 為抗發炎藥物

46. 下列何者是「尿路結石 (Urolithiasis)」形成的原因？
- (A) 腎小管酸中毒 (Renal tubular acidosis)
  - (B) 高尿酸血症 (Hyperuricemia)
  - (C) 原發性副甲狀腺功能亢進症 (Primary hyperparathyroidism)
  - (D) 潰瘍性大腸炎 (Ulcerative colitis)
47. 下列關於智能障礙的敘述，哪些是正確的？
- (A) 可獨立行動生活者，為核保考量的有利因素
  - (B) 無合併嚴重內科或精神疾病，為核保考量的有利因素
  - (C) 此障礙會導致學習發展的遲滯，及在日常生活的適應上、溝通上出現困難
  - (D) 此疾病對於死亡率與罹病率，也有較大的影響
48. 下列哪些病因，是會造成癲癇的後天因素？
- (A) 腦炎
  - (B) 腦血管疾患
  - (C) 腦外傷
  - (D) 腦瘤
49. 下列哪些為細胞學檢查常見的組織來源？
- (A) 子宮頸抹片
  - (B) 甲狀腺抽吸
  - (C) 肋膜積液
  - (D) 腹水
50. 下列哪些為癌症的核保考量？
- (A) 不同部位的癌症預後不同
  - (B) 不同分期的癌症預後不同
  - (C) 不同型態的癌症預後不同
  - (D) 導致癌症的生活習慣是否已造成其他體況