

中華民國人壽保險管理學會
112 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症 (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency ,G6PD 缺乏症) 的敘述，何者是錯的？
 - (A) 是台灣新生兒篩檢項目之一
 - (B) 又稱蠶豆症，是性聯遺傳疾病
 - (C) 在台灣以客家人較常見，男性比女性發生率高
 - (D) 是指白血球接觸到特別物質而產生異常血球異常破壞的疾病
2. 以下有關哮吼症 (Croup) 的敘述，何者是錯誤？
 - (A) 哮吼症與氣喘是同一種疾病
 - (B) 是急性咽喉發炎引起上呼吸道阻塞的疾病
 - (C) 常因病毒感染引起
 - (D) 主要是侵犯嬰幼兒
3. 以下有關僵直性脊椎炎的敘述，何者是對的？
 - (A) 是一種感染性的疾病，主要病灶在脊椎
 - (B) 好發於年紀大的女性
 - (C) 發病之初，主要病灶在薦骨腸骨關節出現發炎症狀 (薦腸關節炎)
 - (D) 常合併手指關節炎導致工作困難
4. 以下何者疾病常會出現全血球 (紅血球、白血球、血小板) 減少的現象？
 - (A) 白血病
 - (B) 再生性不良性貧血
 - (C) 全身性紅斑性狼瘡
 - (D) 以上皆是
5. 以下有關貧血的敘述，何者是錯的？
 - (A) 缺鐵是最常見的貧血原因
 - (B) 溶血性貧血最常因為出血太多引起
 - (C) 惡性貧血 (pernicious anemia) 主要因為缺乏內在因子引起，可見於胃切除患者
 - (D) 再生不良性貧血 (aplastic anemia) 是因骨髓疾病引起造血功能不良的疾病

6. 以下有關骨質疏鬆症的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 骨質疏鬆症是因骨骼中的磷大量流失造成的
 - (B) 中老年人可能因小腸吸收功能不佳，抑制鈣素濃度減少，而造成骨疏鬆症
 - (C) 女性停經後，因雌性素分泌減少，較容易骨質疏鬆
 - (D) 因骨質疏鬆而造成的骨折，最常發生於脊椎，手腕和髖部
7. 以下有關退化性關節炎的敘述，何者是對的？
- (A) 退化性關節炎是最常見的關節炎，最常見於年輕人
 - (B) 退化性關節炎最常見於膝關節與髖關節
 - (C) 退化性關節炎主要的形成原因是尿酸沉積於關節造成慢性發炎
 - (D) 避免退化性關節炎最好的方法是長期過度負重以增加關節耐力
8. 以下有關懷孕中異常狀況的敘述，何者是錯的？
- (A) 造成流產、死胎的原因和母親與胎兒的健康狀況都有相關
 - (B) 子宮外孕僅指受精卵在子宮頸的懷孕
 - (C) 子癲前症三大症狀是指懷孕中有蛋白尿、水腫、高血壓
 - (D) 造成流產與早產的致病原因大多相同
9. 下列何者是血液檢驗 HBeAg 陽性所代表的臨床意義？
- (A) 對 B 型肝炎已有免疫力
 - (B) 未曾感染 B 型肝炎
 - (C) 體內 B 型肝炎病毒仍在複製
 - (D) B 型肝炎感染後已痊癒
10. 下列關於肝膿瘍的描述，何者是正確的？
- (A) 左上腹痛是肝膿瘍的常見症狀
 - (B) 台灣臨床所見的肝膿瘍大多由阿米巴原蟲引起
 - (C) 肝膿瘍的病人驗血鹼性磷酸酶 (ALP) 大多下降
 - (D) 免疫力低下的人較易發生肝膿瘍
11. 下列何者不是胃食道逆流的常見原因？
- (A) 體重過輕
 - (B) 過量飲酒
 - (C) 抽菸
 - (D) 懷孕

12. 下列關於糖尿病酮酸中毒(Diabetic ketoacidosis, DKA)的描述,何者是錯誤的?
- (A) 多發生於血糖 300~800 mg/dl 間
 - (B) 體內胰島素極度缺乏時易發生
 - (C) 是一種糖尿病的慢性合併症
 - (D) 好發於第一型糖尿病病人
13. 下列何項血液檢驗結果在正常的情況下,兒童會較成年人高?
- (A) 血糖
 - (B) 鹼性磷酸酶 (ALK-P)
 - (C) 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL)
 - (D) 尿酸
14. 下列關於 C 型肝炎的描述,何者是正確的?
- (A) C 型肝炎感染可能導致肝硬化
 - (B) 感染 C 型肝炎後大多可自然痊癒
 - (C) C 型肝炎主要經口感染
 - (D) 台灣的 C 型肝炎大多於嬰幼兒時期感染
15. 下列關於胰臟炎的敘述,何者是錯誤的?
- (A) 腹痛是急性胰臟炎的常見症狀
 - (B) 慢性胰臟炎可能導致消化失調
 - (C) 高尿酸症是台灣急性胰臟炎的最常見原因
 - (D) 急性胰臟炎發作時血清脂肪酶 (Lipase) 數值會上升
16. 下列關於血脂異常的描述,何者是正確的?
- (A) 肥胖者高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) 易下降
 - (B) 腎病症候群患者低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) 易下降
 - (C) 過度飲酒者三酸甘油酯 (TG) 易下降
 - (D) 糖尿病患者三酸甘油酯 (TG) 易下降
17. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述,何者是正確的?
- (A) 因「非結核分枝桿菌 (Nontuberculous mycobacteria)」感染肺部
 - (B) 致病菌多重抗藥性的出現使結核病的防治益形簡單
 - (C) 胸部 X 光攝影檢查報告呈現空洞性病變為些微異常
 - (D) 粟粒型結核或稱血行播散型結核為併發症之一

18. 下列有關於「鹿角結石 (Staghorn calculi)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指結石佈滿腎臟的腎盞腎盂部份
 - (B) 成因與尿道重覆感染有關
 - (C) 沒有引發敗血症的風險
 - (D) 治療較為棘手複雜
19. 下列有關於「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 氣喘發作時呼吸可發出喘鳴聲 (Wheezing)
 - (B) 「支氣管激發試驗」可用於診斷氣喘
 - (C) 「類固醇製劑」非氣喘治療藥物
 - (D) 茶鹼 (Theophylline) 為支氣管擴張劑
20. 下列有關於「體染色體顯性多囊腎疾病 (Autosomal dominant polycystic kidney disease; ADPKD)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 非遺傳性囊腫腎臟疾病
 - (B) 皆發病於嬰幼兒期
 - (C) 為最常見的腎臟囊腫病灶
 - (D) 其囊腫也可在其他器官被發現
21. 下列針對「肺膿瘍 (Lung abscess)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 死亡率無需考慮其他併存疾病的影響
 - (B) 致病因只有細菌
 - (C) 口咽部功能異常者為危險族群
 - (D) 肺活量絕不會受限制
22. 下列針對「微小變化型腎病 (Minimal change disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 好發於成人而非兒童
 - (B) 有些病例可自癒
 - (C) 預後與「原發性局部節段性腎絲球硬化症」一樣差
 - (D) 皆為繼發於「全身性紅斑性狼瘡」所造成的腎臟傷害
23. 下列針對「通氣障礙」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 肺功能檢查可評估通氣障礙的型態
 - (B) 肺功能檢查可評估通氣障礙的嚴重程度
 - (C) 無「混合型通氣障礙」的型態
 - (D) 「慢性支氣管炎」可為阻塞型通氣障礙

24. 下列針對「梅毒 (Syphilis)」實驗室檢驗的敘述，何者是正確的？
- (A) 梅毒螺旋體血球凝集反應 (TPHA) 為篩檢試驗
 - (B) 快速血漿反應素試驗 (RPR) 為確診試驗
 - (C) 當患者經完整抗生素治療成功後，血清性病研究實驗室試驗 (VDRL) 滴定值會隨時間而下降或轉呈陰性
 - (D) 當患者經完整抗生素治療成功後，血清螢光梅毒螺旋體抗體吸附試驗 (FTA-ABS) 滴定值皆會隨時間而轉呈陰性
25. 下列比較「酒癮」跟「藥癮」的相關敘述，何者為是？
- (A) 兩者均不會產生戒斷症狀
 - (B) 兩者有可能合併
 - (C) 精神障礙的患者，不易合併酒癮或藥癮
 - (D) 酒癮會產生身體多器官的病變，藥癮不會
26. 下列有關「水腦症」的敘述，何者為是？
- (A) 有可能找不到特定致病原因
 - (B) 與失智症或巴金氏症容易在症狀上區分
 - (C) 腦部影像檢查是不必要的
 - (D) 幼兒發生的水腦症為核保考量的有利因素
27. 下列何選項，「不」屬於「動脈硬化」在「四肢動脈」產生的症狀？
- (A) 四肢末端疼痛
 - (B) 蒼白
 - (C) 脈搏微弱
 - (D) 發熱
28. 下列關於「精神病」的敘述，何者「正確」？
- (A) 並不少見，比率在 10% 以上
 - (B) 發生率在不同的地域、文化間，並無差異
 - (C) 病因很明確，必定是與遺傳有關
 - (D) 缺乏病識感，患者無法得知自己生病
29. 下列關於「重症肌無力」的敘述，何者「正確」？
- (A) 病因是發生在神經與肌肉的交接處
 - (B) 是一種根源於新陳代謝系統的疾病
 - (C) 治療不包含胸腺切除
 - (D) 病情不會嚴重到發生呼吸衰竭的情形

30. 下列關於「腦炎」、「腦膜炎」、「腦膿瘍」的比較，何者為「是」？
- (A) 三者皆有可能影響意識
 - (B) 腦膜炎以細菌感染最常見
 - (C) 腦膜炎的併發症不包含腦炎
 - (D) 腦膿瘍的感染來源不包含頭顱鄰近部位感染
31. 關於「腦動脈血管瘤」與「腦瘤」的敘述，何者為非？
- (A) 多數腦動脈血管瘤位於腦血管的分岔處
 - (B) 若腦動脈血管瘤破裂，致死率很高
 - (C) 腦瘤的來源除了由顱內不同的細胞發展而成，由他處轉移至顱內的腫瘤也可叫腦瘤
 - (D) 原發性的腦瘤好發於20—30歲的年輕人
32. 關於「坐骨神經痛」的敘述，何者為非？
- (A) 不會造成失能
 - (B) 經治療大多恢復良好，少部分會轉為慢性
 - (C) 最常見原因為腰椎椎間盤軟骨突出病變
 - (D) 坐骨神經痛可持續數週甚至數月，與「肌肉拉傷」不同，後者短期即可恢復
33. 下列何者並非「腦出血」的原因？
- (A) 高血壓
 - (B) 外傷
 - (C) 抗凝血藥物使用
 - (D) 身體脫水
34. 下列哪個「心絞痛」的特色是，在休息或半夜發作，與冠狀動脈痙攣有關、冠狀動脈攝影無血管狹窄、發作時心電圖ST節段上升？
- (A) 變異性心絞痛
 - (B) 穩定型心絞痛
 - (C) 不典型心絞痛
 - (D) 不穩定型心絞痛

35. 關於「心內膜炎」的敘述，何者為非？
- (A) 併發症不含心臟衰竭
 - (B) 可分為慢性或急性發炎
 - (C) 靜脈注射可引發右心心內膜炎
 - (D) 診斷包含血液培養
36. 關於「腫瘤」的敘述，何者為是？
- (A) 良性腫瘤不會遠端轉移
 - (B) 不同腫瘤在不同地區與人種，有相同的盛行率
 - (C) 不同性別好發的腫瘤一樣
 - (D) 沒有特別的病因，病毒不會造成
37. 關於「癌症分期」，下列敘述何者為非？
- (A) 「原位癌」比「第四期癌」來得嚴重
 - (B) 正確理解癌症的分期，對評估各種險種所需的等待期是重要的
 - (C) 各個器官的癌症分期有不同的規則
 - (D) 腎臟的癌症中，腎盂癌與腎皮質癌的分期方法不同
38. 關於「高血脂症」，下列哪個敘述為非？
- (A) 低密度膽固醇為壞的膽固醇
 - (B) 高密度膽固醇為好的膽固醇
 - (C) 三酸甘油脂越高越好
 - (D) 使用女性荷爾蒙會使三酸甘油脂增高
39. 下列何者不為「水腫」的病因？
- (A) 甲狀腺低下
 - (B) 心臟衰竭
 - (C) 肝硬化
 - (D) 營養過剩
40. 下列選項何者不屬於「缺血性心臟病」的相關檢查？
- (A) 運動心電圖
 - (B) 心導管
 - (C) 核子醫學檢查
 - (D) 肺部電腦斷層

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者疾病常會有關節炎的症狀？
- (A) 痛風
 - (B) 紅斑性狼瘡
 - (C) 關節退化
 - (D) 貧血
42. 有關視網膜的敘述，以下何者是對的？
- (A) 當視網膜與脈絡膜分離時，稱為視網膜剝離
 - (B) 高度近視眼是視網膜疾病的危險因子之一
 - (C) 高度近視眼最常引起視網膜剝離的型態，最常見的是裂孔性視網膜剝離
 - (D) 高度近視眼可引起視網膜格子病變
43. 下列關於肝硬化患者的血液檢查表現，何者是錯誤的？
- (A) 凝血酶原時間減少
 - (B) 血小板增加
 - (C) 膽紅素增加
 - (D) 白蛋白上升
44. 下列何者不是原發性甲狀腺功能亢進症的常見表現？
- (A) 血中 T3 與 T4 下降
 - (B) 血中 TSH 增加
 - (C) 體重上升
 - (D) 心搏變慢
45. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 煤肺病 (Anthracosis) 為一種肺栓塞疾病
 - (B) 長期臥床者與發生肺栓塞的機率無關
 - (C) 心房纖維顫動有可能形成造成肺栓塞的血栓栓子
 - (D) 轉移性惡性腫瘤為肺栓塞可能的潛在病因

46. 下列針對 2002 年美國國家腎臟基金會 (National kidney foundation)，對「慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease)」所下定義中的敘述，何者是正確的？
- (A) 腎臟損害指腎臟的結構或功能異常
 - (B) 腎臟損害大於或等於三個月
 - (C) 腎絲球過濾率小於 $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ 大於或等於三個月
 - (D) 腎絲球過濾率大於 $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ 屬正常腎功能
47. 下列哪些為「細胞學檢查」常見的組織來源？
- (A) 子宮頸抹片
 - (B) 甲狀腺抽吸
 - (C) 肋膜積液
 - (D) 腹水
48. 下列哪些為「精神官能症」可合併的併發症？
- (A) 睡眠障礙
 - (B) 失能狀況
 - (C) 酒精或藥物濫用
 - (D) 憂鬱症
49. 下列哪些為「巴金森氏症」的疾病特徵？
- (A) 肢體顫抖
 - (B) 僵硬
 - (C) 緩慢
 - (D) 面部表情呆滯
50. 下列哪些選項屬於「心房顫動」或「心房撲動」的病因？
- (A) 急慢性酒精中毒
 - (B) 甲狀腺功能亢進
 - (C) 心肌病變
 - (D) 缺血性心臟病