

**中華民國人壽保險管理學會**  
**112 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關骨骼的敘述何者最正確？
  - (A) 人體骨頭形狀有長骨、短骨、扁平骨及其他特殊形狀，其中股骨、肱骨形狀都是長骨
  - (B) 成年後，脊椎胸骨都是可製造血球的地方
  - (C) 骨頭與骨頭相連的地方稱為關節
  - (D) 以上皆是
  
2. 以下何者不屬於頭蓋骨 (cranial bone) ？
  - (A) 額骨 (Frontal bone)
  - (B) 頂骨 (Parietal bone)
  - (C) 上頷骨 (Mandible)
  - (D) 顳骨 (Temporal bone)
  
3. 以下何者不是構成肩關節的骨頭？
  - (A) 鎖骨
  - (B) 恥骨
  - (C) 肩胛骨
  - (D) 肱骨
  
4. 腕隧道 (carpal tunnel) 位於手腕，只要增加隧道內壓力會導致以下何者的功能異常，而稱為腕隧道症候群？
  - (A) 橈神經
  - (B) 尺神經
  - (C) 正中神經
  - (D) 肌皮神經
  
5. 以下何者肌肉不是屬於上肢的肌肉？
  - (A) 肱二頭肌 (biceps brachii)
  - (B) 肱橈肌 (Brachioradialis)
  - (C) 腓腸肌 (Gastrocnemius)
  - (D) 三角肌 (Deltoid)

6. 以下有關骨折的敘述，何者是錯的？
- (A) 因為疾病造成骨頭較脆弱而發生的骨折稱為病理性骨折
  - (B) 粉碎性骨折是指骨折裂痕不只一條，骨頭可裂成數塊
  - (C) 開放性骨折是指皮膚有裂傷，骨頭直接暴露在外界空氣之中
  - (D) 骨折本身就是會經常致人於死的傷害
7. 有關貧血的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 最常見的貧血原因是缺鐵性貧血
  - (B) 葉酸、維他命 B12 缺乏都是造成貧血的原因
  - (C) 白血病會引起貧血
  - (D) 地中海型貧血是性染色體異常的遺傳疾病
8. 有關類風溼性關節炎的敘述，以下何者有誤？
- (A) 類風溼性關節炎是慢性進行性的疾病
  - (B) 類風溼性關節炎是自體免疫疾病，以侵犯關節為主
  - (C) 類風溼性關節炎可發生於任何年紀，以男性居多，隨著年紀增加，罹病率增加
  - (D) 類風溼性關節炎的關節主要變化是滑膜發炎
9. 下列何者不是格雷夫氏病 (Grave's Disease) 的表現？
- (A) 腹瀉
  - (B) 心搏過速
  - (C) 血中 TSH 上升
  - (D) 體重下降
10. 結腸癌最常以何種形式發生？
- (A) 腺癌
  - (B) 類癌
  - (C) 淋巴瘤
  - (D) 鱗狀細胞癌
11. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者是糖尿病的診斷標準？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
  - (B) 葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超過 126mg/dl
  - (C) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
  - (D) 小便出現尿糖

12. 下列關於胰臟炎的描述，何者是錯誤的？
- (A) 脂肪酶 (Lipase) 指數上升是診斷急性胰臟炎的重要依據之一
  - (B) 高三酸甘油血症可能導致急性胰臟炎
  - (C) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
  - (D) 高血壓症是導致慢性胰臟炎的最常見原因
13. 下列關於潰瘍性結腸炎 (ulcerative colitis) 的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種免疫疾病
  - (B) 主要影響從口到肛門的所有消化道
  - (C) 可能導致腸穿孔
  - (D) 可能導致大腸癌
14. 下列關於病毒性肝炎的敘述，何者是正確的？
- (A) 被 C 型肝炎病毒感染後，大多會發展成急性猛爆性肝炎
  - (B) 臺灣的慢性 B 型肝炎患者，大多是成年後才被感染
  - (C) D 型肝炎只能在已經患有 B 型肝炎者間造成感染
  - (D) A 型肝炎是造成肝硬化的主要風險因子之一
15. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者是正確的？
- (A) 激烈運動後之橫紋肌溶解症，多會造成  $\alpha$ -胎兒蛋白 (AFP) 上升
  - (B) 部分肝癌患者  $\alpha$ -胎兒蛋白 (AFP) 並不會上升
  - (C) 肝硬化患者白蛋白 (Albumin) 多會上升
  - (D) 肝炎急性發作， $\alpha$ -胎兒蛋白 (AFP) 不會上升
16. 下列何種不是肝硬化患者的常見表現？
- (A) 手掌紅斑
  - (B) 食道靜脈曲張
  - (C) 凝血酶原時間減少
  - (D) 胸壁皮膚蜘蛛狀血管瘤
17. 下列有關「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 氣喘為不可回復性的局限性呼吸道疾病
  - (B) 為氣管支氣管樹對多樣性的刺激產生異常過度反應
  - (C) 只可出現於兒童
  - (D) 重積性氣喘是一種氣喘輕症

18. 下列有關「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指於腎臟出現的囊腔
  - (B) 可出現於單側或雙側腎臟
  - (C) 數目可能單一或多個
  - (D) 皆為「單純性腎囊腫 (Simple renal cysts)」
19. 下列有關「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因結核分枝桿菌 (Mycobacterium tuberculosis) 感染肺部
  - (B) 為不具有傳染性的肉芽腫性疾病
  - (C) 可感染任何年齡群
  - (D) 有多重抗藥性結核菌的出現
20. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 於泌尿系統中形成易溶解的結晶沈積物
  - (B) 其成份只有草酸鈣結石
  - (C) 結石形成的原因只與飲食有關
  - (D) 「腎盂截石術」為開刀取石術
21. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指支氣管壁呈現可回復的正常擴張
  - (B) 纖毛清除功能不會受損
  - (C) 易導致肺炎反覆發生
  - (D) 「病灶肺葉切除」非治療方式之一
22. 下列有關「腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis)」的敘述，何者是錯誤的敘述？
- (A) 會影響腎臟的過濾功能
  - (B) 不會發生末期腎臟衰竭
  - (C) 可使用「皮質類固醇」治療
  - (D) 「糖尿病」會造成此腎病
23. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指肺腺泡呈現暫時的破壞性擴張
  - (B) 盛行率與吸菸量有關
  - (C) 嚴重者甚至可呈現呼吸衰竭
  - (D) 「肺容積減除手術」為外科可做的治療方式之一

24. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為慢性腎臟衰竭早期或最先的臨床表現
  - (B) 急性腎臟衰竭不會導致
  - (C) 臨床上不視為一種症候群 (Uremic syndrome)
  - (D) 「全身性紅斑性狼瘡」可能是造成的原因之一
25. 臨床上常用格拉斯哥氏昏迷量表 (Glasgow coma scale, GCS) 來判斷意識狀態，下列相關描述，何者為「非」？
- (A) 由「睜眼」、「運動」、「語言」(EMV) 三項的反應來評估
  - (B) 最低分為 0 分，為深度昏迷
  - (C) 最高分為 15 分
  - (D) 滿分為 E4V5M6
26. 關於心血管系統，何者為「非」？
- (A) 血流方向: 靜脈→微血管→動脈
  - (B) 供應心臟肌肉的血管，稱為冠狀動脈
  - (C) 心輸出量=心搏量 X 心搏速率
  - (D) 血壓是指動脈內的壓力
27. 關於現行癌症分期 TNM 系統，下列哪個敘述是「錯的」？
- (A) 可分為 Tis (T0), I~IV 期
  - (B) cTNM 表示為臨床分期
  - (C) M 指的是有無遠端器官的轉移
  - (D) 看到 ypT0N0M0 的分期，表示此人無癌症
28. 關於「酒精與藥物濫用」的預後，下列敘述何者為「是」？
- (A) 易戒斷、不易復發
  - (B) 不易發生精神疾病
  - (C) 不會產生身體多器官病變
  - (D) 易造成意外事故
29. 關於「癲癇」，下列敘述何者為「是」？
- (A) 小發作在成人比較常見
  - (B) 病因通常明確
  - (C) 大發作發生時會失去意識
  - (D) 不會造成次發性腦部傷害或精神問題

30. 關於「眩暈症」，下列敘述何者為非？
- (A) 聽力檢查為其中的診斷工具之一
  - (B) 診斷得排除腦中風與心血管疾病等
  - (C) 併發症有精神憂鬱或意外摔傷
  - (D) 病因不含梅尼爾氏症
31. 下列關於「失智症」的敘述，何者為非？
- (A) 阿茲海默氏症為其中一種
  - (B) 以血管性失智症占比最高
  - (C) 無法根本治癒
  - (D) 在意識清醒狀態下，有明顯多種的高級腦功能障礙
32. 關於「腦性麻痺」的敘述，何者為是？
- (A) 是可以治癒的疾病
  - (B) 不會合併視力、聽力、智力的障礙
  - (C) 診斷主要是依靠病史，以及發育過程中不同症狀出現，再配合神經功能檢查而認定
  - (D) 是尚未發育成熟的腦部神經系統，特別是掌管感覺功能的部分受到傷害而致的結果
33. 下列關於「精神官能症」與「精神病」的比較，何者為非？
- (A) 兩者皆有可能住院治療
  - (B) 皆可能合併睡眠障礙
  - (C) 皆可能合併藥物濫用
  - (D) 「精神官能症」併發症不含憂鬱
34. 關於神經系統的敘述，何者為是？
- (A) 樹突末端有神經傳導物質，傳到另一個細胞的細胞體
  - (B) 突觸位於樹突末端與另一神經細胞的細胞體或軸突之間的區域
  - (C) 神經與神經間，神經與腺體間，神經與肌肉間都有突觸
  - (D) 正腎上腺素酶會在細胞間隙裂解傳導物，終止神經傳導
35. 關於病理報告的判讀，下列敘述何者為是？
- (A) 最重要的是診斷部分
  - (B) 若化學放射治療後的病理報告顯示無癌細胞，表示此人無癌症
  - (C) 病理報告不可能看的到腫瘤的病理分期
  - (D) 子宮頸抹片屬於病理報告，不是細胞學報告

36. 關於「血液」組成，下列敘述何者為是？
- (A) 血漿的成分比血球多
  - (B) 血漿中最多的成分是蛋白質
  - (C) 血球中的血小板是負責運送氧氣
  - (D) 貧血是指血液中的血小板不足
37. 下列何者不是「繼發性高血壓」的原因？
- (A) 腎上腺機能不全
  - (B) 嗜鉻細胞瘤
  - (C) 甲狀腺亢進
  - (D) 腎動脈狹窄
38. 關於「心衰竭」，下列敘述何者錯誤？
- (A) 可分為左心衰竭、右心衰竭
  - (B) 檢查包含心臟超音波、胸部 X 光、抽血檢驗
  - (C) 須對心衰竭根本原因做治療
  - (D) 症狀治療不包含飲食與臥床休息
39. 關於「缺血性心臟病」常見症狀，何者為非？
- (A) 胸痛
  - (B) 噁心嘔吐
  - (C) 背部、頸部、下顎痛
  - (D) 血便
40. 關於「心肌肥厚」的成因，何者為非？
- (A) 生理性
  - (B) 甲狀腺亢進
  - (C) 高血壓
  - (D) 癲癇

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 踝關節是由以下那些骨頭構成
- (A) 脛骨
  - (B) 腓骨
  - (C) 距骨
  - (D) 跟骨
42. 以下有關青光眼的敘述，何者是正確？
- (A) 青光眼一定是眼壓異常高而引起的疾病
  - (B) 近來因近視人口遽增，而導致青光眼人口也增加
  - (C) 睫狀體分泌的液體（房水）製造過多或排出受阻，都是造成青光眼的原因
  - (D) 青光眼可導致視神經萎縮，而造成視野短缺
43. 下列關於肝癌的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 肝癌的最主要導因在台灣是酗酒
  - (B) 男女罹病比率約為 1:3
  - (C) 好發年齡在 30 歲左右
  - (D) 肝靜脈栓塞是主要治療方式之一
44. 下列關於第 1 型與第 2 型糖尿病的比較，何者是錯誤的？
- (A) 第 2 型病人多發生於 30 歲以下
  - (B) 第 1 型病人病情發作緩慢
  - (C) 第 1 型病人大多有肥胖體型
  - (D) 第 1 型病人以口服降血糖劑治療
45. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 診斷慢性支氣管炎時無需排除其他原因如鬱血性心臟衰竭引起的咳嗽
  - (B) 可分類為慢性非阻塞性和慢性阻塞性支氣管炎
  - (C) 內科藥物治療可使用支氣管擴張劑 (Bronchodilators) 或糖性類皮質酮 (Glucocorticoids)
  - (D) 手術治療可置入下腔靜脈濾器 (Inferior vena cava filter)

46. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 子宮肌瘤 (Uterine myoma) 指子宮內膜的組織結構侵入子宮肌層中
  - (B) 巧克力囊腫 (Chocolate cyst) 指子宮內膜的組織結構出現於卵巢
  - (C) 為慢性骨盆腔疼痛的原因之一
  - (D) 手術治療可採取子宮併兩側卵巢、輸卵管切除
47. 關於精神病 (Psychosis) 的敘述，何者為是？
- (A) 患者發生意外事故、自殺、失能等機率偏高
  - (B) 病人通常有病識感，知道自己的想法與行為是不正常的
  - (C) 憂鬱症在整個病程中不會出現狂躁現象
  - (D) 自殺是它合併症中的最大問題
48. 下列哪些選項屬於腦膜分層的名稱？
- (A) 軟腦膜
  - (B) 硬腦膜
  - (C) 肋膜
  - (D) 蜘蛛網膜
49. 下列哪些心律不整可以在正常生理反應下產生？
- (A) 竇性心跳過速
  - (B) 心房期外收縮
  - (C) 心室纖維顫動
  - (D) 第三度房室傳導阻斷
50. 下列哪些癌症的第一期，不在新型重大疾病險 (重度) 的理賠範圍？
- (A) 前列腺癌
  - (B) 乳癌
  - (C) 大腸直腸癌
  - (D) 子宮頸癌