

中華民國人壽保險管理學會
113 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 有關巴金森氏症 (Parkinsonism) 的敘述，以下何者正確？
 - (A) 巴金森氏症最常見的症狀是喪失記憶
 - (B) 發病的年紀大都小於 40 歲
 - (C) 發生的病因是腦分泌的多巴胺大量增加
 - (D) 核保上年紀大於 40 歲罹病者，會比小於 40 歲以下罹病者有利

2. 以下有關腦脊髓液的流向，何者正確？
 - (A) 側腦室分泌腦脊髓液→第三腦室→中央導水管→第四腦室
 - (B) 側腦室分泌腦脊髓液→中央導水管→第四腦室→第三腦室
 - (C) 側腦室分泌腦脊髓液→中央導水管→第三腦室→第四腦室
 - (D) 側腦室分泌腦脊髓液→第四腦室→第三腦室→中央導水管

3. 以下有關癲癇的敘述，何者正確？
 - (A) 癲癇是因脊髓細胞過度放電所引起
 - (B) 每次癲癇發作的時候，都會伴隨意識喪失、四肢抽搐與顫動
 - (C) 是否罹患癲癇，只要做腦波即可判斷
 - (D) 癲癇患者因容易意外傷害，失能等，故死亡率較一般人高

4. 以下有關阿茲海默氏症 (Alzheimer's Disease) 的敘述，何者錯誤？
 - (A) 是造成失智症最常見的原因
 - (B) 症狀可能合併精神異常現象
 - (C) 年紀越大，罹病機率越高
 - (D) 目前研究結果，認為是頭外傷所導致

5. 以下有關腦瘤的敘述，何者錯誤？
 - (A) 只要發生頭顱腔內的腫瘤皆稱為腦瘤
 - (B) 腦瘤的診斷，常是因是腦部細胞受腫瘤壓迫產生神經症狀
 - (C) 青少年時期是腦瘤最好發的時期
 - (D) 腦膜瘤以良性居多

6. 以下有關腦性麻痺的敘述，何者錯誤？
- (A) 是指青少年時期因腦部疾病而造成的永久神經損傷
 - (B) 症狀的表現，根據腦損傷的嚴重性，會有不同程度的運動障礙
 - (C) 腦性麻痺患者可能合併視力及聽力的障礙
 - (D) 腦部病變是屬於非進行性變化
7. 以下有關腦動脈血管瘤（Cerebral aneurysm）的敘述，何者錯誤？
- (A) 是腦動脈血管膨出的血管病變
 - (B) 患者年齡大多大於 40 歲
 - (C) 高血壓、動脈硬化、遺傳等都是危險因子和病因
 - (D) 大多數的腦動脈瘤尚未破裂時就會有明顯症狀，所以可以早期發現與治療
8. 以下有關腦中風的敘述，何者錯誤？
- (A) 腦中風包含腦出血與腦梗塞等兩種病變
 - (B) 常見的出血性腦中風是腦動脈瘤破裂引起硬腦膜上出血性的中風
 - (C) 出血性的腦中風的死亡率大於梗塞性腦中風的死亡率
 - (D) 高血壓，糖尿病是腦中風的高危險群
9. 有關酒精成癮的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 酒精成癮者可能會合併行為異常及生理病變
 - (B) 與藥物成癮合併存在的比例較一般人高
 - (C) 與肝硬化，肝癌相關
 - (D) 精神障礙者發生酒癮機會和一般人相同
10. 保戶告知有下背痛求診，經查證，病歷上載有下背至臀部，大腿到小腿等有麻木無力疼痛的現象，最可能是以下哪個部位的疾病所致？
- (A) 腦部
 - (B) 頸椎
 - (C) 胸椎
 - (D) 腰椎
11. 有關熱痙攣的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 發生於嬰幼兒
 - (B) 可能和腦部發育不成熟相關
 - (C) 痙攣發作時間很短，但必須特別治療給予抗癲癇藥物，否則會長期復發
 - (D) 發作時主要以全身性、對稱性出現強直攣縮或抽動症狀

12. 有關痛風的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 痛風發作時，尿酸不一定高於正常值
 - (B) 痛風是尿酸沉積於關節造成肌肉發炎，而產生疼痛的症狀
 - (C) 痛風好發於中年男性，女性則於停經後較常見
 - (D) 痛風可因尿酸生產太多或排泄減少而引起
13. 有關愛滋病（AIDS）的敘述，以下何者正確？
- (A) 愛滋病是先天免疫系統不全所造成的症候群
 - (B) 愛滋病的帶原者是指帶有愛滋病的基因，隨時可能發作
 - (C) 愛滋病的潛伏期到發病的時間很長，帶病投保的可能性高
 - (D) 最重要決定愛滋病的預後因子是有無接受治療
14. 以下何者不屬於自體免疫性疾病？
- (A) 類風濕性關節炎
 - (B) 紅斑性狼瘡
 - (C) 僵直性脊椎炎
 - (D) 血友病
15. 以下有關骨髓炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 台灣最常見的致病微生物是化膿性的細菌，如金黃色葡萄球菌
 - (B) 造成骨髓炎的原因有外傷性和血行性
 - (C) 外傷性骨髓炎是台灣的慢性骨髓炎主因
 - (D) 外傷性骨髓炎治療痊癒後不會再發，故不影響危險評估
16. 有關正血球性貧血（紅血球大小正常），下列何者是最可能的原因？
- (A) 維他命 B12 缺乏
 - (B) 急性失血
 - (C) 缺鐵性貧血
 - (D) 地中海型貧血
17. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者錯誤？
- (A) 一次大量飲酒後，r-GT 多會上升
 - (B) 肝硬化可致血中白蛋白下降
 - (C) 正常孕婦血中 α -Fetoprotein 可較非孕婦上升
 - (D) 酒精性肝病者 GPT 多明顯高於 GOT

18. 下列關於血脂異常的描述，何者正確？
- (A) 糖尿病患者高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) 易升高
 - (B) 腎病症候群患者低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) 易升高
 - (C) 過度飲酒者三酸甘油酯 (TG) 易下降
 - (D) 甲狀腺功能低下患者低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) 易下降
19. 下列關於甲狀腺機能亢進的描述，何者為非？
- (A) 發生率女性多於男性
 - (B) 嚴重者可能引起甲狀腺風暴
 - (C) 易致體重下降
 - (D) 幼年期甲狀腺機能亢進易導致呆小症 (Cretinism)
20. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超過 126mg/dl
 - (C) 飯後血糖超過 200mg/dl
 - (D) 糖化血色素 (HbA1c) 超過 6.5%
21. 下列關於 A 型肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 得過 A 型肝炎的患者，大多會產生終身免疫
 - (B) 少數 A 型肝炎患者可能發展成急性猛爆性肝炎
 - (C) A 型肝炎患者大多症狀輕微可完全痊癒
 - (D) A 型肝炎是造成台灣慢性肝炎的主要病因之一
22. 泌乳激素 (Prolactin) 主要由何種內分泌腺體分泌？
- (A) 乳腺
 - (B) 卵巢
 - (C) 腦下垂體
 - (D) 腎上腺
23. 下列關於 B 型肝炎的敘述，何者正確？
- (A) 台灣自民國 93 年起開始實施新生兒 B 型肝炎疫苗注射
 - (B) 台灣的肝癌一半以上皆由 B 型肝炎引起
 - (C) AntiHBe 陽性代表病毒仍在體內複製
 - (D) AntiHBs 陽性代表 B 型肝炎帶原

24. 下列何者是巨人症 (Gigantism) 的主要病因？
- (A) 青春期前，生長激素分泌過多
 - (B) 青春期前，副甲狀腺素分泌過多
 - (C) 成年後，生長激素分泌過多
 - (D) 成年後，副甲狀腺素分泌過多
25. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 因結核分枝桿菌 (Mycobacterium Tuberculosis) 感染肺部
 - (B) 可感染任何年齡群
 - (C) 治療一般只需口服一週一種抗結核藥物即可
 - (D) 繼發性肺結核可能來自於原發性肺結核的惡化
26. 下列有關於「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 因遭受梅毒螺旋體 (Treponema Pallidum) 感染
 - (B) 經由胎盤傳染給胎兒即先天性梅毒 (Congenital Syphilis)
 - (C) 晚期梅毒可造成身體主要器官的傷害
 - (D) 梅毒螺旋體血球凝集反應 (TPHA) 皆會因治療成功而轉呈陰性
27. 下列有關於「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 為阻塞性呼吸道疾病
 - (B) 支氣管激發試驗為診斷檢查之一
 - (C) 重積性氣喘 (Status Asthmaticus) 是一種氣喘危象
 - (D) 藥物治療只可用於緩解氣喘急性發作
28. 下列有關於「體染色體顯性多囊腎疾病 (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease)」的敘述，何者正確？
- (A) 又稱「多囊性腎發育不良 (Multicystic Dysplastic Kidney)」
 - (B) 在生命的第一年有較高死亡率
 - (C) 囊腫不會出現於其他器官
 - (D) 有可能同時存在顱內動脈瘤
29. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」的敘述，何者正確？
- (A) 診斷無需先排除其他明確原因引起的咳嗽
 - (B) 型態皆為阻塞性支氣管炎
 - (C) 因肺高壓引起之心臟病為併發症之一
 - (D) 吸菸為最少見的危險因子

30. 針對「原發性局部節段性腎絲球硬化症 (Focal Segmental Glomerulosclerosis)」，下列敘述何者錯誤？
- (A) 會發生突發性腎病症候群表徵
 - (B) 治療對類固醇反應不佳
 - (C) 會發展至腎臟衰竭
 - (D) 由 A 群 β 型溶血性鏈球菌感染後所引發
31. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者正確？
- (A) 只可獲得肺臟吸入的氣體量即肺容量
 - (B) 可評估通氣障礙的型態
 - (C) 無法評估通氣障礙的嚴重程度
 - (D) 肺流量相等於肺容量
32. 下列針對 2002 年美國國家腎臟基金會 (National Kidney Foundation)，對「慢性腎臟疾病 (Chronic Kidney Disease)」所下的定義的敘述，何者正確？
- (A) 其中「腎臟損害」不包括病理切片檢查的異常
 - (B) 其中「腎臟損害」的標誌包括蛋白尿每天大於 200 毫克
 - (C) 腎絲球過濾率預測值 (Estimated Glomerular Filtration Rate; eGFR) 無法評估慢性腎臟疾病的期別
 - (D) 「腎臟損害」小於三個月
33. 關於「不穩定心絞痛」，下列敘述何者為非？
- (A) 運動或休息時都會發作
 - (B) 冠狀動脈無狹窄
 - (C) 發作的頻率越來越高
 - (D) 一次接著一次的症狀越趨嚴重
34. 下列有關「心律不整」的敘述，何者為非？
- (A) 「期外收縮」通常良性居多
 - (B) 「陣發性心跳過速」可分為心房性與心室性
 - (C) 「心臟傳導阻斷」有很多種，無論何種預後都非常差
 - (D) 「心室纖維顫動」很致命，需立即治療

35. 有關「心內膜炎」與「風濕性心臟病」的比較，何者為非？
- (A) 風溼性心臟病也可引起心內膜炎
 - (B) 心內膜炎的症狀有發燒，胸悶，及喘
 - (C) 風溼性心臟病早期無症狀，很多是無意中被醫生發現有心雜音，進一步檢查才發現此病
 - (D) 兩者皆不會引起瓣膜破壞
36. 下列選項何者「不屬於」缺血性心臟病會安排的相關檢查？
- (A) 運動心電圖
 - (B) 心臟核子掃描
 - (C) 冠狀動脈攝影
 - (D) 24小時心電圖
37. 下列何者「不屬於」高脂血症與動脈粥狀硬化者的治療？
- (A) 盡量不運動
 - (B) 戒菸
 - (C) 飲食控制
 - (D) 藥物治療
38. 下列哪個疾病不會引起胸痛的症狀？
- (A) 心臟神經官能症
 - (B) 氣胸
 - (C) 腰椎椎間盤突出
 - (D) 主動脈夾層動脈瘤破裂
39. 為什麼腫瘤核保時要提供病理報告及相關病歷，下列敘述何者為非？
- (A) 無法從病歷得知其他體況
 - (B) 藉由病歷得知癌症有無復發
 - (C) 藉由病理報告得知癌症期別
 - (D) 藉由病歷得知癌症有無轉移
40. 下列關於癌症分期的敘述，何者為是？
- (A) cTNM 的 c 指的是 cancer 的意思
 - (B) ypT0N0M0 指的是，做過治療且後續手術下來的檢體上看不到癌細胞，淋巴結也沒有癌轉移
 - (C) 膀胱癌可見 T0a 或 T0is，兩者是同一情況
 - (D) 甲狀腺癌的 anaplastic carcinoma (未分化癌) 中，年齡是分期中重要的參數

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是造成頭痛合併嘔吐的原因之一？

- (A) 偏頭痛
- (B) 腦壓異常
- (C) 器質性腦病
- (D) 叢集性的頭痛

42. 以下何者是造成水腦症的原因之一？

- (A) 腦腫瘤
- (B) 頭部外傷
- (C) 先天性疾病
- (D) 癲癇

43. 以下何種疾病是暈眩原因之一？

- (A) 前庭神經炎
- (B) 梅尼爾氏症
- (C) 椎底動脈循環不良疾病
- (D) 內耳疾病

44. 以下哪兩種疾病最常合併腦瘤發生？

- (A) 多發性神經纖維瘤
- (B) 肌肉萎縮症
- (C) 結節性硬化症
- (D) 類風溼性關節炎

45. 下列關於胰臟炎的描述，何者錯誤？

- (A) 澱粉酶 (Amylase) 指數下降是診斷急性胰臟炎的重要依據之一
- (B) 膽結石可能導致急性胰臟炎
- (C) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
- (D) 高血壓是導致慢性胰臟炎的最常見原因

46. 下列關於 C 型肝炎的描述，何者錯誤？
- (A) C 型肝炎主要經口感染
 - (B) 感染 C 型肝炎後大多可自然痊癒
 - (C) 感染 C 型肝炎可能導致肝硬化或肝癌
 - (D) 目前尚無有效的抗病毒藥物可治療 C 型肝炎
47. 下列何者可為「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的病因？
- (A) 骨盆深部靜脈栓塞
 - (B) 心房纖維顫動
 - (C) 下肢長骨骨折
 - (D) 細菌性心內膜炎
48. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者正確？
- (A) 因腎臟的腎盂過濾機制受損
 - (B) 不會導致蛋白尿 (Proteinuria)
 - (C) 局部節段性腎絲球硬化症 (Focal Segmental Glomerulosclerosis) 為病因之一
 - (D) B 或 C 型肝炎感染為病因之一
49. 下列哪些為「心房顫動」與「心房撲動」共同的病因？
- (A) 急性或慢性的酒精中毒
 - (B) 甲狀腺亢進引起的心肥大
 - (C) 心肌炎
 - (D) 瓣膜性心臟病
50. 下列列舉的「組織病理碼」，哪些為惡性？
- (A) 5 2 4 0 3
 - (B) 8 1 4 0 6
 - (C) 7 2 0 4 0
 - (D) 8 4 4 2 1