

中華民國人壽保險管理學會
114 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關骨性關節炎(Osteoarthritis)的敘述，何者正確？
 - (A) 外傷是骨性關節炎最常見的原因
 - (B) 骨性關節炎最常見於老年人
 - (C) 骨性關節炎都是因為關節中滑膜受損而造成
 - (D) 最常侵犯的關節是手肘關節
2. 以下有關骨髓炎(Osteomyelitis)的敘述，何者錯誤？
 - (A) 病原體可以經由血流或骨折受傷處或鄰近組織而感染造成骨髓炎
 - (B) 骨髓炎如治療不完全可能變成慢性而延續多年
 - (C) 開放性骨折若無好好清洗治療可能導致骨髓炎
 - (D) 最常引起骨髓炎的致病微生物是黴菌
3. 有一病患的精神異常，且合併對光敏感、圓盤狀皮疹、口腔潰瘍、關節疼痛。最可能是罹患以下何種疾病？
 - (A) 地中海型貧血
 - (B) 類風溼性關節炎
 - (C) 血友病
 - (D) 全身性紅斑性狼瘡
4. 以下有關視網膜剝離的敘述，何者錯誤？
 - (A) 可發生於任何年齡層，常見於高度近視眼
 - (B) 眼球受傷可能導致視網膜剝離
 - (C) 青光眼是造成視網膜剝離最常見的原因
 - (D) 鞏膜扣壓是治療視網膜剝離的方法之一
5. 以下何者不是自體免疫性疾病？
 - (A) 類風濕性關節炎
 - (B) 全身性紅斑性狼瘡
 - (C) 何杰金氏症
 - (D) 抗磷脂質症候群(Antiphospholipid syndrome)

6. 以下有關脫臼(Dislocation)，何者錯誤？
- (A) 大多數的脫臼是外力造成的
 - (B) 最常發生脫臼的關節是踝關節
 - (C) 脫臼經常會伴隨韌帶斷裂
 - (D) 關節表面部分分離稱為半脫臼
7. 以下何者不是構成骨盆的骨頭？
- (A) 坐骨(ischium)
 - (B) 恥骨(pubis)
 - (C) 薦骨(sacrum)
 - (D) 腰椎
8. 以下有關下肢骨頭的敘述，何者錯誤？
- (A) 內踝是脛骨的一部分
 - (B) 外踝是腓骨的一部分
 - (C) 跟骨是跗骨(Tarsal bone)的一部分
 - (D) 蹠骨是跗骨(Tarsal bone)的一部分
9. 以下有關水腦症(Hydrocephalus)的敘述，何者正確？
- (A) 腦脊髓液來自小腦的分泌
 - (B) 水腦症大多有腦室擴大、腦壓增高的現象
 - (C) 造成水腦症的唯一原因是腦出血
 - (D) 水腦症一般以藥物治療來減少次發性腦損傷
10. 下列有關酒精或藥物濫用成癮(Alcoholism、Drug Abuse)的敘述，何者正確？
- (A) 酒精或藥物濫用成癮者，如突然停用酒精或藥物，不會造成生理上的異常反應
 - (B) 有精神障礙問題者，是酒精或藥物濫用成癮的高危風險人群
 - (C) 酒精或藥物濫用成癮易戒斷，因此較不會造成失能
 - (D) 藥物濫用成癮者同時合併有酒癮的情形，所佔比例不高
11. 以下何者不是腦出血(Cerebral Hemorrhage)的併發症？
- (A) 憂鬱症
 - (B) 癲癇
 - (C) 失語症
 - (D) 自體免疫病症

12. 下列有關巴金森氏症(Parkinsonism)的敘述，何者錯誤？
- (A) 腦血管疾病是巴金森氏症可能的致病原因之一
 - (B) 巴金森氏症是急性腦神經退化，以老年人較多
 - (C) 巴金森氏症病理上有中腦所分泌的多巴胺大量減少的狀況
 - (D) 腦深部刺激術對於嚴重巴金森氏症的病患是治療選項之一
13. 下列有關”神經系統”的敘述，何者錯誤？
- (A) 執行神經系統基本功能的細胞是神經細胞(neuron)
 - (B) 腦幹是神經系統內很重要的一部份，若腦幹已經停止活動的人可判定為死亡
 - (C) 中樞神經系統定義是指存在於腦部與骨髓內的神經組織
 - (D) 自主神經系統包含交感神經徑路與副交感神經徑路兩部份
14. 以下有關癲癇(Epilepsy)之敘述，何者錯誤？
- (A) 癲癇是脊髓神經細胞過度放電引起
 - (B) 癲癇發作大多突發而且短暫，可能也會有反覆發作的現象
 - (C) 癲癇重積狀態是最嚴重的癲癇發作
 - (D) 癲癇發作時意識可能喪失或清醒
15. 下列有關腦瘤(Brain tumor)的敘述，何者錯誤？
- (A) 原發性惡性腦瘤在任何年齡皆可能發生
 - (B) 無論良性或惡性腦瘤都可能造成神經功能障礙
 - (C) 腦瘤不一定會造成明顯的症狀
 - (D) 青壯年期是腦瘤最好發的時期
16. 下列有關精神病 (Psychosis) 的敘述，何者正確？
- (A) 精神病發生率在不同的文化、地域之間都是一樣的
 - (B) 精神病人大多有病識感，常會主動尋求醫療或他人的幫助
 - (C) 自殺是憂鬱症、躁鬱症的最大問題
 - (D) 精神病經治療後，皆能達到痊癒狀態，不會復發或變為慢性長期病症
17. 下列關於「第1型糖尿病」的描述，何者正確？
- (A) 約佔台灣糖尿病人口的 20%
 - (B) 主要發生在小孩子及年輕人
 - (C) 主要用口服降血糖藥治療
 - (D) 通常較肥胖

18. 驗血出現下列何種血清標記，可代表 B 型肝炎病毒仍在體內複製？
- (A) AntiHBs
 - (B) HBeAg
 - (C) AntiHBe
 - (D) AntiHBcIgG
19. 下列關於病毒性肝炎的敘述，何者是正確的？
- (A) 被 A 型肝炎病毒感染後，大多會發展成急性猛爆性肝炎
 - (B) 臺灣的慢性 B 型肝炎患者，大多是成年後才被感染
 - (C) D 型肝炎只能在已經患有 C 型肝炎者間造成感染
 - (D) C 型肝炎是台灣造成肝硬化主要病因之一
20. 下列何者不是驗血 α -胎兒蛋白 (α -Fetoprotein;AFP) 上升的可能原因？
- (A) 痛風
 - (B) 急性肝炎發作
 - (C) 懷孕
 - (D) 惡性畸胎瘤
21. 下列何者不是嚴重肝硬化臨床及驗血的常見表現？
- (A) 凝血酶原時間延長
 - (B) 白蛋白上升
 - (C) 食道靜脈曲張
 - (D) 腹水
22. 下列關於胰臟炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
 - (B) 澱粉酶指數下降是診斷急性胰臟炎的重要依據之一
 - (C) 酗酒是導致慢性胰臟炎的常見原因
 - (D) 高三酸甘油脂血症可能導致急性胰臟炎
23. 下列何者不是胃食道逆流的常見原因？
- (A) 過量飲酒
 - (B) 抽菸
 - (C) 體重過輕
 - (D) 懷孕

24. 下列何種激素分泌過多，會造成庫欣氏症候群（Cushing Syndrome）？
- (A) 生長激素（GH）
 - (B) 甲狀腺刺激素（TSH）
 - (C) 腎上腺刺激素（ACTH）
 - (D) 泌乳激素（Prolactin）
25. 下列有關「肺結核（Pulmonary Tuberculosis）」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因結核分枝桿菌（Mycobacterium Tuberculosis）感染肺部
 - (B) 在工業化或發達國家結核病相對較不會影響接受類固醇或免疫抑制治療者
 - (C) 多重抗藥性結核菌的出現使結核病的防治益形複雜
 - (D) 一般規則性口服抗結核藥物需持續 6 個月以上
26. 下列有關「尿路結石（Urolithiasis）」的敘述，何者是正確的？
- (A) 膽囊結石為其中一種
 - (B) 內分泌代謝性疾病非病因之一
 - (C) 「輸尿管鏡碎石術」為開刀取石術之一
 - (D) 尿路結石復發機會高
27. 下列有關「氣喘（Asthma）」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為不可回復性呼吸道疾病
 - (B) 為傳染性呼吸道疾病
 - (C) 為上呼吸道疾病
 - (D) 為慢性炎症性呼吸道疾病
28. 下列有關「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是正確的？
- (A) 囊腫數目只會有一個
 - (B) 皆為良性囊腫
 - (C) 最常見的為體染色體顯性多囊腎疾病
 - (D) 有可能發生腎功能不全或衰竭
29. 下列針對「慢性支氣管炎（Chronic Bronchitis）」的敘述，何者是正確的？
- (A) 至多一年且至多一個月每天持續性地有痰和黏液的咳
 - (B) 會有明確原因如肺部惡性腫瘤
 - (C) 病理組織學變化包括支氣管腺體增生肥厚
 - (D) 非阻塞型通氣障礙

30. 下列有關「腎功能不全 (Renal Insufficiency)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
 - (B) 腎臟皆為可逆的損害
 - (C) 尿毒症皆在早期階段出現
 - (D) 可出現蛋白尿
31. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary Emphysema)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指近端氣管呈現永久破壞性的擴張
 - (B) 與菸草使用無關
 - (C) 甲一型抗胰蛋白酵素缺乏症 (Alpha-1 Antitrypsin Deficiency) 為病因之一
 - (D) 肺容積減除手術非外科手術治療選項
32. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 專指慢性腎臟衰竭導致的症候群
 - (B) 不會對身體各組織器官系統造成傷害
 - (C) 肌酸酐清除率 (Creatinine Clearance) 低於 10 mL/min 可預期出現相關症狀
 - (D) 胸膜透析為治療方式之一
33. 關於「心房顫動」(atrial fibrillation)，下列敘述何者為非？
- (A) 併發症有腦中風
 - (B) 不一定有症狀
 - (C) 甲狀腺亢進是其中的一個可能病因
 - (D) 只有藥物可治療，電擊無法
34. 下列哪種「心律不整」最危急？
- (A) 心室纖維性顫動 (Ventricular Fibrillation)
 - (B) 第一度房室傳導阻斷 (First degree AV block)
 - (C) 竇性心跳過速 (Sinus tachycardia)
 - (D) 心房早發收縮 (Premature Atrial Contraction)
35. 下列哪個瓣膜位於右心房與右心室之間？
- (A) 二尖瓣
 - (B) 主動脈瓣
 - (C) 肺動脈瓣
 - (D) 三尖瓣

36. 關於「心臟」的構造，下列敘述何者為是？
- (A) 冠狀動脈是提供血液到心臟肌肉的血管
 - (B) 心室位於心房的上方
 - (C) 心臟的分層，最外層的為心內膜
 - (D) 三尖瓣位於左心室與左心房之間
37. 缺血性心臟病與冠狀動脈粥狀硬化有關，下列何者不是危險因子？
- (A) 女性
 - (B) 糖尿病
 - (C) 家族遺傳
 - (D) 抽菸
38. 關於運動員心臟 (Athlete' s heart)，下列敘述何者為是？
- (A) 病理性，非生理性
 - (B) 是心內膜增厚
 - (C) 是職業運動員透過持續的專業訓練，造成心臟肌肉變得發達
 - (D) 正常人長期做有氧運動並不會產生
39. 關於「病理報告的判讀」，何者錯誤？
- (A) 診斷部分最為重要
 - (B) 診斷包含了病理診斷、器官、手術方式
 - (C) 每份報告都會有病人的基本資料與病理醫師的簽章
 - (D) 巨觀描述了病灶在顯微鏡下的樣態
40. 下列關於「風濕性心臟病」的敘述，何者錯誤？
- (A) 心律不整不是它的併發症之一
 - (B) 主動脈瓣與二尖瓣都是它可能侵犯的位置
 - (C) 可以造成心臟瓣膜的狹窄或閉鎖不全
 - (D) 有可能會需要心臟瓣膜置換手術

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 有關貧血的敘述，以下何者正確？
- (A) 貧血是指血液中白血球細胞數目減少或血色素降低的狀態
 - (B) 世界上最常見的貧血原因是缺乏鐵
 - (C) 維生素 B12 缺乏可造成大血球性貧血
 - (D) 再生不良性貧血是因骨髓造血功能不良引起的
42. 以下何者疾病，是造成白內障的原因之一？
- (A) 遺傳、染色體異常
 - (B) 藥物(如皮質類固醇)
 - (C) 眼外傷
 - (D) 糖尿病
43. 下列有關腦性麻痺(Cerebral Palsy)的敘述，何者正確？
- (A) 腦性麻痺是腦部中樞神經在出生前後受到傷害所造成的綜合結果
 - (B) 新生兒時期黃疸是造成腦性麻痺的原因之一
 - (C) 腦性麻痺經常會出現不同程度的運動障礙，也常會有多種神經功能障礙
 - (D) 腦性麻痺所引起的功能障礙大多無法根治，症狀嚴重者恢復不佳
44. 下列有關重症肌無力(Myasthenia Gravis)的敘述，何者正確？
- (A) 重症肌無力是細菌感染造成的
 - (B) 重症肌無力是因為神經無法控制肌肉，而造成全身或局部肌肉無力
 - (C) 重症肌無力是一種慢性的自體免疫性疾病
 - (D) 重症肌無力因症狀表現很固定，所以診斷容易，也可以完全根治
45. 下列關於高血脂症的描述，何者錯誤？
- (A) 三酸甘油酯 (TG) 濃度不易受酒精、飲食等影響而改變
 - (B) 肥胖易導致三酸甘油酯 (TG) 濃度升高
 - (C) 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) 又稱為「壞膽固醇」
 - (D) 糖尿病易導致高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) 的濃度升高

46. 下列何者不是甲狀腺功能亢進症的常見表現？
- (A) 血中 T3 與 T4 下降
 - (B) 便秘
 - (C) 體重上升
 - (D) 心搏變慢
47. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 支氣管壁的構造成份遭受發炎和破壞
 - (B) 支氣管呈現可回復的不正常擴張
 - (C) 纖毛清除功能不受影響
 - (D) 易導致肺炎反覆發生
48. 下列針對「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為慢性全身性的傳染性疾病
 - (B) 不會經由胎盤傳染給胎兒
 - (C) 依病程選擇適當的抗生素治療
 - (D) 無治療的隱性梅毒仍有可能進展至晚期梅毒
49. 下列哪些選項屬於癌症治療的方式？
- (A) 質子治療
 - (B) 免疫療法
 - (C) 標靶藥物
 - (D) 化學治療
50. 下列哪些屬於「主動脈血管瘤」的病因？
- (A) 外傷
 - (B) 風濕性血管炎
 - (C) 先天性動脈血管異常
 - (D) 動脈硬化，高血壓