

中華民國人壽保險管理學會
115 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素（如颱風）之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題（單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分）（共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣）

1. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者正確？
 - (A) 約佔台灣糖尿病病人總數的 15%
 - (B) 主要以口服降血糖藥物治療
 - (C) 大多於中年後發病
 - (D) 主因胰臟無法製造胰島素而致病
2. B 肝帶原且體內病毒正在複製的病人，不會出現下列何種血清標記？
 - (A) HBV DNA
 - (B) AntiHBs
 - (C) HbeAg
 - (D) HBsAg
3. 下列關於膽結石的敘述，何者錯誤？
 - (A) 大多數膽結石患者沒有症狀
 - (B) 肥胖是膽結石常見的危險因子之一
 - (C) 膽囊切除大多可以腹腔鏡手術執行
 - (D) 大多數膽結石需經電腦斷層攝影方可診斷
4. 下列何者是診斷肝性腦病變的主要驗血檢查指標？
 - (A) α -胎兒蛋白 (AFP)
 - (B) 白蛋白 (Albumin)
 - (C) 血中氨值 (Ammonia)
 - (D) 高密度脂蛋白 (HDL)
5. 心房顫抖 (Atrial fibrillation)，較常見於下列何種內分泌異常？
 - (A) 甲狀腺功能低下
 - (B) 甲狀腺功能亢進
 - (C) 副甲狀腺功能低下
 - (D) 副甲狀腺功能亢進

6. 下列何者不是高密度脂蛋白 (HDL) 下降的常見原因？
- (A) 糖尿病
 - (B) 戒菸
 - (C) 停經
 - (D) 服用類固醇藥物
7. 下列何者不是 α -胎兒蛋白 (α -Fetoprotein; AFP) 上升的可能原因？
- (A) 肝癌
 - (B) 惡性畸胎瘤
 - (C) 急性肝炎發作
 - (D) 糖尿病
8. 依美國糖尿病協會 2010 年的建議標準，葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超過多少 mg/dl, 即可診斷為糖尿病？
- (A) 200
 - (B) 126
 - (C) 140
 - (D) 100
9. 下列有關「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指細支氣管被經由血液循環而來的栓子 (Embolus) 所堵塞
 - (B) 患有近端深部靜脈栓塞的發病率較低。
 - (C) 手術治療如栓子切除 (Embolectomy)、下腔靜脈濾器 (Inferior vena cava filter) 置入
 - (D) 急性肺性心臟病非併發症之一
10. 下列有關「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因遭受梅毒螺旋體 (Treponema pallidum) 感染
 - (B) 經由胎盤傳染給胎兒即後天性梅毒
 - (C) 依病程選擇適當的抗生素 (一般為盤尼西林) 治療
 - (D) 晚期梅毒可造成身體主要器官的傷害如神經性梅毒 (Neurosyphilis)
11. 下列有關「塵肺症 (Pneumoconiosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可能導致肺部發炎纖維化
 - (B) 因吸入物之不同可將之分類為不同的型態或疾病名稱
 - (C) 流行病學無需考慮職業環境的暴露
 - (D) 避免致病因的再暴露無助於治療效果

12. 「子宮內膜侵入子宮肌層中」即？
- (A) 巧克力囊腫
 - (B) 子宮肌腺症
 - (C) 子宮肌瘤
 - (D) 子宮內膜癌
13. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺腺泡呈現永久破壞性的擴張
 - (B) 不會造成呼吸道的塌陷與阻塞
 - (C) 盛行率與吸菸量無關
 - (D) 肺容積減除手術非治療方式之一
14. 下列有關「腎病症候群 (Nephrotic syndrome)」的敘述，何者是正確的敘述？
- (A) 因腎盂過濾機制受損
 - (B) 蛋白質異常地大量排泄於尿中
 - (C) 只有原發性腎絲球疾病可引起
 - (D) 異常低的總膽固醇值
15. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 使支氣管呈現可回復的正常擴張
 - (B) 易導致肺炎反覆發生
 - (C) 所有年齡都有可能罹患
 - (D) 外科手術可採病灶肺葉切除
16. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為腎臟衰竭早期的臨床表現
 - (B) 腎臟功能無法完全回復
 - (C) 治療不需考慮腎臟替代療法
 - (D) 臨床上可視為一種症候群 (Uremic syndrome)
17. 下列哪個選項，不是癌症分期 TNM 系統中「T」所需要考量的面向？
- (A) 該腫瘤的大小
 - (B) 該癌症所在器官
 - (C) 淋巴轉移的數目
 - (D) 該腫瘤侵犯的深度

18. 下列哪個選項，不屬於缺血性心臟病的危險因子？
- (A) 抽菸
 - (B) 家族遺傳
 - (C) 尿酸過低
 - (D) 糖尿病
19. 下列關於心絞痛的敘述，何者為非？
- (A) 變異型心絞痛為冠狀動脈痙攣
 - (B) 穩定型心絞痛通常可藉由休息與舌下甘油片，達到症狀緩解
 - (C) 變異型心絞痛發作時心電圖不會有變化
 - (D) 不穩定心絞痛在休息時也可發作
20. 關於病理報告的判讀，下列敘述何者為錯？
- (A) 有時因術前化學治療或放射治療，後續廓清手術的病理報告看不到腫瘤的判讀，此時應以術前切片報告為理賠基準
 - (B) 若性態碼是 3，代表此腫瘤為原位癌
 - (C) 細胞學有其參考價值
 - (D) 組織病理碼 72040，可知其為良性病灶
21. 關於「心房撲動」及「心房纖維性顫動」的治療，下列敘述何者為錯？
- (A) 不需治療引起此心律不整的根本原因
 - (B) 急性突發性的心房纖維性顫動，可使用藥物或電擊使其恢復正常心跳
 - (C) 需控制心跳速度
 - (D) 若為慢性心房纖維性顫動，需使用抗凝血藥，預防血凝塊生成
22. 關於「腫瘤」的理賠考量，下列哪個敘述為錯？
- (A) 細胞學不可當理賠依據
 - (B) 肝癌或末期癌症不一定會有病理報告
 - (C) 可依病理報告為理賠基準
 - (D) 有時可合併病歷與影像報告為理賠基準
23. 下列選項為心血管專有名詞的敘述，何者為非？
- (A) 心輸出量是指心臟每分鐘打出的血流量
 - (B) 心電圖可記錄通過心臟的電流變化
 - (C) 脈搏是可以感受到的微血管血壓變化
 - (D) 血壓是指動脈內的壓力

24. 關於血液的組成，下列敘述何者為是？
- (A) 貧血是指血液中的血小板不足
 - (B) 關於血液，血漿佔的比例比血球高
 - (C) 血液中的血小板負責運送氧氣
 - (D) 血漿中最多的成分是蛋白質
25. 有關貧血的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 最常見的貧血原因是缺鐵性貧血
 - (B) 葉酸、維他命 B12 缺乏都是造成貧血的原因
 - (C) 地中海型貧血是 XY 染色體異常的遺傳疾病
 - (D) 白血病會引起貧血
26. 依現行醫學診斷標準 (DSM-5)，智能障礙程度的診斷，主要根據以下哪種指標？
- (A) 適應功能表現與智力測驗
 - (B) 家庭會談與社工訪查結果
 - (C) 學校成績單與導師評語
 - (D) 運動技巧與運動會名次
27. 關於阿茲海默症 (Alzheimer's disease) 診斷與失能衡量，何者為是？
- (A) 「精神疾病診斷與統計手冊 DSM」無法作為失智症診斷參考，診斷需以抽血或影像檢查為主要。
 - (B) 臨床失智量表 (CDR, clinical dementia rating) 顧名思義，可提供失智徵候與嚴重度的量化資訊。
 - (C) 簡易心智量表 (MMSE, mini-mental status exam) 評估內容主要包括進食、個人衛生、洗澡如廁、平地與上下樓梯移動、穿脫衣褲鞋襪、大小便控制等，因此具有豐富的生活自理功能資訊 (ADL, activities of daily ilfe)。
 - (D) 巴氏量表 (Barthel Index) 主要評估內容包括定向力、記憶力、計算力、語言結構能力等，因此難以做為 ADL 評估工具。
28. 關於腦中風所致失語症 (aphasia)，下列敘述何者為非？
- (A) 運動性失語症 (motor aphasia) 意味著語言表達上的困難。
 - (B) 運動性失語症於定義上，語言理解能力相對未受損，因此大體尚能聽懂別人說的話。
 - (C) 感覺性失語症 (sensory aphasia) 意味著語言理解上的困難。
 - (D) 感覺性失語症於定義上，語言表達能力相對未受損，因此這類失語症並非「腦部言語中樞神經受損所引起」。

29. 學理上，關於腦傷與創傷性顱內出血之成因，以下何者為非？
- (A) 硬腦膜上血腫 (epidural hematoma, EDH) 通常是中腦膜動脈 (middle meningeal artery) 破裂所引起。
 - (B) 硬腦膜下血腫 (subdural hematoma, SDH) 是腦動脈血管瘤破裂所致，因此與高血壓具有高度相關性。
 - (C) 創傷性腦內血腫 (intracerebral hematoma) 常見於顳葉與額葉，但也可發生於其他位置。
 - (D) 若腦傷患者合併鼻子漏出腦脊髓液 (CSF rhinorrhea) 則代表可能同時合併顱底骨折。
30. 以下哪一項眼科手術，可以見於治療視網膜剝離的治療之中？
- (A) 小樑切除術
 - (B) 水晶體摘除術
 - (C) 玻璃體切除術
 - (D) LASIK (雷射屈光角膜層狀重塑術)
31. 查看某成人保戶病歷，發現患者留置有腦室腹腔引流管 (VP shunt, ventriculoperitoneal shunt) 時，可考慮繼續追查或考量的相關病史與症狀，以下何者為非？
- (A) 是否有水腦症的病史。
 - (B) 水腦症的可能原因很多，包括腦部出血，外傷，腫瘤，感染等。
 - (C) 水腦症的可能症狀包括漸進性的記憶減退，反應遲鈍，人格改變，癡呆，平衡感差，步態不穩，小便失禁等。
 - (D) 由於目前醫材進步，水腦症狀可因手術而一勞永逸，不會再復發。
32. 關於椎間盤突出的成因與臨床表現，下列敘述何者為非？
- (A) 椎間盤可能因老化脆弱而破裂，也可能因施加足夠的外力而導致破裂。
 - (B) 特定職業 (如需常搬重物) 或肥胖者為高風險族群，但臨床上仍須謹慎評估其因果關係。
 - (C) 若併發馬尾症候群 (cauda equina syndrome) 通常並無大礙，密切觀察即可。
 - (D) 審閱相關就診病歷時，理學檢查欄位可能發現直腿抬舉檢查 (straight leg raising test, SLRT) 陽性。

33. 以下有關骨關節炎 (Osteoarthritis, OA) 的敘述，何者為非？
- (A) 又可稱為退化性關節炎 (degenerative joint disease)。
 - (B) 膝關節是最常見的關節之一。
 - (C) 學理上成因為軟骨磨損變薄、關節間隙變窄、骨頭逐漸變性與骨刺生成。
 - (D) 基於診斷名稱與其學理，關節外傷不是造成 osteoarthritis 的成因之一，因此只要看見這個診斷意外險便可依此拒賠。
34. 類風溼性關節炎的預後考量，下列何者為是？
- (A) 類風溼性關節炎顧名思義，其病灶僅限於關節骨骼，因此若合併內臟臟器障礙失能，例如心臟，則不應與其相關。
 - (B) 此類患者不可能產生發燒或全身疲倦等全身症狀，因此與其他疾病容易區分，容易診斷。
 - (C) 近年來生物製劑的使用，已經可以使此類患者痊癒康復，完全擺脫類風溼性關節炎。
 - (D) 診斷與追蹤的方式與內容，包括多種血清檢查，與關節侵犯的數量範圍等評估項目。
35. 骨質疏鬆症，以下何者為是？
- (A) 若患者不小心發生髌骨骨折，則約有 $1/5$ 的患者會在一年內死亡，而存活者中約 $1/2$ 也會有不良於行等後遺症。
 - (B) 停經以後的女性較少見，且男性多於女性。
 - (C) 骨質疏鬆容易造成患者骨折，尤其是顱骨，手指與腳趾骨部位。
 - (D) 長期使用類固醇可治療骨質疏鬆並且降低其發生機率。
36. 有關於眼科疾病，以下何者說明是對的？
- (A) 白內障是指結膜發生病變
 - (B) 青光眼是指玻璃體發生病變
 - (C) 青光眼大多眼壓會過高，但也可能出現正常眼壓的情況
 - (D) 視網膜出血俗稱前房出血

37. 下有關視網膜剝離成因，何者為非？

- (A) 裂孔性視網膜剝離 (rhegmatogenous retinal detachment) 是最常見的型態，可見於高度近視引起的格子樣變性 (lattice degeneration)。
- (B) 牽引性視網膜剝離 (traction retinal detachment) 在疤痕增生纖維化時，會收縮而拉扯視網膜，引起剝離。
- (C) 滲出性視網膜剝離 (exudative retinal detachment) 可見於感染。
- (D) 由於上述成因明確，因此若患者同時遭受眼球撞擊等外傷，則外傷絕非視網膜剝離的成因。

38. 鼻竇炎的常見的危險因子，不包括下列哪一項？

- (A) 扁桃腺發炎
- (B) 過敏性鼻炎
- (C) 鼻中隔彎曲
- (D) 鼻息肉

39. 理賠審核時我們常常需要考量患者症狀嚴重度，其中關於疼痛的衡量，下列何者為是？

- (A) 痛主要是一種患者主觀感覺感受。
- (B) 由於痛覺仰賴神經傳導，臨床上可直接利用神經電學檢查、超音波或影像學 (CT、MRI) 來精準且客觀地測量出患者當下感受到的疼痛指數。
- (C) 承 B，如同現行的醫學問卷或評估量表，已完全排除患者的主觀感受干擾，達到百分之百客觀的疼痛量化。
- (D) 截肢患者因病灶與患肢已被手術切除，在解剖學上已失去痛覺受器，故後續若再主訴仍然疼痛，在醫理上必然屬於誇大或詐病。

40. 格拉斯哥昏迷量表 (Glasgow Coma Scale, GCS) 的評分，以下何者為非？

- (A) E (eye) 指的是睜眼反應。
- (B) M (motor) 指的是活動反應。
- (C) V (verbal) 指的是語言反應。
- (D) 由於 GCS 評分包含 M (motor) 評分，因此可藉由 GCS 推知患者的肌肉力量 (muscle power)。

貳、複選題（共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分）

41. 下列關於胰臟炎的描述，何者正確？
- (A) 腹部外傷是台灣造成急性胰臟炎的最主要原因
 - (B) 急性胰臟炎患者血清澱粉酶多會上升
 - (C) 腹痛是胰臟炎的常見症狀
 - (D) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
42. 下列關於肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) D 型肝炎病毒是一種缺陷性病毒，只能在已患有 C 型肝炎者間造成感染
 - (B) 得過 A 型肝炎的患者，多會產生終身免疫
 - (C) A 型肝炎是台灣導致肝癌的主要病因之一
 - (D) B 型肝炎主要係經口傳染
43. 下列針對「氣喘（Asthma）」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可回復性的阻塞性呼吸道疾病
 - (B) 氣管支氣管樹（Tracheobronchial tree）對多樣性的刺激產生異常過度反應
 - (C) 可出現於任何年齡
 - (D) 重積性氣喘（Status asthmaticus）是一種氣喘危象
44. 下列針對「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是正確的？
- (A) 可出現於單側或雙側腎臟
 - (B) 最常見的腎臟囊腫病灶為多囊性腎發育不良（Multicystic dysplastic kidney）
 - (C) 可引發腎功能不良
 - (D) 腹腔鏡腎囊腫去頂手術為可選擇的治療方式之一
45. 下列哪些為引起胸痛的疾病？
- (A) 氣胸
 - (B) 主動脈夾層動脈瘤
 - (C) 肋間神經痛
 - (D) 胸膜炎

46. 關於心臟的相對位置，下列哪些是正確的敘述？
- (A) 肺臟位於心臟的兩側
 - (B) 心臟下方為橫膈膜
 - (C) 心臟後面為大血管與食道
 - (D) 心臟前方是胸骨與肋軟骨
47. 以下有關骨髓炎 (osteomyelitis) 的敘述，何者正確？
- (A) 最常引起骨髓炎的致病微生物是黴菌。
 - (B) 病原體可以經由血流或骨折受傷處或鄰近組織而感染造成骨髓炎。
 - (C) 骨髓炎如治療不完全可能變成慢性而延續多年，導致反覆抗生素治療與住院。
 - (D) 開放性骨折導致骨髓炎的機率可能大幅上升。
48. 有關癲癇 (epilepsy) 的敘述，以下何者正確？
- (A) 癲癇是腦神經細胞過度放電引起，因此可藉由腦波 (electroencephalogram, EEG) 偵測。
 - (B) 癲癇發作大多突發而且短暫，也因此，若某位疑似癲癇的患者但是腦波正常，仍無法據此宣稱他沒有癲癇。
 - (C) 最嚴重的癲癇發作可能稱為癲癇重積狀態。
 - (D) 癲癇發作時有可能合併意識喪失，也有可能意識清醒。
49. 有關巴金森氏症 (Parkinson disease) 的敘述，以下何者正確？
- (A) 大多是漸進性的腦退化的疾病。
 - (B) 以老人居多。
 - (C) 常以肢體抖動、四肢運動僵直緩慢的症狀表現。
 - (D) 目前治療方式包括了藥物與手術治療。
50. 關於酒精濫用成癮，以下何者為是？
- (A) 戒斷症狀容易發作於慢性酒精成癮者。
 - (B) 戒斷症狀可能包括焦慮、憂鬱、沮喪、焦躁不安、睡眠障礙等。
 - (C) 酒精成癮除了精神疾病，一可能造成腦神經上的實質異常或損害。
 - (D) 主要仰賴精神科心理治療與復健治療，藥物於治療上沒有角色。